




*W. C. C. 2.*  
*W. C. C. 2.*  
*W. C. C. 2.*

Oswald Weigel  
Verlagsgesellschaft & Antiquariat  
Leipzig, Königstr. 1.



*М. С. В.*

DR. ERNST ZICKENDRATH.

MOSKAU, NISHNY BAHN; PLATTFORM  
KUTSCHINO.

Д-ръ Эрнстъ Васильевичъ

ЦИКЕНДРАТЪ.

Москва, Нижегородская жел. дор.  
платформа Кучино.





PRODROMUS  
FLORAE MOSQUENSIS.

---

AUCTORE

1751-1821  
HENRICO DE MARTIUS

MEDICINAE AC CHIRURGIAE DOCTORE, SOCIETATIS  
IMPERIALIS NATURAE SCRUTATORUM MOSQUENSIS  
MEMERO ORDINARIO ETC.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

*J. J. Gray*

---

EDITIO ALTERA.

---

LIPSIÆ  
IN COMMERCIO INDUSTRIÆ  
1817.

+ QK 321

.M 35

1817

*Relinquamus aliquid ne frustra vicisse videamur.*

EXCELLENTISSIMO

A C

ILLUSTRISSIMO DOMINO

ALEXANDRO CRIGHTON

AUGUSTISSIMI IMPERATORIS ET AUTOCRATORIS OMNIUM

RUSSORUM

CONSILIARIO STATUS ACTUALI

ET ARCHIATRO

MEDICINAE ET CHIRURGIAE

DOCTORI

SUMMO RERUM MEDICARUM CIVILIUM

INSPECTORI

CONSILII MEDICI MEMBRO

ORDINIS SANCTAE ANNAE

EQUITI

SOCIETATIS IMPERIALIS NATURAE SCRUTATORUM

MOSQUENSIS

PLURIUMQUE ALIARUM MEMBRO

ETC.

HOC OPUSCULUM

SUMMAE VENERATIONIS TESTIMONIUM

SACRUM ESSE VULT

AUCTOR.

---

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

P R A E F A T I O.

---

**O**pus, quum non prorsus inutile ac supervacaneum mihi viderer suscipere, novam Prodromi Florae Mosquensis editionem curare coepi. Nam prior libelli editio, quae propriis meis sumptibus anno 1812. e typographia Lubyana in lucem prodiit, fato aequae diro, atque herbarium meum, cujus jacturam etiamnum aegre fero, bibliotheca reliquisque omnibus, quas haberem rebus mobilibus, deperditis, post Franco-Gallorum invasionem, magno incendio urbis capitalis veteris Russici Imperii flammis est correpta at-



que deleta. Novam cur retardarem editionem, varia mihi impedimenta erant, imprimis tamen desiderio in patria dilectissima huius laboris suscipiendi, non potui a me impetrare ut resisterem.

Quibus, quae scrutatori harum regionum sese opponant obstacula innumerable, non ignotum est, horum me virorum eo facilius veniam impetraturum spero, si omni adhibita diligentia, ac saepius et saepissime repetitis ad plantas inquirendas excursionibus, quaedam plantarum oculis meis forte evaserint. Quarum quidem numerum perquam exiguum fore propterea sperare possum, quod novem annorum otium ad hunc laborem perficiendum conferre non haesitavi, omnique Jove ac tempore, propioribus ac remotioribus hujus tractus regionibus perscrutandis maxime laetatus sum.

Antecessorem me habere egregium, Virum praenobilissimum *Equitem* STEPHAN, cujus magna de Flora Russica merita sunt et satis nota, lubens profiteor. Ceterum quorundam amicorum nomina, qui et ipsi Botanices eruditi cultores in opere perficiendo imprimis me sustentavere, publice quoque grato animo pronuntiare officium mihi sanctissimum est. Ex intimo enim animo Clarissimo HENNING, pharmacopolae meritissimo, qui per duo decennia regiones mosquenses perscrutatus est; Clarissimo D. LONDES, beate defuncto, nec non amicissimis D. MÜLLER et D. GOLDBACH, sacra pectoris vota voveo. Summis tamen laudibus me publice nunc extollere posse magna in merita Viri Illustris HOFFMANN, professoris mosquensis, qui laborem plurimis impedimentis obnoxium et doctrina sua

et studio honestissimo adjuvit, imprimis laetor.

Catalogo vero, non nisi, quarum copiam habere plantarum et quas videre potui, nomina inserui\*). E contrario plurium plantarum nomina haud enumeravi, quarum Flora Illustris STEPHAN fecit mentionem, quas ut invenirem et viderem, omni cura adhibita, nunquam mihi contigit. Quod ad eas attinet plantas, quae minus occurrunt, plura ubi proveniunt loca, tempus, quo florescunt,

---

\*) *Scillae amoenae* c. g. vernali tempore a rusticis in mercatu florum magna copia venalis circumfertur; dicitur etiam in regione mosquensi absque cura et cultura provenire. Sic reterente Illustri PALLAS *Alisma Damasonium*, *Hippophaë Rhamonides* etc. non procul ab Urbe crescunt. Quas cum in loco natali nunquam invenire possem, earum nomina in Catalogo omitti posse non dubitavi. *Rumicis bucephalophori* autem, licet persuasum difficile sit, Clarissimus Henning plus triginta exemplaria recentia, ripae Jausae depromta, mecum communicavit.

solitas, quas habent varietates, simul adnotavi.

Ad singulas quod attinet plantarum species, ea harum nomina eligere ausus sum, quae iis maxime mihi viderentur convenire. *Ajuga genevensis*, *Circaea lutetiana*, *Iris sibirica*, *Lavatera thuringiaca*, aliaeque plantae permultae, tam in majori Imperii Russici parte, quam in aliis terris et regionibus crebrius proveniunt, quam ut nomina a loco natalitatis repetita potuissent retinere.

Desideriis tironum studii Botanices ut succurrerem, eorum habui rationem librorum, in quibus singularum plantarum optimae occurrunt, et imprimis accuratae imagines. Prodro mi tamen hujus Florae Mosquensis hunc etiam esse volui finem primum, ut studii botanici cultoribus

sit comes in excursionibus instituendis  
non inutilis.

Sequenti anno, Deo favente, Flo-  
ram Mosquensem majorem tribus tomis,  
quae usus, quam plantae praebere possunt,  
primariam habeat rationem, Virorum  
doctorum subjicere me posse judicio  
spero.

AUCTOR.

Budissae,  
die 28. Decembris  
1816.

---



## AUCTORES CITATI.

---

*Allione*, flora pedemontana s. enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii. Augustae Taurinorum. 1785. fol.

*Amman*, stirpium rariorum in imperio rutheno sponte provenientium icones et descriptiones. Petropoli. 1759. 4.

*Barrelière*, plantae per Hispaniam, Italiam et Galliam observatae. Parisiis. 1714. fol.

*Batsch*, elenchus fungorum. Halae. 1780 — 1789. 4.

*Bauhin*, pinax theatri botanici. Basileae. 1623. 4.

*Blackwell*, herbarium selectum emendatum et auctum s. collectio stirpium officinalium. Norimbergae. 1757 — 1773. fol.

*Bocco*, museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Germania. Venezia. 1697. 8.

*Bolton*, history of all the british proper ferns. London. 1791. 4.

*Bulliard*, herbier de la France, ou collection complete des plantes indigenes de ce Royaume. Paris. 1780. fol.

*Bulliard*, histoire des champignons de la France. Paris. 1798. fol.

*Buxbaum*, plantarum minus cognitarum Cent. V. Petropoli. 1728. 4.

*Cavanilles*, classis monadelphia. Madrit. 1785 — 1790. 4.

*Columna*, ecphrasis stirpium minus cognitarum. Romae. 1616. 4.

*Curtis*, flora Londinensis, or plates in the environs of London. Londini. 1777 — 1785. fol.

*Curtis*, the botanical magazine. London. 1787. 8.

*Decandolle*, flore française. Paris. 1805.

- Decandolle*, plantarum historia succulentarum s. histoire des plantes grasses. Paris. 1799. fol.
- Dickson*, plantarum cryptogamicarum Britanniae. Fasc. IV. Londini. 1785 — 1801. 4.
- Dillenius*, historia muscorum. Oxoniae. 1745. 4.
- Dillwyn*, synopsis of the british confervae. London. 1800 — 1802. 4.
- Dodonaeus*, stirpium historiae pemptades sex. Antwerpiae. 1616. fol.
- Du Hamel du Monceau*, traité des arbres, fruitiers, contenant leur figure, leur description, leur culture, etc. Paris. 1768. 4.
- Ehrhart*, herbae Linneanae XVI. Decades. 1787 — 1793. fol.
- Ehrhart*, calamariae, gramina et tripetaloideae Linneanae. XIV. Decades. 1789 — 1793. fol.
- Ehrhart*, plantarum cryptogamicarum decades. fol.
- Gmelin*, flora sibirica. Petropoli. 1747 — 1769. 4.
- Haller*, historia stirpium indigenarum Helvetiae. Beranae. 1768. fol.
- Haller*, de allii genere naturali libellus. Gottingae. 1745. 4.
- Hayne et Drewes*, getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Gewächse. Berlin. 1802. 4.
- Hedwig*, species muscorum frondosorum. Lipsiae. 1801. 4.
- Hermann*, paradisus batavus, continens plus centum plantas aeri incisas. Lugduni. 1698. 4.
- Hoffmann*, Deutschlands Flora. 1795 — 1804. 12.
- Hoffmann*, historia salicum. Lipsiae. 1787. fol.
- Hoffmann*, descriptio lichenum. Lipsiae. 1790 — 1801. fol.
- Hoppe*, lateinisches Taschenbuch für die anfangen dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst. 1790 — 1815. 8.
- Host*, icones et descriptiones graminum austriacorum. Viennae. 1802 — 1805. fol.

- Houttuyn*, des Ritters von Linné vollständiges Pflanzensystem. Nürnberg. 1777 — 1788. 8.
- Jacquin*, flora austriaca. Viennae. 1773 — 1778. fol.
- Jacquin*, hortus botanicus Vindobonensis. Vindobonae. 1770 — 1776. fol.
- Jacquin*, icones plantarum rariores. Viennae. 1780 — 1795. fol.
- Jacquin*, collectanea ad Botanicam, Chemicam et Historiam naturalem spectantia. Viennae. 1786 — 1793. 4.
- Kerner*, Beschreibung und Abbildung der Bäume und Gesträuche von Württemberg. Stuttgart. 1788. 4.
- Kniphof*, botanicon in originali. Halae. 1757 — 1764.
- Knorr*, thesaurus rei herbariae hortensisque universalis. Norimbergae. 1772. fol.
- Krocker*, flora silesiaca renovata emendata. Vratislaviae. 1787 — 1790. 8.
- Lamarc*, flore française ou description de toutes les plantes, qui croissent naturellement en France. Paris. 1795. 8.
- Lambert*, description of the genus Pinus. London. 1814.
- Leers*, flora herbomensis. Herbornae. 1775. 8.
- Linné*, flora lapponica. Londini. 1792. 8.
- Linné*, hortus Cliffortianus. Amstelædani. 1737. fol.
- Lobel*, icones plantarum. Antwerpiae. 1581. 4.
- Loesel*, flora prussica. Regiomonti. 1703. 4.
- Marschall a Bieberstein*, flora taurico-caucasica. Charokoviae. 1808. 8.
- Micheli*, nova plantarum genera. Florentiae. 1729. 4.
- Miller*, illustratio systematis sexualis Linnaei. Londini. 1777. fol.
- Miller*, figures of the most beautiful, useful and uncommon plants, described in the gardeners dictionary. London. 1760. fol.
- Mönch*, enumeratio plantarum indigenarum Hassiae. Cassellis. 1777. 8.
- Morison*, historia plantarum universalis. Oxoniae. 1680 — 1699. fol.

- Oeder, Müller, Vahl, flora danica. Havniae. 1764 — 1800. fol.*
- Pallas, flora rossica. Petropoli. 1784 — 1788. fol.*
- Persoon, synopsis fungorum methodica. Gottingae. 1801. 8.*
- Persoon, icones et descriptiones fungorum. Lipsiae. 1800. 4.*
- Persoon, icones pictae rariorum fungorum. Parisiis. 1804. 4.*
- Persoon, observationes mycologicae. Lipsiae. 1796 — 1797. 8.*
- Petiver, herbarii britannici Rari catalogus. Londini. 1764. fol.*
- Plenk, icones plantarum medicinalium. Vindobonae. 1788 — 1789. fol.*
- Pluknet, almagestum botanicum. Londini. 1694. 4.*
- Pluknet, phytographia. Londini. 1690. 4.*
- Rebentisch, prodromus florum neomarchicarum. Berolini. 1804. 4.*
- Rivini, ordo plantarum flore irregulari tetrapetalo. Lipsiae. 1691. fol.*
- Rivini, ordo plantarum flore irregulari pentapetalo. Lipsiae. 1699. fol.*
- Römer, Archiv für die Botanik. Leipzig. 1796 — 1805. 4.*
- Roth, tentamen florum germanicarum. Lipsiae. 1788 — 1789. 8.*
- Rupprecht, flora jenensis. Jenae. 1745. 8.*
- Sabbati, hortus Romanus. Romae. 1772 — 1777. fol.*
- Schäffer, icones fungorum Ratisbonensium. Ratisbonae. 1765 — 1770. 4.*
- Scheuchzer, agrostographia s. graminum, juncorum, cyperorum etc. historia. Tiguri. 1719. 4.*
- Schkuhr, botanisches Handbuch. Wien. 1791 — 1803. 8.*
- Schkuhr, Beschreibung und Abbildung der Riedgräser. Wittenberg. 1801. 8.*

- Schkuhr*, kryptogamische Gewächse. Leipzig. 1804 — 1805. 4.
- Schmidel*, icones et analyses plantarum. Norimbergae. 1762. fol.
- Schrader*, spicilegium florae germanicae. Hannoverae. 1794. 8.
- Schrader*, commentatio super Veronicis spicatis. Gottinae. 1803. 8.
- Schrader*, systematische Sammlung kryptogamischer Gewächse. Göttingen. 1796. 8.
- Schrank*, bairische Flora. München. 1789. 8.
- Schreber*, Beschreibung der Gräser, nebst ihren Abbildungen nach der Natur. Leipzig, 1769. fol.
- Smith*, plantarum icones hactenus ineditae. Londini. 1789 — 1791. fol.
- Smith et Sowerby*, english botany or coloured figures of british plants. London. 1790 — 1805. 8.
- Sole*, menthae britannicae. Bathiae. 1793. fol.
- Sowerby*, colored figures of english fungi. London. 1797. fol.
- Sprengel*, florae halensis tentamen. Halae. 1806. 8.
- Stephan*, enumeratio stirpium agri Mosquensis. Lipsiae. 1792. 8.
- Stephan*, icones plantarum Mosquensium, ad historiam plantarum sponte circa Mosquam crescentium illustrandum. Mosquae. 1795. fol.
- Sturm*, Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur. Nürnberg. 1798 — 1806. 12.
- Tode*, fungi meklenburgenses. Luneburgi. 1790. 4.
- Usteri*, Annalen der Botanik. Zürich. 1791.
- Usteri*, neue Annalen der Botanik. Zürich. 1794. 4.
- Vaillant*, botanicon parisiense s. denombrement des plantes qui se trouvent aux environs de Paris. Lugduni. 1757. fol.
- Vaucher*, histoire des conferves d'eau douce. Genève. 1803. 4.



*Viborg*, botanisk-oekonomisk afhandling om Bygget.  
Kiøbenhavn. 1738. 4.

*Villars*, histoire des plantes de Dauphinés. Grenoble.  
1786 — 1788. 8.

*Waldstein et Kitaibel*, icones et descriptiones plantarum  
rariorum Hungariae. Viennae. 1802. fol.

*Weigel*, observationes botanicae. Gryphiswaldae. 1772. 8.

*Willdenow*, enumeratio plantarum horti botanici Bero-  
linensis. Berolini. 1809. 8.

*Zorn*, icones plantarum medicinalium. Norimbergae.  
1779 — 1782. 8.

\* \* \*

Abhandlungen der Halleschen naturforschenden Gesell-  
schaft. Dessau. 1783. 8.

Acta academiae scientiarum Petropolitanae. Petropoli.  
1728 — 1776. 4.

Memoires de la société Imperiale des Naturalistes à Mos-  
cou, Moscou. 1806. 4.

---

## C O R R I G E N D A.

pag. 38. lin. 6. loc. lasjone leg. lasione.

— 88. — 1. — fruticosus leg. fruticosus.

— 116. — 19. — ABABIS — ARABIS.

— 128. — 3. — Astragulus — Astragalus.

— 171. — 12. — pedunculatus — pedunculata.

— 178. — 19. — Aloides — Aloides.

---

PARS PRIMA

PLANTAE PHAENOLOGAMAE.

---



---

# MONANDRIA.

## MONOGYNIA.

1. *HIPPURIS*. Calyx margo bilobus. Corolla nulla. Stigma simplex. Nux monosperma.

1. *H. vulgaris*: foliis verticillatis numerosis linearibus acutis. *Flor. dan.* t. 87. (habitat in sic dictis tribus montibus. Jun.)

b. *Hippuris minor*: foliis superioribus linearibus octonis senisve, inferioribus lineari-lanceolatis quaternis senisque. (ibidem *Henning.*)

## DIGYNIA.

2. *CALLITRICHE*. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Capsula bilocularis tetrasperma.

1. *C. verna*: foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Fl. dan.* t. 129. (in lacubus, fossis, paludibusque. Mai. Jun.)

2. *C. intermedia*: foliis superioribus ovalibus, caulinis linearibus apice bifidis. *Schkuhr.* t. 1. f. e. (cum antecedente. Jun. Jul.)

3. *C. autumnalis*: foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Loes. pruss.* t. 38. (cum priori. Sept.)

4. *C. cespitosa*: [*minima*] foliis lineari-lanceolatis utrinque attenuatis, apice obtusis integris,

caulibus cespitosis ramosissimis reptantibus. (in fossis exsiccatis, ad vias in orbitis. Jun. Aug.)

3. BLITUM. Calyx trifidus. Corolla nulla. Semen unum calyce baccato immersum.

1. *B. virgatum*: glomerulis florum axillaribus, foliis subhastato-lanceolatis inaequaliter denticatis. *Mill. sexual. Linn. t. 2.* (in locis incultis. Jun.)

## D I A N D R I A.

### MONOGYNIA.

4. SYRINGA. Calyx quadridentatus. Corolla hypocrateriformis quadrifida. Capsula bilocularis, bivalvis. Semen margine membranaceo.

1. *S. vulgaris*: foliis ovato-cordatis, floribus caeruleis. *Schkuhr. t. 2.* (in hortis et sepibus. Mai.)

b. *Syringa rosea*: corollis roseis.

c. *Syringa alba*: corollis albis.

5. CIRCAEA. Calyx bipartitus basi tubulosus. Corolla dipetala. Capsula infera bilocularis non dehiscens, loculis monospermis.

1. *C. pubescens*: [*lutetiana*] caule erecto, foliis ovatis denticulatis opacis pubescentibus. *Fl. dan. t. 210. et t. 256.* (in montibus passerinis et nemoribus Kuskowae. Jun. Jul.)

2. *C. alpina*: caule ramosissimo depresso, foliis cordatis denticatis nitidis glabris. *Engl. bot. t. 1057.* (in montibus passerinis, Gorenki et Kuzowa. Jul. Aug.)



6. VERONICA. Calyx quadrifidus vel quinquefidus. Corolla rotata quadripartita, lacinia infima angustiore. Capsula bilocularis.

\* *Spica racemove terminali.*

1. *V. spicata*: spicis terminalibus, tota pubescens, foliis oppositis lanceolatis obtusis basi attenuatis crenatis. *Fl. dan.* t. 52 (in sylvis. Jun. Jul.)

b. *Veronica rosea*: corollis roseis.

2. *V. longifolia*: spicis terminalibus, tota pubescens, foliis oppositis ternis quaternisve lanceolatis acuminatis, basi cordatis, duplicato-serratis. *Schrader veron. spic.* t. 2. f. 1. (in colibus siccis. Jun. Jul.)

3. *V. maritima*: spicis terminalibus, tota pubescens, foliis ternis quaternis quinisque linearilanceolatis acuminatis duplicato-serratis, basi ovatis. *Fl. dan.* t. 374. (in pratis humidis. Jul. Aug.)

4. *V. serpyllifolia*: racemo terminali solitario, bracteis ellipticis, caulibus diffusis, foliis ellipticis obtusis crenatis glabris. *Fl. dan.* t. 492. (ad vias et in pratis. Mai. Jun.)

\*\* *Spicis racemisve axillaribus.*

5. *V. officinalis*: racemis axillaribus pedunculatis, floribus inferioribus distantibus, foliis oppositis obovato-oblongis annuis cauleque procumbente hirtis. *Fl. dan.* t. 248. (in sylvis. Jun.)

6. *V. Beccabunga*: racemis axillaribus oppositis, foliis ovato-oblongis serratis petiolatis glabris. *Fl. dan.* t. 511. (ad fontes rivulosque. Jun. Jul.)

7. *V. Anagallis*: racemis axillaribus oppositis, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus str-

ratis glabris. *Fl. dan.* t. 903. (ad fossas rivulosque. Jul.)

8. *V. scutellata*: racemis axillaribus alternis, pedunculis patentissimis, foliis lineari-lanceolatis sessilibus remote denticulatis glabris. *Fl. dan.* t. 209. (in pratis humidis, inundatis, paludibus. Jun. Jul.)

*b. Veronica parmularia*: racemis lateralibus alternis, foliis lineari-lanceolatis retrorsum perspicueque denticulatis pilosis. *Poiteau et Turpin. flor. paris.* t. 14. (in paludosis.)

9. *V. Chamaedrys*: racemis axillaribus, foliis ovatis grosse inaequaliter obtuse serratis, inferioribus petiolatis, caule adscendente bifariam piloso. *Fl. dan.* t. 448. (in pratis, vallis, aggeribus. Jun. Sept.)

10. *V. austriaca*: racemis axillaribus, foliis linearibus pinnatifidis bipinnatisve, bracteis pedicellis longioribus. *Jacqu. austr.* IV. t. 329. (in pratis circa Gorenki. Jun. Jul. Londes.)

11. *V. Teucrium*: [*latifolia.*] racemis axillaribus longissimis, foliis inferioribus oblongis, superioribus ovato-oblongis obtusiusculis rugosis dentatis, caule adscendente. *Rivin.* t. 95. (ad sylvarum margines. Jul. Aug.)

\*\*\* *Pedunculis unifloris.*

12. *V. agrestis*: floribus solitariis pedunculatis, foliis cordatis petiolatis, caule pubescente. *Fl. dan.* t. 449. (in arvis et agris. Mai.)

13. *V. arvensis*: floribus solitariis foliisque cordatis subsessilibus, caule hirsuto. *Fl. dan.* t. 515.

(circa nosocomium militare et versus sylvam St. Annae. Mai.)

14. *V. triphyllus*: floribus solitariis pedunculatis, foliis digitato-partitis, caule patulo. *Fl. dan.* t. 627. (in agris frequens. Mai.)

15. *V. verna*: floribus solitariis subsessilibus, foliis digitato-partitis, summis indivisis, caule stricto. *Fl. dan.* t. 252. (in graminosis siccis. Mai.)

7. GRATIOLE. Calyx quinquepartitus. Corolla irregularis resupinata. Stamina quatuor: bina sterilia. Stigma bilamellatum. Capsula bilocularis.

1. *G. officinalis*: foliis lanceolatis trinerviis apice serratis, pedunculis unifloris, calycibus bibracteatis. *Fl. dan.* t. 363. (ad Occam fluvium. Jun. Stephan.)

8. UTRICULARIA. Calyx diphyllus aequalis. Corolla personata calcarata. Capsula unilocularis circumscissa.

1. *U. vulgaris*: nectario conico, labio superiore lateribus reflexo longitudine palati, scapo stricto. *Fl. dan.* t. 138. (in aquis stagnantibus. Aug.)

2. *U. minor*: nectario carinato. *Fl. dan.* t. 128. (cum priore, rarius. Aug.)

9. LYCOPUS. Calyx tubulosus quinquefidus. Corolla tubulosa subaequalis quadrifida, lacinia superiore latiore emarginata. Semina quaterna, retusa.

1. *L. vulgaris*: [*europaeus*] foliis ovato-lanceolatis villosis sinuato-serratis. *Fl. dan.* t. 1081. (ad ripas, fossas, paludes. Jul. Aug.)

10. *SALVIA*. Calyx subcampanulatus bilabiatus: labio superiore tridentato. Corolla ringens. Filamenta transverse pedicello affixa.

1. *S. pratensis*: foliis cordato-oblongis crenatis, summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. *Engl. bot. t. 153.* (in pratis ad ripam Occae. Jul. Aug.)

*b. Salvia rubra*: corollis formosissimis coccineis.

2. *S. glutinosa*: villosa-viscosa, foliis cordato-sagittatis grosse serratis acuminatis. *Moris. hist. III. t. 13. f. 18.* (in sylva umbrosissima circa pagum Dolmatowa, solo lutoso. Jul. *Henning.*)

## DIGYNIA.

11. *ANTHOXANTHUM*. Calyx gluma bivalvis uniflora. Corolla duplex bivalvis: exterior aristata, interior minima mutica. Semen corollae interiori adnatum.

1. *A. odoratum*: spica oblonga ovata, flosculis subpedunculatis arista longioribus. *Fl. dan. t. 666.* (in pratis et sylvis. Jun.)

## TRIANDRIA.

### MONOGYNIA.

12. *VALERIANA*. Calyx nullus, nisi margo involutus germen coronans et deinde in pappum transiens. Corolla monopetala quinquefida, basi gibba vel calcarata supera. Semen unicum pappo plumoso coronatum,

1. *V. officinalis*: foliis omnibus pinnatis lanceolatis serratis. *Fl. dan.* t. 570. (in nemoribus et umbris humidis. Jun. Jul.)

13. GLADIOLUS. Spatha bivalvis. Corolla sexpartita: laciniis limbi inaequalibus, tubo subcurvato. Stamina adscendentia.

1. *G. communis*: corollis subringentibus secundis, laciniis spathulatis, spathis tubo longioribus, foliis ensiformibus nervosis. *Fl. Lond.* t. 86. (ad colles et monticulos circa Kunzowa rarius. Jun.)

14. IRIS. Corolla sexpartita: laciniis alternis reflexis. Stigmata petaliformia.

1. *I. paludosa*: [*Pseud-Acorus*.] imberbis, foliis ensiformibus, laciniis corollae interioribus stigmatibus minoribus. *Fl. dan.* t. 494. (in paludosis. Jul.)

2. *I. pratensis*: [*sibirica*.] imberbis, foliis linearibus, scapo subtrifloro tereti, germinibus trigonis. *Jacqu. austr.* I. t. 3. (in pratis uliginosis. Jun.)

15. RHYNCHOSPORA. Squamae paleaceae, infimae vacuae. Corolla nulla. Semen unicum coronatum stylo persistente indurato, basi latitudine seminis.

1. *R. alba*: [*Schoenus albus*] spicis corymbosofasciculatis, culmo foliisque setaceis. *Fl. dan.* t. 327. (in paludibus turfosis circa Gorenki. Jul. *Londes.*)

16. SCIRPUS. Squamae paleaceae undique imbricatae. Corolla nulla. Semen unicum nudum, vel setis e receptaculo ortis obvallatum.



1. *S. palustris*: culmo tereti nudo, vaginis muticis lanceolatis acutis, spica solitaria ovali, squamis lanceolatis acutis, stigmatibus duobus, radice repente. *Fl. dan.* t. 273. (in fossis et paludibus. Jun. Aug.)

*b. Scirpus nanus*: culmo brevissimo vix palmari. *Fl. dan.* t. 167. (in ruderatis et inundatis. Jun. Jul.)

2. *S. ovatus*: [*capitatus*] culmo subcompresso nudo filiformi, spica ovata terminali nuda, floribus diandris, stylo bifido. *Moris hist.* III. t. 10. f. 34. (in humidis. Jun. Jul.)

3. *S. adicularis*: culmo filiformi tetragono, vaginis obliquis muticis, spica solitaria ovata, squamis duabus infimis majoribus, radice repente nuda filiformi. *Fl. dan.* t. 287. (ad lacuum ripas. Jun. Jul.)

4. *S. caricinus*: [*Carex uliginosa*] culmo compresso superne triquetro, vaginis foliiferis, spica composita disticha, involucri monophyllo brevi. *Host. gram.* III. t. 57. (in pratis turfosis. Jun.)

5. *S. lacustris*: culmo tereti nudo, umbella decomposita terminali, spicis oblongis, involucri diphylo. *Host. gram.* III. t. 61. (in lacubus, stagnis, piscinis, paludibusque. Jul.)

6. *S. sylvaticus*: culmo triquetro folioso, umbella supradecomposita, pedunculis propriis tristachyis, spicis ovatis, squamis mucronatis, involucri subtriphylo umbella longiore. *Host. gram.* III. t. 68. (in nemorosis humentibus. Jul.)



17. **ERIOPHORUM.** Squamae paleaceae undique imbricatae. Corolla nulla. Semen unum lana longissima cinctum.

1. *E. vaginatum*: culmis vaginatis trigonis, spica solitaria terminali scariosa ovato-oblonga. *Host. gram.* I. t. 39. (in frigidis uliginosis turfosis, praecipue circa pagum Butirki. Mai.)

2. *E. latifolium*: [*polystachion*] culmis foliosis teretibus, foliis planis, spicis pedunculatis, seminibus ovatis. *Engl. bot.* t. 563. (in pratis uliginosis. Jun.)

3. *E. angustifolium*: culmis foliosis teretibus, foliis canaliculato-triquetris, spicis pedunculatis, seminibus ovatis. *Fl. Lond.* t. 9. (cum priorī. Jun.)

18. **NARDUS.** Calyx nullus. Corolla bivalvis. Stigma simplex.

1. *N. stricta*: spica setacea recta secunda. *Host. gram.* II. t. 4. (in asperis sterilibus nudis, circa Butirki, Kuskowa, Sokolniki. Mai.)

## DIGYNIA.

19. **PANICUM.** Calyx bivalvis biflorus, valvulis valde inaequalibus, flosculo altero hermaphrodito, altero neutro.

*Hermaphroditi*: Calyx nullus. Corolla bivalvis mutica vel apice aristata. Stamina terna. Styli bini. Semen corolla cartilaginea corticatum.

*Neutri*: Calyx nullus. Corolla uni-seu bivalvis.

1. *P. glaucum*: [*flavescens*] spica cylindracea, involucellis bifloris fasciculato-pilosis hispidis, corollis hermaphroditis transversim undulatis. *Host. gram.* II. t. 16. (in agris, cultis et hortis. Jun. Jul.)
  2. *P. viride*: spica cylindracea, involucellis bifloris fasciculato-pilosis hispidis, corollis hermaphroditis laeviusculis, vaginis foliorum pubescentibus. *Host. gram.* II. t. 14. (in arvis maxime arenosis, in agris post messem. Jul. Aug.)
  3. *Crus galli*: spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, rachi quinquangulari. *Host. gram.* II. t. 19. (in hortis, agris et cultis. Jul. Aug.)
    - b. *Panicum aristatum*: aristis longissimis. *Moris. hist.* III. s. 8. t. 4. f. 15. (ad ripas Jausae. Jun.)
    - c. *Panicum muticum*: aristis subnullis. (in agris cum priore.)
  4. *P. miliaceum*: panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis, *Host. gram.* II. t. 20. (in cultis. Jul. Aug.);
20. PHALARIS. Calyx bivalvis uniflorus, valvulis subaequalibus corolla majoribus. Corolla duplex; exterior univalvis vel bivalvis; interior bivalvis. Semen corolla interiori corticatum.
1. *Ph. canariensis*: panicula subspicata ovata, glumis calycinis navicularibus apice integerrimis, corolla exteriori bivalvi. *Host. gram.* II. t. 38. (circa domos in plateis frequens. Jun. Jul.)

2. *Ph. arundinacea*: panicula patente glomerata, glumis calycinis obtuse carinatis, corolla exteriore bivalvi brevissima pilosa. *Host. gram.* II. t. 33. (ad ripas lacuum et fluminum. Jun. Jul.)

b. *Phalaris picta*: foliis viride-albis striatis. (in hortis Jun. Jul.)

21. *PHLEUM*. Calyx bivalvis uniflorus, valvulis subaequalibus mucronato-subaristatis. Corolla bivalvis mutica calyce inclusa. Semen liberum corolla tectum.

1. *Ph. pratense*: racemo spicato cylindraceo, calycibus truncatis mucronato-aristatis carina ciliatis, aristis calyce brevioribus. *Host. gram.* III. t. 9. (in pratis et pascuis. Mai. Aug.)

2. *Ph. nodosum*: [*bulbosum*] spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. *Fl. dan.* t. 380. (in pascuis et collibus siccioribus circa Kuskowa et Zarizina. Jun. Jul.)

22. *ALOPECURUS*. Calyx bivalvis uniflorus, valvulis basi connatis. Corolla univalvis basi aristata. Semen liberum corolla tectum.

1. *A. pratensis*: culmo erecto glabro, panicula subspicata cylindracea obtusa, glumis calycinis infra medium connatis acutis villosis. *Host. gram.* I. t. 31. (in pratis. Jun. Aug.)

2. *A. agrestis*: [*myosuroides*] culmo erecto scabriusculo, spica simplici gracili (purpurascente), glumis nudiusculis basi connatis carina dilatatis. *Host. gram.* III. t. 12. (in pratis editioribus, agris, hortisque. Jun.)

3. *A. geniculatus*: culmo adscendente, panicula subspicata cylindracea obtusa, glumis calycinis

basi connatis obtusis subvillosis corollaque apice crenulatis. *Fl. dan.* t. 564. (in aquis stagnantibus et paludibus. Jun. Jul.)

*b. Alopecurus bulbosus*: radice bulbosa.

23. BECKMANNIA. Calyx bivalvis, biflorus, valvulis navicularibus. Corolla bivalvis, valvula exteriore apice subaristata. Semen liberum corolla tectum.

1. *B. erucaeformis*: [*Phalaris erucaeformis*] panicula secunda lineari. *Host. gram.* III. t. 6. (ad lacuum ripas, in paludibus, pratisque uliginosis Jun. Jul.)

24. MILIUM. Calyx bivalvis, uniflorus, ventricosus. Corolla bivalvis calyce inclusa, valvula majore sub apice aristata, interdum mutica. Semen corolla corticatum.

1. *M. effusum*: panicula verticillata patentissima, floribus ovatis muticis, vaginis aequalibus glabris. *Fl. dan.* t. 1143. (in nemoribus umbrosis circa Gorenki et Zarizina. Jun.)

25. AGROSTIS Calyx bivalvis, uniflorus, compressus. Corolla bivalvis calyce plerumque minor, valvula majori aristata seu mutica.

1. *A. Spica venti*: panicula verticillata patula, arista longissima subflexuosa infra apicem petali exterioris. *Fl. dan.* t. 853. (inter segetes et in pratis Jul.)

2. *A. vulgaris*: [*tenella*] panicula patente, ramulis divaricatis laeviusculis, flosculis muticis, calycibus aequalibus, ligula brevissima truncata. *Smith. - icon pl.* III. t. 54. (in pratis, pascuis, nemoribus, collibusque. Jul.)

3. *A. alba*: [*hispida*] panicula verticillata patente, ramis patulis calycibusque aequalibus hispidis, flosculis muticis, ligula oblonga. *Engl. bot. t. 1189.* (in pratis, pascuis et nemoribus, Jun. Jul.)
4. *A. gigantea*: [*compressa*] paniculae parte superiore patentissima, calycibus hispidis, petalo exteriori glabro, dorso superne subaristato, culmo erecto. *Roth.* (ad ripas fluviorum. Jul.)
26. TRICHODIUM. Calyx bivalvis, uniflorus. Corolla univalvis calyce minor aristata vel mutica. Semen liberum corolla tectum.
  1. *T. caninum*: [*Agrostis canina*] paniculae ramis trichotomis hispidulis, ramulis divergentibus flexuosis, calycibus acutis, arista dorsali infra medium proveniente. *Fl. dan. t. 161.* (in pratis, pascuis, nemoribus. Jun. Jul.)
  27. AIRA. Calyx bivalvis biflorus absque interjecto rudimento tertii flosculi. Corolla bivalvis supra basin aristata vel mutica. Semen liberum corolla tectum.
    1. *A. cristata*: panicula subspicata, glumis acuminatis, flosculis calycem excedentibus, foliis ciliatis. *Host. gram. II. t. 75.* (in collibus, pascuisque siccis. Jun. Jul.)
    2. *A. caespitosa*: panicula patentissima, flosculis calycem subaequantibus, arista recta brevi, foliis planis profunde sulcatis. *Host. gram. II. t. 42.* (in pratis et nemoribus humidis. Jun.)
    3. *A. flexuosa*: panicula patente, ramis flexuosis, flosculis calycem subaequantibus, arista geni-



culata calycem excedente, foliis setaceis. *Host. gram. II. t. 43.* (in sylvis nemoribusque siccis, Jul.)

4. *A. canescens*: panicula conferto-patula, flosculis calyce minoribus, arista medio annulata calyce brevior, foliis setaceis. *Moris. hist. III. t. 3. f. 10.* (in pascuis, arvisque siccis sterilibus apricis. Jul.)

5. *A. praecox*: foliis setaceis, vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Engl. bot. t. 1296.* (in arenosis et inundatis. Mai.)

6. *A. aquatica*: panicula patente, floribus muticis laevibus calyce longioribus, foliis planis. *Host. gram. II. t. 41.* (ad lacus et flumina. Jun.)

28. MELICA. Calyx bivalvis, biflorus, cum rudimento tertii floris. Corolla bivalvis mutica. Semen liberum corolla cartilaginea tectum.

1. *M. nutans*: petalis imberbibus, panicula racemosa secunda, spiculis nutantibus ovatis trifloris, flosculo tertio imperfecto. *Host. gram. II. t. 10.* (in nemoribus umbrosis. Jun. Sept.)

2. *M. uniflora*: [*Lobelii*] petalis imberbibus, panicula simplici secunda, ramis horizontalibus, spiculis erectis ovatis bifloris, altero imperfecto. *Vill. delph. II. t. 3. f. 3.* (in Sakolniki. Jul. Aug.)

3. *M. caerulea*: panicula coarctata, pedunculis flexuosis, floribus erectis conico-cylindricis, glumis internis quaternis laxiusculis acuminatis, binis fertilibus. *Host. gram. II. t. 8.* (in pratis, pascuis, sylvis et nemoribus humidis. Aug.)



29. *Holcus. Hermaphroditi*: Calyx gluma bi-seu triflora. Corolla gluma sub apice aristata. Stamina terna. Styli bini. Semen unicum.

*Masculi*: Calyx gluma bivalvis. Corolla bivalvis. Stamina terna.

1. *H. avenaceus*: [*Avena elatior*] panicula aequali, glumis bifloris, flosculo hermaphrodito superiore submutico, masculi arista geniculata, culmi geniculis glabris, radice nodosa. *Host. gram.* II. t. 49. (in pratis, pascuis, pomariis. Jun. Aug.)

2. *H. mollis*: panicula aequali, glumis bifloris, flosculo hermaphrodito inferiore mutico, masculi arista geniculata calycem excedente, radice repente. *Host. gram.* I. t. 3. (in nemoribus, arvis, pratis, agrisque arenosis. Jun. Jul.)

3. *H. odoratus*: panicula patula, glumis trifloris muticis, flosculis confertis, hermaphrodito intermedio diandro apice villosa, masculis triandris, margine villosa-ciliatis, dorso sublaevibus. *Host. gram.* I. t. 5. (in pascuis, arvisque humentibus, in Perowa, Kuskowa, Archangelsk. Jun. Jul.)

30. *Poa*. Calyx bivalvis multiflorus. Corolla bivalvis, valvulis subovatis acutiusculis muticis. Semen liberum corolla tectum.

1. *P. aquatica*: panicula aequali diffusa ramosissima, spiculis linearibus quinque usque novemfloris, flosculis obtusis liberis septemnerviis, radice repente. *Host. gram.* II. t. 60. (in lacubus, fluyiis, fossis et paludibus, Jun. Jul.)

2. *P. fluitans*: [*Festuca fluitans*] panicula secunda divaricata, spiculis linearibus appressis septem- vel undecimfloris, flosculis obtusis liberis septemnervibus, radice repente. *Host. gram.* II. t. 77. (in stagnis, fossis, paludibus. Jun. Sept.)
3. *P. bulbosa*: panicula ovata, spiculis quadrifloris ovatis, glumis interioribus villo connexis, culmo subnudo basi bulboso, foliis serrulatis. *Host. gram.* II. t. 65. (in collibus apricis circa Kunzowa et in montibus passerinis. Mai. Jun.)
4. *P. trivialis*: panicula aequali diffusa, spiculis oblongo-ovatis subtrifloris, flosculis basi villo connexis quinquenervibus, culmo vaginisque scabriusculis, ligula oblonga, radice fibrosa. *Host. gram.* II. t. 62. (in pratis et pascuis. Jul. Sept.)
5. *P. strigosa*: panicula coarctata diffusa, spiculis ovatis subtrifloris, culmo erecto laevi, foliis angustis caespitosis. *Hoffm.* (in siccioribus elatis. Mai. Jun.)
6. *P. pratensis*: panicula aequali diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Fl. Lond.* t. 2. (in pascuis, pratis et nemoribus. Jul. Aug.)
7. *P. angustifolia*: panicula aequali diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Host. gram.* II. t. 61. (cum praecedente. Jul. Aug.)
8. *P. sudetica*: panicula aequali diffusa. spiculis ovato-lanceolatis subtrifloris, flosculis liberis, vaginis ancipitibus, ligula brevi, radice repente.

*Host. gram.* III. t. 13. (in sylvarum locis humidis prope Gorenki. *Londes*; nec non in montibus passerinis. *Goldbach.* Jun. Jul.)

9. *P. annua*: panicula subsecunda divaricata, spiculis oblongo-ovatis quinque-vel septemfloris, flosculis liberis, culmo subcompresso, radice fibrosa. *Host. gram.* II. t. 64. (ad vias, in cultis et ruderalis. Mai. Sept.)

10. *P. compressa*: panicula subsecunda diffusa, spiculis oblongo-ovatis quinque-seu septemfloris, basi villo connexis, culmo compresso, radice repente. *Host. gram.* II. t. 70. (in muris, viis, pascuis siccis. Jun. Jul.)

11. *P. palustris*: panicula diffusa, spiculis subtrifloris pubescentibus, foliis planis demum involutis subtus scabris. *Leers. herb.* t. 6. f. 2. (ad ripas, in humidis sylvaticis, etiamque in siccis. Jun. Jul.)

12. *P. nemoralis*: panicula subsecunda diffusa attenuata, spiculis lanceolatis subtrifloris, flosculis liberis, ligula brevissima truncata, culmo subcompresso vaginisque glabris, radice subrepente. *Host. gram.* II. t. 71. (in nemorosis et dumetis frequens. Jun. Jul.)

13. *P. distans*: [*retroflexa*] panicula aequali divaricata, ramis fructiferis deflexis, spiculis linearibus subquinquefloris, flosculis obtusis liberis obsolete quinquenervibus, radice fibrosa. *Host. gram.* II. t. 63. (juxta canalem haud procul a ponte sic dicto fabrorum. *Goldbach*; nec non in montibus passerinis. *Henning.* Jun.)

31. *BRIZA*. Calyx bivalvis multiflorus. Corolla bivalvis ventricosa, valvulis cordatis obtusis muticis. Semen corollae adnatum.

1. *P. media*: spiculis ovatis, calyce flosculis brevioribus. *Host. gram.* II. t. 29. (in pratis pascuisque siccioribus. Jun. Aug.)

32. *DACTYLIS*. Calyx bivalvis multiflorus, valvula majori altero latere convexa latiori, altero depressa angustiori. Corolla bivalvis, valvulis lanceolatis muticis. Semen corollae adnatum.

1. *D. glomerata*: panicula secunda glomerata, spiculis tri-quadriflorisve, foliis carinatis. *Host. gram.* II. t. 94. (in pratis, hortis, nemoribus. Jun. Aug.)

33. *CYNOSURUS*. Calyx bivalvis, bi-vel quinqueflorus. Corolla bivalvis, valvula exteriori mutica seu aristata. Semen corollae adnatum. Spiculæ involucri disticho glumaceo stipatae.

1. *C. cristatus*: racemo spicato lineari, spiculis muticis, foliis linearibus. *Fl. dan.* t. 238. (in pratis, pascuis, hortisque. Jul. Aug.)

34. *FESTUCA*. Calyx bivalvis multiflorus. Corolla bivalvis, valvulis lanceolatis: exteriori mutica vel apice aristata. Semen corollae adnatum.

1. *F. ovina*: panicula patente, spiculis oblongis aristatis, culmo tetragono, foliis setaceis, ligula baurita. *Host. gram.* II. t. 84. (in siccioribus sterilibus. Jun. Jul.)
2. *F. duriuscula*: panicula patente, flosculis aristis longioribus, radice fibrosa. *Host. gram.* II.

t. 83. (in pratis, pascuis, collibus et nemoribus. Mai. Jul.)

3. *F. rubra*: panicula patente, flosculis arista longioribus, radice repente. *Host. gram.* II. t. 82. (in sterilibus siccis. Jun.)

4. *F. pratensis*: panicula patente ramosa, spiculis linearibus muticis multifloris, foliis linearibus, radice fibrosa. (in pratis et graminosis. Jun. Jul.)

5. *F. elatior*: panicula patente ramosissima, spiculis ovato-lanceolatis subaristatis quadri-quinqueflorisve, foliis lineari-lanceolatis, radice repente. *Schreb. gram.* I. t. 2. (in pratis, fluviorumque ripis. Jul. Aug.)

6. *F. decumbens*: panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. *Fl. dan.* t. 162. (in nemoribus, arvisque. Jul.)

35. *BROMUS*. Calyx bivalvis multiflorus. Corolla bivalvis, valvulis lanceolatis, exteriore sub apice aristata. Semen corollae adnatum.

1. *B. secalinus*: panicula fructifera apice nutante, spiculis oblongo-ovatis compressis nudis, flosculis demum distinctis remotiusculis, aristis flexuosis gluma brevioribus, foliis subpilosis. *Host. gram.* I. t. 12. (inter segetes. Jun. Aug.)

2. *B. multiflorus*: panicula apice nutante, spiculis lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis rectis gluma longioribus, foliis villosis. *Weig. obs.* t. 1, f. 1. (cum praecedente. Jul. Aug.)



3. *B. mollis*: panicula erecta, spiculis oblongo-ovatis subcompressis pubescentibus, flosculis imbricatis, corollae gluma exteriori apice bifida, aristis rectis glumam aequantibus, foliis mollissime pubescentibus. *Host. gram.* I. t. 19. (in pratis, pascuis, viis, murisque. Jun.)
4. *B. inermis*: panicula erecta, spiculis linearibus subteretibus nudis, flosculis imbricatis muticis vel brevissime aristatis, foliis glabriusculis. *Host. gram.* I. t. 9. (in pascuis, hortisque, ad vias et sepes. Jun. Jul.)
5. *B. sterilis*: panicula apice nutante, spiculis scabris lineari-lanceolatis, dein flosculorum remotione compressis et superne latioribus, aristis rectis gluma longioribus, foliis pubescentibus. *Leers. herb.* t. 11. f. 4. (in muris, ruderalis, dumetis, viisque. Jul.)
6. *B. tectorum*: panicula apice nutante, spiculis compressis foliisque pubescentibus, flosculis demum remotiusculis, aristis rectis glumam aequantibus. *Host. gram.* I. t. 15. (in muris, viis, ruderalis, collibusque. Jun.)
7. *B. arvensis*: panicula demum nutante, spiculis lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis rectis glumam aequantibus, foliis villosis. *Fl. dan.* t. 293. (inter segetes, ad sepes et vias. Jun. Jul.)
8. *B. giganteus*: [*strigosus*] panicula apice nutante, spiculis lanceolatis compressis nudis, flosculis imbricatis, aristis flexuosis gluma longioribus, foliis nudis. *Host. gram.* I. t. 6. (in



memoribus et umbrosis humidiusculis, montibus passerinis. Jul. Aug.)

36. *AVENA*. Calyx bivalvis multiflorus. Corolla bivalvis, valvulis lanceolatis, exteriori dorso aristata. Semen plerumque corolla corticatum.

1. *A. sativa*: panicula aequali, spiculis bifloris, flosculis calyce minoribus basi nudis, altero aristato, radice fibrosa annua. *Blackw. t. 422.* (cult. Jul.)

2. *A. strigosa*: panicula secunda, spiculis subtrifloris, flosculis calycem aequantibus triaristatis, arista dorsali longissima geniculata, reliquis duabus terminalibus brevibus rectis, radice fibrosa annua. *Host. gram. II. t. 56.* (inter segetes. Jul.)

3. *A. fatua*: panicula aequali, spiculis subtrifloris, flosculis calyce minoribus basique pilosis, radice fibrosa annua. *Schreb. gram. I. t. 15.* (inter segetes. Jul.)

4. *A. pratensis*: subspicata, spiculis quinquefloris. *Vaill. paris. t. 18. f. 1.* (ad sepes, in pratis, arvis, viisque. Jun.)

37. *ARUNDO*. Calyx bivalvis uni- seu multiflorus. Corolla bivalvis pilis persistentibus cincta. Semen liberum corolla tectum.

1. *A. Phragmites*: calycibus subquinquefloris, flosculis calycem excedentibus. *Scheuchz. gram. t. 3. f. 14.* (in lacubus et fluviis. Jul.)

2. *A. Epigejos*: panicula stricta patente, calycibus unifloris acuminatis, arista dorsali recta pilis brevior, pilis calycem subaequantibus.

*Engl. bot. t. 402.* (in collibus, nemoribusque aridis. Jul. Aug.)

3. *A. sylvatica*: [*Agrostis arundinacea*] panicula patente, calycibus unifloris acutis, pilis brevissimis, arista dorsali geniculata, calycem excedente. *Schrad. germ. t. 4. f. 7.* (in sylvaticis et nemorosis humidiusculis. Jul. Aug.)

38. **LOLIUM.** Calyx univalvis lateralis fixus solitarius multiflorus. Corolla bivalvis. Semen corolla corticatum.

1. *L. perenne*: spica mutica, spiculis calyce longioribus, radice perenni. *Schreb. gram. II. t. 37.* (in pascuis et pratis, ad vias et agrorum versuras. Jun. Jul.)

*b. Lolium latum*: spica lata secunda. *Roth.* (ad vias frequens. Jul.)

2. *L. temulentum*: spica aristata, spiculis calyce minoribus, radice annua. *Schreb. gram. II. t. 36.* (inter segetes, nec non in hortis. Jul.)

39. **ELYMUS.** Calyx lateralis bivalvis aggregatus multiflorus.

1. *E. caninus*: spica nutante arcta, spiculis rectis involucre destitutis, infimis geminis. *Buxb. cent. IV. t. 50.* (ad sepes et in dumetis. Jul.)

40. **HORDEUM.** Calyx uniflorus ternus: flosculo intermedio hermaphrodito, lateralibus masculis vel neutris.

*Hermaphroditi*: Calyx corollaque bivalvis. Stamina terna. Styli bini. Semen singulum corolla corticatum.

*Masculi vel Neutri*: Calyx corollaque bivalvis.  
Stamina terna vel nulla.

1. *H. vulgare*: flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus quadrifariam positis, culmis erectis. (cultum. Jul.)
2. *H. hexastichum*: flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam positis. *Viborg. cereal.* t. 2. (cultum. Jul.)
3. *H. murinum*: glumis calycinis intermediis lineari-lanceolatis ciliatis, exterioribus setaceis scabris, flosculis lateralibus masculis. *Host. gram.* I. t. 32. (in ruderatis, versuris, viisque. Jun. Aug.)

41. **SECALE**. Calyx oppositus bivalvis biflorus, valvulis aequalibus muticis seu aristatis. Corolla bivalvis: valvula exteriore longissime aristata. Semen liberum corolla tectum.

1. *S. cereale*: calycibus aristisque scabris. *Blackw.* t. 408. et 424. (cultum. Jul.)  
*b. Secale aestivum*: radice annua, semine minori.

42. **TRITICUM**. Calyx oppositus bivalvis solitarius multiflorus, valvulis subaequalibus. Corolla bivalvis, valvulis lanceolatis muticis vel apice aristatis. Semen corollae adnatum.

1. *T. aestivum*: calycibus quadrifloris ventricosis glabris imbricatis aristatis. *Hall. in nov. comment. Gotting.* 1774. t. 1. f. 1. (cultum. Jul.)
2. *T. hybernium*: calycibus quadrifloris ventricosis laevibus imbricatis submuticis. *Hall. ibid.* V. t. 1. f. 2. (ut antecedens, Jul.)

3. *T. repens*: spica disticha, glumis calycinis sub-  
quinqueerviis quadri-octoflorisve, flosculis  
muticis aristatisve, radice repente. *Schreb.*  
*gram.* II. t. 26. (in agris hortisque. Jun. Aug.)

## T E T R A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

43. SCABIOSA. Calyx communis polyphyllus;  
proprius duplex superus. Corolla quadri-vel quin-  
quefida. Semen singulum calyce coronatum. Re-  
ceptaculum paleaceum sive nudum.

1. *S. Succisa*: corollulis quadrifidis aequalibus,  
caule simplici, ramis approximatis, foliis lan-  
ceolato-ovatis. *Fl. dan.* t. 279. (in pascuis pra-  
tisque humidiusculis Aug.)

*b. Succisarosea*: corollulis roseis. (cum prae-  
cedente.)

2. *S. arvensis*: corollulis quadrifidis radiantibus,  
foliis pinnatifidis incisiss, caule hispido. *Fl. dan.*  
t. 447. (in agris, pratis, pascuisque. Jul. Aug.)

3. *S. sylvatica*: corollulis quadrifidis radiantibus,  
foliis omnibus indivisis ovato-oblongis serra-  
tis, caule hispido. *Jacqu. austr.* t. 362. (in syl-  
vaticis. Jul.)

4. *S. columbaria*: corollulis quinquefidis radian-  
tibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, cauli-  
nis pinnatis setaceis. *Fl. dan.* t. 314. (in areno-  
sis ad pagum Katschanowa. Jun.)

5. *S. ochroleuca*: corollulis quinquefidis radiantibus,  
foliis bipinnatis linearibus. *Jacqu. austr.*

t. 439. (in collibus graminosis, vallo magno urbano versus monasterium St. Simeonis. Jul. Aug.)

44. *ASPERULA*. Calyx margo obsoletus quadridentatus superus. Corolla infundibuliformis. Semina bina globosa.

1. *A. odorata*: foliis octonis lanceolatis, corymbis terminalibus pedunculatis, seminibus echinato-hispidis. *Fl. dan.* t. 562. (in sylvis, umbrosis. Jul.)

2. *A. Aparine*: foliis octonis lineari-lanceolatis, margine caulisque tetragoni angulis scaberrimis, fructibus globoso-didymis glabris. *Marsch. flor. caucas.* n. 257. (locis uliginosis et umbrosis inter densam herbam luxuriat. Jun. Jul.)

45. *GALIUM*. Calyx margo obsoletus superus. Corolla rotata. Semina bina globosa.

\* *fructibus glabris.*

1. *G. rubioides*: foliis quaternis ovato-lanceolatis aequalibus trinerviis subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris. *Buxb. cent.* II. t. 29. (in arvis, vallis, umbrosis: versus monasterium magnum s. d. virginum; in Kuskowa Kunzowa, et alibi. Jul. Aug.)

2. *G. hyssopifolium*: foliis quaternis inaequalibus lineari-lanceolatis obtusis glabris. *Hoffmann.* (in pascuis sylvaticis montosis. Jul. Aug.)

3. *G. palustre*: foliis quaternis obovatis inaequalibus, caulibus diffusis. *Fl. dan.* t. 423. (in paludibus ac fossis Jun.)

4. *G. trifidum*: foliis quaternis linearibus, caule procumbente scabro, corollis trifidis. *Fl. dan.* t. 48 (circa Kupawna. *Stephan.*)
5. *G. montanum*: foliis subquaternis linearibus laevibus, caule debili scabro, seminibus glabris. *Vill. delph.* II. t. 7. (in collibus sylvaticis; in Kunzowa. Jun. Jul.)
6. *G. verum*: foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. *Blackw.* t. 435. (in pratis, arvis, viis, nemoribus. Jun. Jul.)  
*b. Galium luteum*: corollulis saturate luteis. (in aggeribus, vallisque.)
7. *G. Mollugo*: foliis octonis ovato-linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flacido, ramis patentibus. *Fl. dan.* t. 455. (in versuris agrorum, marginibusque nemorum. Jun. Sept.)  
*b. Galium pubescens*: (in pratis, ad sepes, viasque. Jun. Jul.) flores citrini et albi.
8. *G. glaucum*: foliis octonis senisve linearibus, floribus corymbosis, corollis campanulatis, caule tereti laevi. *Jacqu. austr.* t. 81. (in apricis et montosis. Jun. Jul.)
9. *G. sylvaticum*: foliis octonis lanceolatis laevibus subtus scabris, floralibus binis, panicula terminali, pedunculis capillaribus, caule tereti laevi, geniculis tumidis. (in sylvis. Jun. Jul.)
10. *G. uliginosum*: foliis senis lanceolatis retrorsum serrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribus. *Petiv. herb.* 30. f. 6. (in pascuis aquosis sterilibus. Jun. Jul.)



\*\* *fructibus hispidis.*

11. *G. boreale*: foliis quaternis lanceolatis triner-  
viis glabris, caule erecto, seminibus hispidis.  
*Fl. dan.* t. 1024. (in pratis, nemoribusque. Jul.)
12. *G. scabrum*: [*asperum*] foliis senis octonisve  
linearibus scabris mucronatis, infimis minutis-  
simis ellipticis, pedunculis trichotomis ternisve,  
caule sublaevi depresso adscendente, basi tomen-  
toso. *Jacqu. austr.* t. 422. (in sylvaticis montium  
passerinorum. Jul.)
13. *G. Aparine*: foliis octonis lanceolatis, carinis  
scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis,  
fructibus hispidis. *Fl. dan.* t. 495. (in cultis et  
rueratis. Jun. Aug.)

46. PLANTAGO. Calyx quadrifidus. Corolla  
quadrifida, limbo reflexo. Stamina longissima. Ca-  
psula bilocularis circumscissa.

1. *P. major*: foliis ovatis glabris, scapo tereti,  
spica flosculis imbricatis. *Fl. dan.* t. 461. (in  
viis et ruderatis. Jul. Aug.)
2. *P. media*: foliis ovato-lanceolatis pubescenti-  
bus, spica cylindrica, scapo tereti. *Fl. dan.* t.  
581. (in pascuis, pratisque siccioribus. Jun.  
Jul.)
3. *P. lanceolata*: foliis lanceolatis, spica subova-  
ta nuda, scapo angulato. *Fl. dan.* t. 437. (in  
pascuis, viis et nemoribus. Jun. Jul.)
4. *P. sylvatica*: [*altissima*] foliis lanceolatis  
quinquenerviis dentatis, spica oblongo-cylin-  
drica, scapis angulatis bipedalibus. *Krock. siles.*  
(in sylvaticis, siccisque umbrosis. Jul. Aug.)

47. *MAJANTHEMUM*. Calyx nullus. Corolla rotata quadrifida. Bacca maculata trilocularis.

1. *M. bifolium*: [*Convallaria bifolia*.] foliis cordatis petiolatis. *Fl. dan.* t. 291. (in nemorosis et sylvaticis humidis. Jun.)

48. *CENTUNCULUS*. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida patens. Stamina brevia. Capsula unilocularis circumscissa polysperma.

1. *C. minimus*: foliis alternis ovatis, floribus sessilibus. *Fl. dan.* t. 177. (in arenosis humidiusculis. Jul. Aug.)

49. *PARIETARIA*. *Hermaphroditi*: Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina quaterna. Stylus singulus. Semen unum superum elongatum.

*Feminei*: Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Stamina nulla. Stylus singulus. Semen unum superum elongatum.

1. *P. officinalis*: foliis oblongo-ovatis acuminatis pellucido-punctatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis *Fl. dan.* t. 521. (in ruderatis glareoso-arenosis, ad Semenova. Jul. Müller.)

50. *SANGUISORBA*. Calyx diphyllus inferus. Corolla rotata quadrifida supera. Capsula bilocularis.

1. *S. officinalis*: spicis ovatis, staminibus corolla brevioribus. *Fl. dan.* t. 97. (in pratis siccioribus, circa Kupawna, Kunzowa et Semenowa. Jun. Jul.)

51. *TRAPA*. Calyx quadripartitus. Corolla quadripetala. Nux monosperma quadrispinosa, quae calycis foliola fuere.

1. *T. natans*: nucibus quadricornibus, spinis patentibus. *Plenk. pl. med.* II. (in stagnis et fossis limosis, versus Archangelsk. Jun.)

52. *ALCHEMILLA*. Calyx octofidus. Corolla nulla. Stylus e basi germinis. Semen singulum.

1. *A. vulgaris*: foliis reniformibus novemlobis acute dentatis glabris, corymbis terminalibus. *Fl. dan.* t. 693. (in pratis et sylvis herbidis. Mai. Jun.)

2. *A. pubescens*: [*hybrida*] foliis lobatis sericeis acute serratis, caule petiolisque longis dense pilosis. (in pascuis et sterilioribus. Mai. Aug.)

## D I G Y N I A.

53. *CUSCUTA*. Calyx quadrifidus. Corolla monopetala. Capsula bilocularis.

1. *C. vulgaris*: [*europaea*] floribus subsessilibus, corolla subtetrandra fauce nuda, stigmatibus acutis. *Fl. dan.* t. 199. (in urtica dioica linoque usitatissimo parasitica. Jul. Aug.)

54. *POTAMOGETON*. Calyx nullus. Petala quaterna. Stylus nullus. Semina quatuor.

1. *P. natans*: foliis natantibus petiolatis ellipticis acutis basi rotundatis subcordatis. *Fl. dan.* t. 1025. (in lacubus, stagnis et fluminibus. Jun. Jul.)

2. *P. perfoliatum*: foliis cordatis amplexicaulibus. *Fl. dan.* t. 196. (in lacubus fluviisque. Jul.)

3. *P. lucens*: foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus. *Fl. dan.* t. 195. (in stagnis, lacubus, fluviisque. Jun. Jul.)

4. *P. crispum*: foliis lanceolatis alternis oppositis-ve undulatis serratis. *Fl. dan.* t. 927. (in fossis et rivulis. Jul. Aug.)
5. *P. gramineum*: foliis lineari-lanceolatis alternis sessilibus stipula latioribus. *Fl. dan.* t. 222. (in fossis stagnisque. Jul.)
6. *P. pusillum*: foliis linearibus oppositis alternisque distinctis basi patentibus, caule tereti. *Engl. bot.* t. 215. (in stagnis et fossis Jul.)
55. *SAGINA*. Calyx tetraphyllus. Corolla tetrapetala vel nulla. Capsula quadrilocularis quadrivalvis polysperma.
1. *S. procumbens*: ramis procumbentibus. *Engl. bot.* t. 880. (in pascuis sterilibus, in muris, hortisque. Jun. Aug.)

## P E N T A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

56. *MYOSOTIS*. Calyx quinquefidus. Corolla hypocrateriformis quinquefida emarginata, fauce clausa fornicibus convexis.

1. *M. palustris*: [*scorpioides*] seminibus laevibus, caule subsimplici, foliis lanceolatis obtusis glabriusculis. *Fl. dan.* t. 583. (in humidis et paludosis. Jun. Sept.)

b. *Myosotis scabra*: foliis cauleque scabris. (in inundatis. Jul. Aug.)

2. *M. sylvatica*: seminibus laevibus, caule elongato hirsuto, foliis lineari-lanceolatis, racemo conjugato. *Ehrhart. herb.* (in sylvaticis. Jul. Aug.)

3. *M. arvensis*: seminibus laevibus, caule basi ramosissimo, foliis obovato-lanceolatis hirtis, racemo nudo, corolla connivente. *Bulliard. t. 355.* (in pratis, agris et arvis. Jun. Aug.)
4. *M. collina*: calycibus magis patulis, caule ramoso subnudo, foliis cespitosis. *Ehrh. herb. t. 31.* (in collibus agrisque apricis siccissimis. Jun. Jul.)
5. *M. sparsiflora*: seminibus laevibus, caule ramoso diffuso, foliis lanceolatis acutis hispidis, racemis simplicibus elongatis, floribus ramosissimis, calycibus acutis. (ad sepes et circa domos frequenter. Jun. Aug.)
6. *M. Lappula*: seminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Fl. dan. t. 692.* (in argillosis, ruderatis, murisque. Mai. Aug.)

57. LITHOSPERMUM. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis fauce perforata nuda. Semina quatuor.

1. *L. arvense*: seminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis hirtis basi angustatis. *Fl. dan. t. 456.* (in agris et arvis. Jun.)

58. CYNOGLOSSUM. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis seu rotata, fauce clausa fornicibus. Semina quaterna compressa, interiore tantum latere stylo affixa.

1. *C. officinale*: staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis basi attenuatis cano-pubescentibus sessilibus, laciniis calycinis oblon-

gis. *Fl. dan.* t. 1147. (in ruderatis, sepulcris, viisque. Jun. Jul.)

59. *PULMONARIA*. Calyx quinquefidus prismatico-pentagonus. Corolla infundibuliformis fauce pervia. Semina quaterna.

1. *P. angustifolia*: calycibus longitudine tubi corollae, foliis oblongo-lanceolatis, radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus *Fl. dan.* t. 485. (in nemoribus et umbrosis. Mai.)

2. *P. officinalis*: calycibus longitudine tubi corollae, foliis radicalibus ovato-cordatis scabris, caulinis ovatis sessilibus. *Fl. dan.* t. 482. (cum praecedente. Mai.)

*b. Pulmonaria maculata*: foliis albo-maculatis. (cum prioribus, rarius.)

60. *SYMPHYTUM*. Calyx quinquepartitus. Corolla tubuloso-clavata, fauce clausa fornicibus lanceolatis.

1. *S. officinale*: [album] foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Fl. dan.* t. 664. (in nemoribus et umbrosis. Jun.)

2. *S. patens*: [purpureum] calycibus patentibus. *Kniph. cent.* II. (in humidis, umbrosisque. Jun. Jul.)

61. *BORAGO*. Calyx quinquepartitus. Corolla rotata fauce fornicibus basi subappendiculatis clausa. Antherae exsertae. Semina quaterna.

1. *B. officinalis*: foliis omnibus alternis, calycibus patentibus (corollis azureis) *Engl. bot.* t. 36. (in cultis, oleraceisque. Jun. Sept.)

*b. Borago alba*: corollis albis. (in hortis.)



62. *ASPERUGO*. Calyx quinquefidus, fructiferus, compressus, lamellis plano-parallelis sinuatis. Corolla rotata fauce fornicibus obtusis clausa. Semina quaterna.

1. *A. procumbens*: calycibus fructus compressis.

*Fl. dan. t. 552.* (in ruderalis pinguibus. Mai.

Jun.)

63. *LYCOPSIS*. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis: tubo incurvato, fauce fornicibus obtusis clausa. Semina quaterna.

1. *L. arvensis*: foliis lanceolatis hispidis, calycibus florentibus erectis. *Fl. dan. t. 435.* (in arvis. Jun. Jul.)

64. *ECHINUM*. Calyx quinquepartitus. Corolla tubulosa: limbo inaequali, fauce pervia. Semina quaterna.

1. *E. vulgare*: caule herbaceo tuberculato-hispido, foliis lineari-lanceolatis, hispidis spicis lateralibus approximatis, staminibus corolla longioribus. *Fl. dan. t. 445.* (in agris et siccioribus. Jun.)

65. *ANDROSACE*. Involucrum umbellae. Calyx quinquefidus. Corolla hypocrateriformis: tubo ovato, ore glanduloso. Capsula unilocularis polysperma apice quinquefariam dehiscens.

1. *A. septentrionalis*: foliis lanceolatis dentatis glabris, pedunculis strictis involucri multoties longioribus, corollis calyce angulato longioribus. *Fl. dan. t. 7.* (in siccis arenosis, non procul a Presnenskaja Sastawa, nec non circa Petrowsk. Mai.)

66. PRIMULA. Involucrum umbellae. Calyx quinquedentatus. Corolla hypocrateriformis: tubo cylindrico, ore patulo. Capsula unilocularis polysperma, apice dentibus decem dehiscens.

1. *P. officinalis*: [veris] foliis dentatis rugosis medio contractis, scapo multifloro, corollae limbo concavo. *Fl. dan.* t. 433. (in nemorosis et pratis argillosis. Mai.)

*b. Primula rubra*: corollis rubicundis. (in pomariis et hortis. Mai.)

2. *P. elatior*: foliis dentatis rugosis medio contractis, scapo multifloro, corollae limbo plano. *Fl. dan.* t. 434. (in hortis graminosis et in arborum umbra. Mai.)

67. MENYANTHES. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis, interne hirsuta vel margine tantum ciliata. Stigma bifidum. Capsula unilocularis polysperma bivalvis seu evalvis. Semina receptaculis linearibus, parieti internae adnatis, inserta.

1. *M. trifoliata*: foliis ternatis. *Fl. dan.* t. 541. (in uliginosis et paludosis. Mai.)

68. HOTTONIA. Calyx quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis. Stamina tubo corollae imposita. Capsula unilocularis polysperma. Semina receptaculo centrali affixa.

1. *H. palustris*: floribus verticillatis pedunculatis. *Fl. dan.* t. 487. (in fossis, stagnis, paludibusque, e. g. versus monasterium St. Simeonis, et alibi. Mai, Jun.)

69. *LYSIMACHIA*. Calyx quinquepartitus. Corolla rotata. Capsula globosa unilocularis decem-valvis polysperma.

1. *L. vulgaris*: racemis terminalibus compositis, foliis oppositis binis, ternis, quaternisve, oblongo-lanceolatis. *Fl. dan.* t. 689. (in humidis, umbrosis, nemorosis. Jun. Jul.)
2. *L. thyrsiflora*: [*Naumburgia guttata*] racemis axillaribus pedunculatis ovatis folio brevioribus. *Fl. dan.* t. 517. (in paludibus et fossis, circa fontes. Jun.)
3. *L. Nummularia*: foliis oppositis subrotundis, pedunculis axillaribus unifloris, caule glabro repente. *Fl. dan.* t. 493. (in pascuis et nemorosis humidis. Jul.)

70. *CONVOLVULUS*. Calyx quinquedentatus. Corolla bilocularis, loculis dispermis.

1. *C. arvensis*: foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris. *Fl. dan.* t. 459. (in agris, cultis et hortis. Jun. Aug.)

*b. Convolvulus carneus*: floribus carneis. (in solo argillaceo et lutoso.)

2. *C. sepium*: foliis cordatis, lobis truncatis, pedunculis subtetragonis unifloris, bracteis cordatis acutis adpressis, calycinis dentibus acutis. *Fl. dan.* t. 458. (ad sepes inque fruticetis humidis. Jul. Aug.)

71. *POLEMONIUM*. Calyx quinquefidus. Corolla rotata quinquepartita, fundo clauso valvulis staminiferis. Stigma trifidum. Capsula trilocularis supera polysperma.

1. *P. caeruleum*: foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollae tubo longioribus. *Fl. dan.* t. 255. (in sylvis et nemoribus. Jun. Jul.)

b. *Polemonium album*: corollis albis. (in hortis. Jun. Jul.)

72. JASJONE. Involucrum decaphyllum. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala regularis. Antherae basi cohaerentes. Capsula infera bilocularis polysperma.

1. *J. montana*: foliis lineari-lanceolatis [basi angustioribus hispidis undulato-crispis. *Fl. dan.* t. 319. (in collibus siccioribus circa pagum Kunzowa. Jun. Jul.)

73. CAMPANULA. Calyx quinquepartitus. Corolla campanulata fundo clausa valvis staminiferis. Stigma trifidum. Capsula infera poris lateralibus dehiscens.

1. *C. rotundifolia*: glabra, foliis radicalibus (cito pereuntibus) oblongis reniformibusque serratis, caulinis linearibus integerrimis. *Flor. dan.* t. 855. (in pascuis, pratis et nemoribus. Jun. Aug.)
2. *C. tenuifolia*: glabra, foliis radicalibus oblongis, caulinis linearibus, caule elongato gracili. *Allion. pedem.* t. 6. (in arvis et ad vias. Jul. Aug.)
3. *C. patula*: foliis strictis, radicalibus lanceolato-ovalibus, panícula patula. *Fl. dan.* t. 373. (in pratis siccioribus, pascuis, collibusque. Jun. Sept.)

4. *C. Rapunculus*: foliis undulatis, radicalibus lanceolato - ovalibus, panicula coarctata. *Fl. dan.* t. 855. (in locis graminosis, sepibus, sylvisque. Jun.)
5. *C. persicifolia*: foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Fl. dan.* t. 1087. (in sylvis et nemoribus. Jun.)
6. *C. latifolia*: caule tereti striato glabro, foliis ovato-lanceolatis duplicato-serratis, pedunculis axillaribus unifloris erectis, calycibus glabris. *Fl. dan.* t. 85. (in montosis sylvaticis. Jul. Aug.)
7. *C. urticaefolia*: caule angulato simplicissimo calycibusque solitariis nutantibus hispidis, foliis serratis: inferioribus cordatis petiolatis, superioribus oblongis sessilibus. (in locis umbris humidiusculis, cum priori. Jul. Aug.)
8. *C. rapunculoides*: foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis, calycibus reflexis. *Moris. hist.* II. t. 3. f. 32. (in nemoribus versus Petrowsk et Zarizina. Jun. Jul.)
9. *C. bononiensis*: foliis ovato-lanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. *Moris. hist.* II. t. 4. f. 38. (in collibus sylvaticis circa Archangelsk. Jun. Jul.)
10. *C. Trachelium*: caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Fl. dan.* t. 1026. (ad margines sylvarum sepiumque. Jul. Aug.)
11. *C. glomerata*: caule angulato simplici glabriusculo, foliis scabris oblongo-lanceolatis



cordatis sessilibus, capitulo glomerato. *Engl. bot. t. 90.* (in pratis aridis, nemoribusque. Jun. Jul.)

*b. Campanula salviaefolia*: caule angulato simplicissimo, foliis ovato-lanceolatis: superioribus sessilibus, mediis ac inferioribus longissime petiolatis. (in collibus.)

*c. Campanula hirsuta*: caule simplici hirsuto, foliis lanceolato-acutis petiolatis. (cum antecedente.)

*d. Campanula diffusa*: ramosissima, foliis ovato-cordatis sessilibus scabris. (in solo arido calcareo. Jun. Jul.)

12. *C. Cervicaria*: hispida, floribus sessilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis. *Fl. dan. t. 787.* (in sylvis. Jul. Aug.)

74. **LONICERA**. Calyx quinquepartitus. Corolla monopetala irregularis tubuloso-sublabiata. Bacca infera bilocularis polysperma.

1. *L. Xylosteum*: pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Fl. dan. t. 808.* (in nemorosis, e. g. montibus passerinis, Perowa, Kuskowa, et alibi. Mai.)

2. *L. tatarica*: pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis cordatis obtusis. *Jacqu. ic. pl. rar. t. 37.* (in hortis frequentissime occurrit. Mai. Jun.)

75. **VERBASCUM**. Calyx quinquepartitus. Corolla rotata subinaequalis. Capsula bilocularis, bivalvis, polysperma.

1. *V. Thapsus*: foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici, filamentis tribus bar-



batis. *Fl. dan.* t. 631. (in collibus et monticulis glareosis et arenosis. Jul. Aug.)

2. *V. phlomoides*: foliis ovatis utrinque tomentosis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. *Mönch. flor. hass.* t. 4. (in monticulis asperis arenosis. Jun. Jul.)

3. *V. nigrum*: foliis inferioribus petiolatis cordatis ovatis, superioribus ovatis sessilibus, caule subramoso, filamentis omnibus barbatis. *Fl. dan.* t. 1083. (ad pagos, sepes, viasque. Jul. Aug.)

76. **DATURA**. Calyx tubulosus angulatus deciduus. Corolla infundibuliformis plicata. Capsula inferne quadrilocularis, superne bilocularis quadri-valvis polysperma.

1. *D. Stramonium*: pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris angulato-dentatis. *Fl. dan.* t. 436. in ruderatis pinguibus et circa pagos, in montibus passerinis versus Wassiliewsk, et ad amnem Mosquam. Jul. Aug.)

77. **HYOSCYAMUS**. Calyx quinquedentatus. Corolla infundibuliformis obtusa. Stamina inclinata. Capsula operculata, bilocularis, polysperma.

1. *H. niger*: foliis amplexicaulibus subsinuatis, angulatis, radicalibus pinnatifido-sinuatis, floribus sessilibus, corollis reticulatis. *Engl. bot.* t. 591. (ad vias et sepes, circa pagos et ruinas, in ruderatis et fimetis. Jul. Aug.)

78. **SOLANUM**. Calyx quinquepartitus. Corolla rotata. Antherae subcoalitae, apice poro gemino dehiscentes. Bacca bilocularis polysperma.

1. *S. Dulcamara*: caule inermi fruticoso scandente, foliis cordatis glabris: superioribus auriculatis; corymbis oppositifoliis. *Fl. dan. t. 460.* (in locis humentibus et fossis, ad sepes, molasque etc. Jul. Aug.)

2. *S. nigrum*: caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis glabris, racemis subumbellatis extra foliaceis pedunculatis *Fl. dan. t. 460.* (in ruderalis et cultis. Jun. Aug.)

3. *S. villosum*: caule inermi herbaceo, ramis teretibus hirtis, foliis dentato-angulatis villosopubescentibus, racemis subumbellatis extrafoliaceis pedunculatis (cum priori)

79. CHIRONIA. Calyx quinquepartitus. Corolla rotata. Stylus declinatus. Stamina tubo corollae insidentia. Antherae demum spirales. Capsula bilocularis polysperma.

1. *C. Centaurium*: [*Gentiana Centaurium*] caule dichotomo tetragono corymboso, foliis ellipticis trinerviis, calycinis laciniis subulatis subpaulis, corollae limbo plano. *Fl. dan. t. 617.* (in pratis et arvis. Jul. Aug.)

80. RHAMNUS. Calyx tubulosus quinquedentatus. Corolla squamae quinque stamina munientes calyci insertae. Bacca tri- seu tetrasperma.

1. *R. catharticus*: spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis serrulatis. *Fl. dan. t. 850.* (in Astankina et Zarizina. Jun.)

2. *R. Frangula*: inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis ellipticis utrinque acutis

integerrimis. *Fl. dan.* t. 278. (in nemoribus humidiusculis. Bis in anno floret. Mai. Aug.)

81. *EVONYMUS*. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula pentagona quinquelocularis quinquevalvis colorata, loculis monospermis. Semina calyptrata.

1. *E. vulgaris*: [*europaeus*] pedunculis compressis subtrifloris, floribus tetrandris, capsulis acute pentagonis glabris, foliis oblongo-lanceolatis glabris. *Fl. dan.* t. 1089. (in fruticetis ac sepibus. Mai. Jun.)

2. *E. verrucosus*: pedunculis filiformi-teretibus subtrifloris, floribus tetrandris, capsulis obtuse pentagonis glabris, foliis ovatis acuminatis glabris, ramis verrucosis. *Jacqu. austr.* I. t. 289. (in nemoribus omnibus haud infrequens. Mai. Jun.)

82. *RIBES*. Calyx campanulatus quinquesfidus. Petala quina. Stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca infera polysperma.

1. *R. rubrum*: inerme, racemis glabris nutantibus, floribus planis, foliis obtuse quinquelobis, caule erecto. *Fl. dan.* t. 967. (omnes hujus generis species in hortis ubique frequenter occurrunt. Mai.)

2. *R. nigrum*: inerme, foliis subtus punctatis, racemis laxis, floribus campanulatis, bracteis pedicellis brevioribus. *Fl. dan.* t. 556.

3. *R. Grossularia*: ramis aculeatis, petiolis pilosis, pedunculis unifloris, bracteis binis, fructu hirsuto. *Blackw.* t. 277.

4. *R. Uva crispa*: ramis aculeatis, pedunculis unifloris, bracteis connato - tubulosis, fructu glabro. *Fl. dan.* t. 546.

83. *VIOLA*. Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala irregularis, postice cornuta seu ecalcarata. Antherae cohaerentes. Capsula supera unilocularis trivalvis polysperma.

\* *Acaules.*

1. *V. hirta*: acaulis, foliis cordatis petiolisque piloso-hispidis, calycibus obtusis. *Fl. dan.* t. 618. (in nemorosis umbrosis humidiusculis. Mai.)

2. *V. palustris*: acaulis, foliis reniformibus repandis glabris, calycibus obtusis. *Fl. dan.* t. 83. (in paludibus, udisque. Mai. Jun.)

3. *V. odorata*: acaulis, stolonibus reptantibus, foliis cordatis petiolisque glabriusculis, calycibus obtusis. *Fl. dan.* t. 309. (in xystis et pomariis. Mai.)

b. *Viola alba*: corollis albis. (in hortis, pomariisque.)

c. *Viola magna*: grandiflora plena. (ibid. Mai; et non raro iterum Sept.)

4. *V. canina*: caule adultiore adscendente, foliis oblongo-cordatis, calycibus lanceolatis acutis. *Engl. bot.* t. 620. (in montosis siccioribus, umbrosis, nemorosis. Mai. Jun.)

5. *V. montana*: caulibus erectis, foliis cordatis oblongis, calycibus lanceolatis acutis. *Schkuhr.* t. 269. (in montibus passerinis, Kunzowa, Petrowsk et alibi. Jun.)

*b. Viola persicifolia*: caule erecto, foliis ovato-lanceolatis serratis. (in montibus passerinis) corollae albae.

**\*\* Caulescentes.**

6. *V. mirabilis*: caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis. *Jacqu. austr. t. 19.* (in montibus passerinis et Gorenki. Mai)

7. *V. tricolor*: caule angulato diffuso foliisque oblongis dentato-crenatis glabris, stipulis ly-rato-pinnatifidis, calycibus pilosis. *Fl. dan. t. 623.* (in arvis, agris, cultis, inter segetes, ad sepes et circa domos. Jun. Aug.)

*b. Viola bicolor*: erecta, calyce stipulisque ciliatis. *Hoffmann.* (in pratis et campis.)

*c. Viola hortensis*: floribus maximis sammetinis, calycibus nudis corolla multa minoribus. (in hortis, aestate.)

8. *V. arvensis*: caule angulato sulcato, foliis ovato-lanceolatis serratis, stipulis basi incis, calyce pubescente corolla sublongiore. (in arvis et inter segetes. Jun. Aug.)

84. IMPATIENS. Calyx diphyllus. Corolla pentapetala irregularis, nectario cucullato. Antherae connatae. Capsula supera quinquevalvis.

1. *I. Noli tangere*: pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Fl. dan. t. 588.* (in nemorum umbra, in humidiusculis. Jul. Aug.)

85. VINCA. Calyx quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis, Folliculi bini erecti. Semina nuda.



1. *V. minor*: caulibus fruticosis procumbentibus, foliis oblongo-lanceolatis margine glabris, floribus pedunculatis. *Engl. bot. t. 917.* (ad muros in hortis. Mai.)

## DIGYNIA.

86. **HERNIARIA.** Calyx quinquepartitus. Corolla nulla. Stamina quina sterilia. Capsula monosperma.

1. *H. glabra*: glabra, glomerulis multifloris. *Fl. dan. t. 529.* (in glareosis apricis siccis. Jul. Aug.)

87. **ATRIPLEX. Hermaphroditi:** Calyx pentaphyllus. Corolla nulla. Stamina quina. Stylus bipartitus. Semen singulum, depressum.

*Feminei:* Calyx diphyllus. Corolla nulla. Stamina nulla. Stylus et semen ut supra..

1. *A. hortensis*: caule erecto herbaceo, foliis triangularibus dentatis concoloribus, calycibus fructus ovatis reticulatis integerrimis. *Blackw. t. 99 et 552.* (in ruderatis, hortorum rejectamentis. Aug.)
2. *A. hastata*: caule erecto herbaceo, foliis triangulari-hastatis profunde dentatis concoloribus, calycibus fructus sinuato-dentatis, dente intermedio elongato. *Moris. hist. II. t. 32. f. 14.* (in locis ruderatis. Jul. Aug.)
3. *A. patula*: caule patulo herbaceo, foliis triangulari-hastatis acuminatis subdentatis, calycibus fructus rhombeis apice denticulatis, disco



submuricatis. *Engl. bot.* t. 936. (in ruderatis, viis. Aug. Sept.)

88. *CHENOPODIUM*. Calyx pentaphyllus, pentagonus. Corolla nulla. Semen unum lenticulare superum.

**\*\* Foliis planis angulosis.**

1. *C. Bonus Henricus*: foliis triangulari-hastatis integerrimis, spicis compositis glomeratis aphyllis axillaribus terminalibusque. *Fl. dan.* t. 579. (in ruderatis et fimetis. Jun. Jul.)
2. *C. urbicum*: foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. *Fl. dan.* t. 1148. (in plateis. Jun. Jul.)
3. *C. rubrum*: foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subfoliosis caule brevioribus. *Fl. dan.* t. 1149. (in cultis et ruderatis, circa pabula, in fimetis. Jul. Aug.)
4. *C. murale*: foliis ovatis inaequaliter dentatis acutis nitidis, racemis corymbosis nudis, caule ramoso patulo. *Fl. Lond.* t. 5. (in muris, aggeribusque. Jul. Aug.)
5. *C. album*: foliis rhomboideo-ovatis erosis postice integris, superioribus oblongis integerrimis, seminibus laevibus. (in agris, cultis, ruderatis. Jul. Aug.)
6. *C. viride*: foliis rhomboideis dentato sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Fl. dan.* t. 1150. (in agris, hortisque. Jun. Jul.)

7. *C. hybridum*: foliis ovatis acuminatis subcordatis angulato-dentatis, racemis paniculatis nudis terminalibus axillaribusque. *Barrel. icon.* t. 540. (in agris et hortis. Jun. Aug.)

8. *C. glaucum*: foliis oblongis repandis subtus glaucis, spicis glomeratis nudis simplicibus axillaribus terminalibusque. *Fl. dan.* t. 1151. (in fimetariis. Jul. Aug.)

\*\* *Foliis planis, integerrimis.*

9. *C. olidum*: [*Vulvaria*] foliis integerrimis rhombo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. *Fl. dan.* t. 1152. (in fimetis, soloque pingui in ruderatis et muris; frequentissime in vallo urbano prope tres montes, nec non in Perowa, Wassiliewsk. Aug.)

10. *C. polyspermum*: foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. *Fl. dan.* t. 1153. (in hortis et agris. Jul. Aug.)

39. *ULMUS*. Calyx quinquesfidus. Corolla nulla. Samara monosperma.

1. *U. campestris*: foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus subsessilibus conglomeratis pentandris, fructibus glabris. *Schkuhr.* I. t. 57. (ad pagos et vias. Mai.)

2. *U. ciliata*: [*effusa*] foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, floribus octandris pedunculatis effusis, fructibus margine ciliatis. *Schkuhr.* I. t. 57. b. (in nemoribus, hortisque. Mai.)

90. GENTIANA. Calyx quinquepartitus. Corolla monopetala. Capsula bivalvis unilocularis: receptaculis duobus longitudinalibus.

1. *G. cruciata*: corollis quadrifidis hypocrateriformibus nudis verticillatis sessilibus, caulibus ancipitibus basi attenuatis. *Jacqu. austr. t. 372.* (in pratis montosis, arvis, sylvarum marginibus et vallis. Jun. Jul.)
2. *G. Pneumonanthe*: corollis quinquefidis campanulatis acuminatis axillaribus pedunculatis, foliis sublinearibus obtusis. *Fl. dan. t. 269.* (in pratis, nemoribusque humidiusculis. Jul. Aug.)
3. *G. Amarella*: corollis quinquefidis hypocrateriformibus barbatis, laciniis limbi lanceolatis acutis, calycinis subaequalibus, foliis lanceolatis, internodiis ramorum brevioribus. *Röm. Arch. I. t. 5. f. 13.* (in pratis siccioribus. Aug. Sept.)
4. *C. campestris*: corollis quadrifidis hypocrateriformibus obtusis fauce barbatis, calycis laciniis duabus maximis. *Engl. bot. t. 237.* (in pratis, arvis, marginibusque sylvarum. Aug. Sept.)

91. ERYNGIUM. Flores capitati. Calyx pentaphyllus. Corolla uniformis. Fructus ovatus. Receptaculum paleaceum.

1. *E. campestre*: foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato-laciniatis ternatis, caule superne ramosissimo. *Fl. dan. t. 554.* (in tribus montibus versus lacum. Jul. Hoffmann.)

2. *E. planum*: foliis radicalibus ovalibus planis crenatis, capitulis pedunculatis. *Jacqu. austr.* t. 391. (in campis, vallis, collibusque. Jul. Aug.)

92. *SANICULA*. Umbellae confertae subcapitatae. Fructus scaber. Flores disci abortientes.

1. *S. europaea*: foliis quinquelobis, lobis trifidis dentatis, caule aphylo, flosculis omnibus sessilibus. *Fl. dan.* t. 233. (in sylvis montosis et vallis, in montibus passerinis et Kuskowa. Mai. Jun.)

93. *CAUCALIS*. Corollae radiatae: disci masculae. Petala inflexo-emarginata. Fructus setis hispidus. Involucra integra.

1. *C. Anthriscus*: [*Tordylium Anthriscus*] involucris polyphyllis, seminibus ovatis, stylis reflexis, foliis decompositis, foliolo extimo lineari-lanceolato. *Fl. dan.* t. 919. (in ruderalis, sepibus, nemorumque marginibus. Jun. Jul.)

94. *DAUCUS*. Corollae subradiatae. Flosculi disci abortivi. Fructus pilis hispidus.

1. *D. Carota*: seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Fl. dan.* t. 723 (in pascuis, nemoribusque. Jun. Jul.)

*b. Daucus sativus*: radice crassiore succulenta dulci. *Blackw.* t. 546. (cultus.)

95. *CONIUM*. Involucella dimidiata subtriphylla. Fructus subglobosus quinquestriatus utrinque cre-natus.

1. *C. maculatum*: seminibus striatis, involuclis umbellulae radiis multo brevioribus lanceo-

latis. *Jacqu. austr. t. 156.* (in cultis et ruderatis. Jul. Aug.)

96. *SELINUM*. Involucrum reflexum. Petala cordata aequalia. Fructus ovali-oblongus compresso-planus, in medio striatus.

1. *S. sylvestre*: caule laevi, radice fusiformi multiplici. *Moris. hist. III. t. 17. f. 2.* (in humidiusculis, umbrosis. Jul. Aug.)

2. *S. palustre*: caule angulato striato, radice fusiformi subdivisa, radiis umbellae scabris, foliis triplicato-pinnatis, pinnis pinnatifidis, lacinii lanceolatis. *Engl. bot. t. 229.* (in paludibus sylvarum, aliisque umbrosis humidis; in tribus montibus, circa Petrowsk, Semenowsk, et alibi. Jun. Jul.)

3. *S. carvifolium*: [*Carvifolia*] caule sulcato acutangulo, involucri universali nullo, foliolis lanceolatis incisuris apice calloso-mucronatis. *Jacqu. austr. t. 16.* (in pratis paludosis, collibusque umbrosis. Jul. Aug.)

*b. Selinum sylvaticum*: caule altiori, angulis membranaceis, involucri universali minus deciduo. *Sprengel.* (in montibus passerinis et Archangelsk. Aug.)

97. *ATHAMANTA*. Petala inflexa emarginata. Fructus ovato-oblongus striatus.

1. *A. Libanotis*: foliis bipinnatis planis, umbella hemisphaerica, seminibus hirsutis. *Jasqu. austr. t. 392.* (in pratis, collibusque siccis apricis. Aug.)

2. *A. sibirica*: foliis pinnatis inciso - angulatis. *Gmel. sib. I. t. 40. f. 1. 2.* (in sylvis et collibus ad Jausam fluvium. Jul. Aug.)
3. *A. Oreoselinum*: foliis triplicato - pinnatis, petiolis partialibus flexuoso - divaricatis. *Jacqu. austr. t. 68.* (in collibus apricis. Jul.)

98. PEUCEDANUM. Involucra brevissima. Fructus ovatus utrinque striatus ala cinctus.

1. *P. Silaus*: foliolis pinnatifidis: laciniis oppositis, involucro universali diphylllo. *Jacqu. austr. t. 15.* (in pratis humidiusculis. Jun. Jul.)

99. HERACLEUM. Involucrum caducum. Corolla difformis inflexo - emarginata. Fructus ellipticus emarginatus compressus striatus marginatus.

1. *H. Sphondylium*: foliis pinnatis: foliolis quinque pinnatifidis. *Engl. bot. t. 939.* (in hortis graminosis, pratisque succulentioribus. Jul. Aug.)

b. *Heracleum flavescens*: foliis septemlobis angustioribus. *Stephan.*

2. *H. angustifolium*: [*longifolium*] foliis cruciato-pinnatis: foliolis linearibus, corollis flosculosis. (in pratis et cultis frequens. Jul.)
3. *H. sibiricum*: foliis pinnatis, foliolis quinque intermediis sessilibus, corollis uniformibus. *Gmel. sib. I. t. 50.* (in sylvis humidiusculis. Jun. Aug.)
4. *H. Panaces*: foliis pinnatis, foliolis quinque intermediis sessilibus, floribus radiatis. (in pratis. Jul. *Stephan.*)



100. **LIGUSTICUM.** Corollae aequales, petalis involutis integris. Fructus oblongus quinesulcatus utrinque.

1. *L. Levisticum*: foliis pinnatis: pinnis inferioribus ternatis, foliolis oblongis basi cuneatis, apice acuminatis subincisis. *Blackw.* t. 275. (in hortis olitoriiis frequentissimum. Jun. Jul.)

101. **ANGELICA.** Corollae aequales, petalis incurvis. Fructus subrotundus angulatus solidus, stylis reflexis.

1. *A. Archangelica*: foliolorum impari lobato. *Fl. dan.* t. 206. (in nemoribus et umbrosis humidiusculis. Jun. Jul.)

102 **Sium.** Involucrum polyphyllum. Petala cordata. Fructus subovatus striatus.

1. *S. latifolium*: foliis pinnatis, pinnis radicalium subbipinnatifidis, caulinarum simplicibus, umbellis terminalibus. *Fl. dan.* t. 246. (in rivulis et fossis. Jul.)

103. **Phellandrium.** Flosculi disci minores. Fructus ovatus laevis coronatus perianthio et pistillo.

1. *Ph. aquaticum*: foliolorum ramificationibus divaricatis. *Fl. dan.* t. 1154. (in lacubus, stagnis, fossis. Jun. Jul.)

104. **Cicuta.** Fructus subovatus sulcatus. Involucrum nullum; involucella tri - usque pentaphylla.

1. *C. virosa*: umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Fl. dan.* t. 208. (in paludibus profundis, ad lacus et fossas. Jun. Jul.)

105. *AETHUSA*. Involucella dimidiata triphylla pendula. Fructus striatus.

1. *A. Cynapium*: foliis conformibus, foliolis pinatifidis: laciniis linearibus. *Eng. bot. t. 1192.* (inter olera, in hortis spontanea. Jun. Aug.)

106. *CORIANDRUM*. Involucrum universale monophyllum; partialia dimidiata. Corolla radiata. Petala inflexo-emarginata. Fructus sphaericus.

1. *C. sativum*: seminibus globosis. *Eng. bot. t. 67.* (ut antecedens. Jul. Aug.)

107. *SCANDIX*. Flosculi disci saepius masculi. Corolla radiata. Petala emarginata, Fructus subulatus.

1. *S. Ccrefolium*: [*Chaerophyllum sativum*] seminibus nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. *Engl. bot. t. 1268.* (in cultis sponte. Jun. Jul.)

108. *CHAEROPHYLLUM*. Involucrum reflexum concavum. Petala inflexo-cordata. Fructus oblongus laevis.

1. *C. sylvestre*: caule striato, geniculis tumidiusculis. *Jacqu. austr. t. 149.* (in nemoribus et umbrosis, ad sepes et in hortis. Mai. Jun.)
2. *C. bulbosum*: caule laevi geniculis tumido, basi hirtis. *Jacqu. austr. t. 31.* (in sylvis et dumetis. Jun. Jul.)
3. *C. temulum*: caule scabro, geniculis tumidis. *Jacqu. austr. t. 65.* (in fruticetis, sepibus, viisque. Mai. Jun.)

4. *C. aromaticum*: caule aequali, foliolis cordatis serratis integris, fructibus biaristatis. *Jacqu. austr.* t. 150. (in montibus passerinis et in Archangelsk. Jun.)

109. IMPERATORIA. Petala inflexo-emarginata. Fructus subrotundus compressus medio gibbus, margine cinctus.

1. *J. sylvestris*: [*Angelica sylvestris*] foliolis aequalibus ovato-lanceolatis serratis. *Pl. med.* t. 366. (in pratis subhumidis sylvaticis, Jul. Aug.)

110. PASTINACA. Petala involuta integra. Fructus ellipticus compresso-planus.

1. *P. pratensis*: foliis pinnatis glabris, foliolis ovato-lobatis: exterioribus trilobis. *Fl. dan.* t. 1206. (in ruderalis, pascuis, vallisque. Jul. Aug.)

*b. Pastinaca sativa*: radice crassiore, dulciore. *Blackw.* t. 379. (cult.)

111. ANETHUM. Petala involuta integra. Fructus subovatus compressus striatus.

1. *A. graveolens*: annuum, fructibus compressis. *Blackw.* t. 545. (in cultis sponte. Jun. Aug.)

112. CARUM. Involucrum monophyllum. Petala carinata inflexo-emarginata. Fructus ovato-oblongus striatus.

1. *C. Carvi*: caule ramoso, vaginis foliorum ventricosus, involucri partiali nullo. *Fl. dan.* t. 1091. (in pratis et graminosis. Jun.)

113. PIMPINELLA. Fructus ovato-oblongus. Petala inflexa. Stigmata subglobosa.

1. *P. Saxifraga*: caule striato glabro, foliis pinnatis glabris, radicalium foliolis subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. *Fl. dan.* t. 669 (in pascuis, collibusque siccis, ad vias. Jul. Aug.)

2. *P. nigra*: caule striato pubescente, foliis pinnatis pubescentibus, radicalium foliolis subcordatis incisis obtuse dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. *Jacqu. austr.* t. 395. (in siccioribus, in Petrowsk, Sokolnika. Aug.)

114. *APIUM*. Involucrum monophyllum. Petala aequalia. Fructus ovato-striatus.

1. *A. graveolens*: foliis caulinis cuneiformibus. *Engl. bot.* t. 1210. (in cultis Jul.)

b. *Apium dulce*: foliis erectis, petiolis longissimis, foliolis quinquelobatis serratis. (cultum.)

115. *AEGOPODIUM*. Fructus ovato-oblongus striatus.

1. *A. Podagraria*: foliis caulinis summis ternatis ovatis. *Fl. dan.* t. 670. (in pomariis, sepibus et sylvaticis. Mai. Jun.)

## TRIGYNIA.

116. *VIRURNUM*. Calyx quinquepartitus superus. Corolla quinquefida. Bacca monosperma.

1. *V. Opulus*: foliis trilobis acuminato-dentatis, petiolis glandulosis glabris. *Fl. dan.* t. 661. (in nemoribus humidiusculis, ad sepes. Mai.)

*b. Viburnum roseum*: cyma globosa, flore pleno. *Knorr. del. hort.* II. t. S. 6. (in hortis.) corollulae roseae et albae variant.

117. *SAMBUCUS*. Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida. Bacca trisperma.

1. *S. Ebulus*: cymis tripartitis, stipulis foliaceis ovatis, caule herbaceo. *Fl. dan.* t. 1156. (in loco deserto ad sepem horti botanici sponte. Jul.)

2. *S. nigra*: cymis quinquepartitis, stipulis duabus utrinque setaceis, foliis pinnatis: foliolis ovatis serratis, caule arboreo. *Fl. dan.* t. 545. (in hortis, ad sepes. Jun.)

*b. Sambucus laciniata*: foliis bipinnatis, pinnis ternatis: foliolis lanceolatis incisis. *Kniph. cent.* VIII. (in hortis.)

118. *ALSINE*. Calyx quinquepartitus. Petala quina aequalia. Capsula unilocularis trivalvis polysperma.

1. *A. media*: petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Fl. dan.* t. 438. et 525. (in cultis et hortis. Mai. Oct.)

## T E T R A G Y N I A .

119. *PARNASSIA*. Calyx quinquepartitus. Petala quina. Nectaria quina cordata ciliata: apicibus globosis.

1. *P. palustris*: foliis radicalibus cordatis, nectariis multisetis. *Fl. dan.* t. 584. (in pratis humidis et paludosis. Jul. Sept.)

P E N T A G Y N I A .

120. LINUM. Calyx pentaphyllus. Petala quina. Capsula quinquevalvis decemlocularis. Semina solitaria.

1. *L. usitatissimum*: calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Mart. rust. t. 133.* (in campis. Jun.)
2. *L. flavum*: calycibus acuminatis serrulato-scabris, foliis basi biglandulosis margine glabris, paniculae ramis dichotomis, corollis monopetalis, caule herbaceo. *Jacqu. austr. t. 214.* (in umbrosis haud frequens, in Swirlowa et Kupawna. Jun.)
3. *L. monopetalum*: corollis monopetalis quinquefidis. (in sylvis trans Occam. Jun. *Stephan.*)
4. *L. catharticum*: foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. dan. t. 851.* (in pratis pinguibus humidiusculis ad Mosquam fluvium. Jul. Aug.)

121. DROSERA. Calyx quinquefidus. Petala quina. Capsula unilocularis apice quinquevalvis. Semina plurima.

1. *D. rotundifolia*: scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Fl. dan. t. 1028.* (in paludosis turfosis. Jun. Jul.)
2. *D. longifolia*: scapis radicatis, foliis ovali-oblongis. *Fl. dan. t. 1093.* (cum praecedente, rarius. In Gorenki et Archangelsk. Jul.)



## P O L Y G Y N I A.

122. *MYOSURUS*. Calyx pentaphyllus basi adnatus. Corolla nulla. Nectaria quina lingulata petaliformia. Semina numerosa.

1. *M. minimus*: foliis linearibus integerrimis. *Fl. dan.* t. 406. (in agris, ruderatis, pascuisque arenosis. Mai. Jun.)

## H E X A N D R I A.

### MONOGYNIA.

123. *ALLIUM*. Umbella congesta. Spatha bivalvis multiflora. Corolla hexapetala patens. Capsula supera.

1. *A. rotundum*: caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, umbella globosa, floribus lateralibus nutantibus, (inter segetes circa pagum Tokarewa, nec non ad sylvarum margines versus Kunzowa. Jul.)
2. *A. carinatum*: caule planifolio bulbifero, umbella patula, pedunculis subnutantibus, staminibus subulatis, spathis longissime cuspidatis. *Hall. monogr.* t. 2. f. 2. (in montosis circa Kunzowa, et in montibus passerinis. Jun.)
3. *A. vineale*: caule tereti folio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Moris. hist.* II. t. 15. f. 4. (in campis ad urbem Colomna. Jul. *Stephan*)
4. *A. oleraceum*: caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subtus sulcatis, sta-

minibus simplicibus. *Hall. monogr.* t. 26. f. 2.  
(in campis. Jun.)

5. *A. Schoenoprasum*: scapo nudo adaequante folia teretia subulato - filiformia. *Fl. dan.* t. 971. (circa Petrowsk. Jun. Sine dubio cum solo urbano quondam transplantatum.)

124. ORNITHOGALUM. Spatha nulla. Corolla hexapetala erecta persistens supra medium patens. Filamenta basi dilatata. Capsula trilocularis supera. Semina subrotunda nuda.

1. *O. sylvaticum*: scapo anguloso basi diphylo, pedunculis simplicibus triquetris glabris. *Uster. nov. annal.* V. t. 1. f. 1. (in sylvis. Mai.)
2. *O. pratense*: [*luteum*] scapo anguloso basi monophyllo, foliis radicalibus linearibus, pedunculis umbellatis glabris, petalis lanceolatis. *Uster. nov. annal.* V. t. 2. f. 1. (in pratis, graminosis, sylvarumque marginibus. Mai.)
3. *O. spathaceum*: folio radicali solitario planiusculo: floralibus alternis, imo maximo spathaeformi, pedunculis ramosis corymbosis, petalis acutiusculis glabris. *Uster. ibid.* XV. t. 1. (in sylvaticis humidis, pratis, pomariis. Mai.)
4. *O. villosum*: [*minimum*] foliis radicalibus geminis: floralibus imis oppositis, pedunculis ramosis corymbosis petalisque hirsutis. *Uster. l. c.* V. t. 1. f. 2. (in campis, agris, oleraceis. In Ismailowa versus vivarium. Mai.)
5. *O. umbellatum*: racemo subcorymboso paucifloro, pedunculis fructiferis elongatis patentis-

simis, foliis linearibus glabris. *Jacqu. austr. t. 343.* (in pomariis, hortisque. Mai.)

125. *ASPARAGUS*. Calyx nullus. Corolla hexapetala erecta, petalis tribus interioribus apice reflexis. Bacca trilocularis, loculis dispermis.

1. *A. officinalis*: caule herbaceo tereti erecto, foliis setaceis fasciculatis, stipulis paribus basi mucronatis. *Fl. dan. t. 805.* (in campis arenosis ad Mosquam fluvium. Jun.)

126. *CONVALLARIA*. Calyx nullus Corolla hexafida. Bacca trilocularis maculosa supera.

1. *C. majalis*: scapo nudo semicylindrico laevi, floribus racemosis campanulatis nutantibus, foliis ovatis. *Fl. dan. t. 584.* (in sylvis, nemoribus, hortisque. Mai.)
2. *C. Polygonatum*: foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris *Fl. dan. t. 377.* (in nemorosis. Jun.)
3. *C. multiflora*: foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Fl. dan. t. 152* (in nemoribus et fruticetis. Jun.)

127. *ACORUS*. Spadix cylindricus tectus flosculis Calyx nullus. Corolla hexapetala nuda. Stylus nullus. Capsula trilocularis.

1. *A. Calamus*: scapi mucrone longissimo foliaceo. *Fl. dan. t. 1158.* (in paludibus, lacubus, stagnisque. Jun.)

128. *JUNCUS*. Calyx nullus. Corolla hexapetala. Stigmata tria. Capsula trilocularis trivalvis

polysperma, valvulis medio septiferis. Semina dissepimento affixa.

\* *Culmis nudis.*

1. *J. conglomeratus*: culmo nudo stricto, panicula laterali conglobata, capsulis retusis, floribus triandris. *Host. gram.* III. t. 82. (in humidis et uliginosis. Jun. Jul.)
2. *J. effusus*: culmo nudo stricto, panicula laterali supradecomposita effusa, capsulis clavatis apice truncatis. *Host. gram.* III. t. 83. (in locis paludosis, ad fossas. Jun.)
3. *J. filiformis*: culmo nudo filiformi nutante, umbella laterali subsimplici pauciflora, pedunculis subbifloris, capsulis obtusis. *Host. gram.* III. t. 84. (in turfosis uliginosis. Jun.)
4. *J. squarrosus*: culmo nudo, foliis setaceis subdistichis, capitulis terminalibus glomeratis aphyllis. *Fl. dan.* t. 430. (in collibus, pascuisque arenosis. Jun. Jul.)

\*\* *Culmis foliosis.*

5. *J. obtusiflorus*: [*adscendens*] culmo adscendente, foliis nodoso-articulatis subcompressis, panicula composita, petalis aequalibus obtusiusculis. *Host. gram.* III. t. 87. (in lacubus et fossis. Jun. Aug.)
6. *J. acutiflorus*: [*sylvaticus*] culmo erecto, foliis nodoso-articulatis teretibus, panicula supradecomposita, petalis aristatis: interioribus longioribus. *Host. gram.* III. t. 86. (in nemoribus humidis. Jul. Aug.)

7. *J. bulbosus*: culmo folioso simplici compressiusculo, foliis canaliculatis, corymbo terminali foliis floralibus brevior, capsula subrotunda obtusa petalis longior. *Host. gram.* III. t. 89. (in pascuis sterilibus, ad vias. Jun. Jul.)

8. *J. bufonius*: culmo folioso subramoso, foliis linearibus canaliculatis, panicula dichotoma, ramis multifloris, petalis acuminatis aequalibus capsula obtusa longioribus. *Host. gram.* III. t. 90. (in humidiusculis et inundatis arenosis, ad sepes et vias. Jun. Jul.)

129. *LUZULA*. Calyx nullus. Corolla hexapetala. Stigmata tria. Capsula unilocularis trivalvis trisperma. Semina receptaculo centrali affixa.

1. *L. pilosa*: [*Juncus pilosus*] foliis planis pilosis, corymbo terminali subcomposito, pedunculis unifloris nutantibus, petalis ovatis capsula brevioribus. *Host. gram.* III. t. 100. (in nemoribus et saltibus. Mai. Jun.)

*b. Luzula vernalis*: foliis planis pilosis, pedunculis simplicibus: inferioribus reflexis. *Hoffmann.* (in sylvaticis et nemorosis. Mai.)

2. *L. campestris*: [*Juncus campestris*] foliis planis pilosis, spicis pedunculatis umbellatis: intermedia sessili, petalis mucronatis capsula longioribus. *Fl. Lond.* t. 2. (in pascuis, campisque siccioribus. Jun.)

130. *BERBERIS*. Calyx hexaphyllus. Petala sexna ad ungues glandulis duabus. Stylus nullus. Bacca disperma.

1. *B. vulgaris*: racemis simplicibus pendulis, petalis obtusis integerrimis, foliis obovatis ciliato-serratis. *Fl. dan.* t. 904. (in dumetis, sepiusque vivis. Mai.)

b. *Berberis asperma*: baccis aspermis, aculeis multiplicibus. (in hortis passim.)

131. PEPLIS. Perianthium campanulatum: ore duodecimfido. Petala sena calyci inserta. Capsula bilocularis.

1. *P. Portula*: floribus hexandris axillaribus solitariis, foliis petiolatis subrotundo - ovatis. *Fl. dan.* t. 64. (in locis inundatis, paludosis, inque lacunis. Jul. Aug.)

## TRIGYNIA.

132. RUMEX. Calyx triphyllus. Petala terna conniventia. Semen unum triquetrum.

\* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

1. *R. Hydrolapathum*: floribus hermaphroditis, valvulis triangulari - ovatis integerrimis venosis, omnibus graniferis, foliis lanceolatis basi attenuatis. *Petiv. brit.* t. 2. f. 1. (in fossis, stagnis et piscinis. Jul.)
2. *R. crispus*: floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Fl. Lond.* 2. (in humidis et graminosis, ad sepes, viasque. Jul. Aug.)
3. *R. Nemolapathum*: [conglomeratus] floribus hermaphroditis, valvulis linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis



patentibus, foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis. (in nemoribus humidis. Jul. Aug.)

4. *R. maritimus*: floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis linearibus. *Fl. dan.* t. 1208. (in humidis, fossis. Jul. Aug.)

5. *R. acutus*: floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. *Blackw.* t. 491. (in pratis succulentis, umbrosis. Jun. Aug.)

6. *R. obtusifolius*: floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. *Fl. Lond.* 1. (in pascuis, pratis, viisque. Aug.)

\*\* *Hermaphroditi: valvulis granulo destitutis.*

7. *R. bucephalophorus*: floribus hermaphroditis, valvulis dentatis nudis, pedicellis planis reflexis incrassatis. *Colum. ecphr.* I. t. 150. (Exemplaria hujus plantae, hujusque in Italia indigenae visae, ad ripas Jausae fluminis legit. *Henning.* Jul.)

8. *R. aquaticus*: floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. *Blackw.* t. 490. (ad fossas et amnium litora, in paludibus et humidiusculis. Jul.)

\*\*\* *Floribus diclinis.*

9. *R. Acetosa*: floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Engl. bot.* t. 127. (in pascuis, pratis et hortis. Jun. Jul.)

10. *R. Acetosella*: floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Fl. dan.* t. 1161. (in pratis, pascuis, arvis, vallisque arenosis. Mai. Jun.)

*b. Rumex multifidus*: lobis multifidis. *Boccon. mus.* t. 26. (in clivis et arvis. Jun.)

133. **TRIGLOCHIN.** Calyx triphyllus inferus. Corolla tripetala calyciformis. Stigmata tria sessilia. Capsula tri-vel hexalocularis basi dehiscentis, loculis monospermis.

1. *T. palustre*: capsulis trilocularibus laevibus linearibus basi attenuatis. *Fl. dan.* t. 490. (in pratis, pascuisque depressis humidis. Jun. Jul.)

134. **VERATRUM. Hermaphroditi**: Calyx nullus. Corolla hexapetala. Stamina sena. Pistilla terna. Capsulae ternae polyspermae.

*Masculi*: Calyx nullus. Corolla luxapetala. Stamina sena. Pistilli rudimentum.

1. *V. album*: racemis paniculatis, bracteis ramorum oblongis, partialibus pedunculum pubescentem subaequantibus, floribus erectis, foliis ovalibus plicatis. *Fl. dan.* t. 1120. (in montosis. Jul.)

## P O L Y G Y N I A.

135. **ALISMA.** Calyx triphyllus. Petala terna. Capsulae plures monospermae.

1. *A. Plantago*: foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis. *Fl. dan.* t. 561. (in udis, aquis et paludibus. Jul. Aug.)

b. *Alisma angustifolium*: [*lanceolatum*] foliis lanceolatis, fructibus trigonis. Hoppe. (in locis siccioribus.)

## HEPTANDRIA.

### MONOGYNIA.

136. TRIENTALIS. Calyx heptaphyllus. Corolla septempartita aequalis plana. Bacca exsucca unilocularis.

1. *T. europaea*: foliis ovato-lanceolatis integerrimis. *Steph. icon.* t. 8. (in sylvis et juniperetis humidiusculis ad arborum truncos et circa lapides majores. Jun.)

137. CALLA. Spatha plana. Spadix tectus flosculis. Calyx nullus. Corolla nulla. Bacca polysperma.

1. *C. palustris*: foliis cordatis, spadice undique hermaphrodito. *Fl. dan.* t. 422. (in paludibus et aquis stagnantibus. Jun. Jul.)

## OCTANDRIA.

### MONOGYNIA.

138. OENOTHERA. Calyx quadrifidus tubulosus. Petala quaterna. Capsula tetralocularis quadrivalvis cylindrica infera polysperma. Semina nuda.

1. *O. biennis*: foliis ovato-lanceolatis planis, caule muricato-villoso, staminibus corolla bre-

vioribus. *Fl. dan.* t. 446. (in cultis et hortis. Jul. Aug.)

139. *EPILOBIUM*. Calyx quadrifidus tubulosus. Petala quaterna. Capsula oblonga infera. Semina comosa.

1. *E. spicatum*: [*angustifolium*] foliis sparsis lineari-lanceolatis integerrimis venosis, floribus inaequalibus, staminibus declinatis. *Fl. dan.* t. 239. (in paludibus, pratis humidis, fructicetis et nemoribus. Jun. Jul.)
2. *E. hirsutum*: [*grandiflorum*] foliis oppositis alternisque subamplexicaulibus ovato-lanceolatis serratis glabriusculis, venis hirsutis, caule ramosissimo hirsuto, radice stolonifera. *Fl. dan.* t. 326. (in humidiusculis. Jul. Aug.)
3. *E. pubescens*: [*parviflorum*] foliis oppositis alternisque subsessilibus lanceolatis denticulatis utrinque pubescentibus, caule simplici villosa. *Fl. dan.* t. 347. (in pratis et ad fossas. Jul.)
4. *E. montanum*: foliis oppositis ovatis dentatis, caule tereti, stigmate quadripartito. *Fl. dan.* t. 922. (in collibus, vallis et nemoribus. Jun. Jul.)
5. *E. roseum*: foliis oppositis alternisque ovato-lanceolatis petiolatis serratis glabris. *Engl. bot.* t. 693. (in nemoribus humidis. Jul.)
6. *E. tetragonum*: foliis lanceolatis denticulatis: imis oppositis, caule tetragono. *Fl. dan.* t. 1029. (in paludosis et uliginosis, Jul. Aug.)

7. *E. palustre*: foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Engl.bot.* t. 346. (in paludibus. Jul. Aug.)

140. *ACER. Hermaphroditi*: Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina octona. Pistillum singulum. Samarae binae ternaeve monospermae ala terminatae.

*Masculi*: Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina octona.

1. *A. tataricum*: foliis cordatis subincisis inaequalibus serratis, corymbis erectis. *Pall. flor. ross.* I. t. 3. (in hortis frequens. Mai.)

2. *A. platanoides*: foliis quinquelobis utrinque glabris, lobis dentibusque acuminatis, corymbis erectis, pedunculis glabris. *Kerner.* III. t. 17. (in sylvaticis montosis. Mai.)

b. *Acer laciniatum*: foliis quinquepartito-palmatis laciniatis crispis. (in hortis. Mai.)

3. *A. campestre*: foliis quinquelobis integerrimis, lobis obtusis: majoribus obsolete subsinuatis, corymbis erectis. *Engl. bot.* t. 304. (in sylvis, nemoribusque montosis, ad sepes. Mai.)

141. *Oxycoccus*. Calyx superus quadrifidus. Corolla quadripartita, laciniis sublinearibus revolutis. Filamenta conniventia. Antherae tubulosae bipartitae. Bacca polysperma.

1. *O. palustris*: [*Vaccinium Oxycoccus*] foliis ovatis integerrimis revolutis, caulibus filiformibus repentibus nudis. *Fl. dan.* t. 80. (in paludibus sphagno phagno repletis. Mai. Jun.)

142. *VACCINIUM*. Calyx superus quadridentatus. Corolla monopetala. Filamenta receptaculo inserta. Bacca quadrilocularis polysperma.

1. *V. Myrtillus*: pedunculis unifloris, foliis ovatis serratis deciduis, caule angulato. *Fl. dan.* t. 974. (in sylvis umbrosis. Mai.)

2. *V. uliginosum*: pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtusis laevibus. *Fl. dan.* t. 251. (in uliginosis nemorosis: circa Butirki et Archangelsk. Jun.)

3. *V. Vitis Idaea*: racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Fl. dan.* t. 40. (in sylvis siccioribus sterilibus. Mai.)

143. *CALLUNA*. Calyx duplex tetraphyllus. Corolla campanulata quadripartita. Filamenta receptaculo inserta. Antherae bifidae. Capsula quadrilocularis. Dissepimenta receptaculo centrali affixa.

1. *C. vulgaris*: [*Erica vulgaris*] foliis oppositis sessilibus sagittatis. *Fl. dan.* t. 677. (in campestribus, collibusque sterilibus et sic dictis ericetis. Jul. Sept.)

*b. Calluna hirsuta*: foliis pubescenti-incanis. (in paludosis ad Kuskowa. Aug.)

144. *DAPHNE*. Calyx nullus. Corolla quadrifida marcescens stamina includens. Drupa monosperma.

1. *D. Mezereum*: floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Fl. dan.* t. 268. (in sylvis, praesertim in sylva St. Annae, in



Astankina, Swirlowa, Kuskowa, Petrowsk.  
Mai.)

# TRIGYNIA.

145. POLYGONUM. Calyx nullus. Corolla quinquepartita calycina. Semen unum angulatum.

\* *Bistortae: spica unica.*

1. *P. Bistorta*: caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Fl. dan.* t. 421. (in pratis montosis. Jul.)

\*\* *Persicariae: pistillo bifido, aut stamina minus octo.*

2. *P. amphibium*: floribus pentandris semidigynis, spica ovata, ochreis margine laceris, foliis oblongis lanceolatisve.

a. *Polygonum aquaticum*: foliis oblongo-ellipticis obtusis natantibus, ochreis glabris, staminibus flore brevioribus. *Fl. dan.* t. 28. (in lacubus, fluviis, fossis. Jul. Aug.)

b. *Polygonum terrestre*: foliis ovato-lanceolatis acuminatis, ochreis pilosis, staminibus corolla longioribus. *Engl. bot.* t. 436. (in humidiusculis ad fossas et ripas, in paludibus. Jul. Aug.)

3. *P. Hydropiper*: floribus hexandris semidigynis distantibus, ochreis setoso-ciliatis, spicis filiformibus cernuis, foliis lanceolatis. *Fl. dan.* t. 282. (in subhumidis, ad fossas, fonticulos et paludes. Jul. Aug.)

4. *P. minus*: [intermedium] floribus hexandris submonogynis, foliis lineari-lanceolatis pla-

nis, spicis erectiusculis, caule basi repente. *Engl. bot.* t. 1048. (in uliginosis et umbrosis: in montibus passerinis, tribus montibus haud procul a fonte, circa Petrowsk in fossis. Jul.)

5. *P. lapathifolium*: floribus hexandris digynis, ochreis muticis, pedunculis scabris, seminibus utrinque concavis. *Fl. Lond.* 1. (in fossis et lacubus. Jun. Aug.)

6. *P. Persicaria*: floribus hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, petalis subtrinerviis, foliis lanceolatis glabris, ochreis abbreviatis laceris ciliatis. *Fl. dan.* t. 702. (in humidis et ad vias. Jul. Aug.)

7. *P. incanum*: floribus hexandris digynis, spicis oblongis, petalis subnerviis, foliis oblongo-lanceolatis subtus pubescentibus, ochreis abbreviatis laceris ciliatis. *Schrank. bavar.* I. t. 3. (in agris et humidiusculis. Jul. Aug.)

\*\*\* *Polygona*: foliis indivisis, floribus octandris.

8. *P. aviculare*: floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis caule procumbente herbaceo. *Fl. dan.* t. 803. (in cultis et ruderatis, ad vias et sepes. Jun. Aug.)

*b. Polygonum erectum*: foliis latioribus, caule erecto.

\*\*\*\* *Helxine*: foliis subcordatis.

9. *P. Fagopyrum*: foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. *Mart. rust.* t. 46. (inter segetes et in campis. Jul. Aug.)

10. *P. Convolvulus*: foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus obtusis. *Fl. dan.* t. 744. (in dumetis, agris, hortisque. Jun. Jul.)

11. *P. dumetorum*: foliis cordatis, caule volubili laevi, floribus carinato-alatis. *Fl. dan.* t. 756. (in fruticetis sepibusque vivis, in horto Imperiali. Jul. Aug.)

## T E T R A G Y N I A.

146. *PARIS*. Calyx tetraphyllus. Petala quaterna angustiora vel nulla. Bacca quadrilocularis.

1. *P. quadrifolia*: foliis quaternis, flore corollato. *Flor. dan.* t. 139. (in locis humidis umbrosis. Mai. Jun.)

b. *Paris quinquefolia*: [*pentaphylla*] foliis quinis senisve. (cum priore.)

147. *ADOXA*. Calyx bifidus inferus. Corolla quadrifida seu quinquefida supera. Bacca quadri-vel quinquelocularis calyce coalita.

1. *A. Moschatellina*: foliis radicalibus biternatis, caulinis ternatis oppositis, capitulo terminali quinquefloro. *Fl. dan.* t. 94. (in nemoribus humidis. Mai.)

## E N N E A N D R I A.

### H E X A G Y N I A.

148. *BUTOMUS*. Calyx nullus. Petala sena. Capsulae senae polyspermae.

1. *B. umbellatus*: foliis triquetris radicalibus, caule simplicissimo nudo. *Fl. dan.* t. 604. (in fluviis, fossis, lacubus. Jul. Aug.)

## DECANDRIA.

### MONOGYNIA.

149. *MONOTROPA*. Calyx nullus. Petala dena: quina exteriora basi excavato-mellifera. Capsula quinquevalvis.

1. *M. Hypopithys*: floribus glabris: lateralibus octandris, terminali decandro. *Fl. dan.* t. 232. (in sylvaticis umbrosis, in pini quercique radicibus parasitica; in Gorenki, Petrowsk, Archangelsk et Kuskowa Jul.)

150. *LEDUM*. Calyx quinquefidus. Corolla plana quinquepartita. Capsula quinquelocularis basi dohiscens polysperma.

1. *L. palustre*: [*Rosmarinus sylvestris*] foliis linearibus margine revolutis subtus tomentosis. *Du Ham. arb.* I. t. 67. (in paludibus, udis et uliginosis turfosis. e. g. in Butirki. Jun.)

151. *ANDROMEDA*. Calyx quinquepartitus. Corolla ovata, ore quinquefido. Capsula quinquelocularis, valvulis dissepimento contrariis.

1. *A. polifolia*: pedunculis aggregatis, corollis ovatis, foliis alternis lanceolatis revolutis. *Fl. dan.* t. 54. (in turfosis uliginosis, in Gorenki, Archangelsk, Butirki et Swirlowa. Mai. Jun.)

2. *A. calyculata*: pedunculis axillaribus solitariis secundis, bracteis binis, foliis ovalibus squamoso-punctatis obsolete serratis. *Pall. flor. ross.* I. t. 72. f. 1. (cum praecedente. Jun. Aug.)
152. ARBUTUS. Calyx quinquepartitus. Corolla ovata, ore basi pellucida. Bacca quinquelocularis supera.
1. *A. Uva ursi*: caulibus procumbentibus, foliis obovatis coriaceis integerrimis reticulato-venosis nitidis. *Fl. dan.* t. 33. (in sylvis arenosis. Mai.)
153. PYROLA. Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Capsula quinquelocularis, angulis dehiscens.
1. *P. rotundifolia*: staminibus adscendentibus, pistillo declinato, foliis obovalibus. *Fl. dan.* t. 110. (in sylvis. Jun. Jul.)
2. *P. virens*: staminibus adscendentibus, pistillo declinato corolla vix longiore, foliis orbiculatis. *Rivin. pent.* t. 496. f. 1. (in sylvis cum praecedente. Jun. Jul.)
3. *P. minor*: floribus racemosis dispersis, staminibus pistillisque rectis. *Fl. dan.* t. 55. (cum priori, rarius. Jul.)
4. *P. secunda*: racemo unilaterali, foliis ovatis serratis, pistillo recto longissimo. *Fl. dan.* t. 402. (in fruticetis et sylvis. Jun. Jul.)
5. *P. umbellata*: pedunculis subumbellatis, foliis lanceolatis. *Steph. icon.* II. t. 9. (cum reliquis generis sui occurrit in Gorenki, Archangelsk et Kuskowa. Jun.)
6. *P. uniflora*: scapo unifloro, foliis suborbiculatis. *Steph. icon.* II. t. 13. (cum antecedente.)

# DIGYNIA.

154. **CHRYSOSPLENIUM.** Calyx quadri-senquiquefidus coloratus. Corolla nulla. Capsula birostris unilocularis polysperma.

1. *C. alternifolium*: foliis alternis. *Fl. dan.* t. 336, (in opacis humentibus. Mai.)

155. **SCLERANTHUS.** Calyx monophyllus quinqueidentatus. Corolla nulla. Semina bina calyce inclusa.

1. *S. annuus*: calycibus fructus patulis acutis, caulibus patentibus. *Fl. dan.* t. 504. (in arenosis. Mai. Jun.)
2. *S. perennis*: calycibus fructus clausis obtusis margine membranaceis, caulibus procumbentibus. *Fl. dan.* t. 563 (in campis apricis arenosis. Jun. Jul.)

156. **GYPHOPHILA.** Calyx monophyllus campanulatus angulatus. Petala quina ovata sessilia. Capsula globosa unilocularis.

1. *G. muralis*: foliis linearibus planis internodiis brevioribus, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. *Schkuhr.* t. 120. (in siccis arenosis, inter segetes, ad vias, in muris. Jun. Sept.)

157. **SAPONARIA.** Calyx monophyllus nudus. Petala quina unguiculata. Capsula oblonga unilocularis.

1. *S. officinalis*: calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Fl. dan.* t. 543. (in pratis, circa domos, ad sepes. Jul. Aug.)



*b. Saponaria hortensis*: flores rubro albove pleno. (in hortis.)

158. *DIANTHUS*. Calyx cylindricus monophyllus, basi squamis quatuor munitus. Petala quina unguiculata. Capsula cylindrica unilocularis polysperma.

1. *D. collinus*: [*ruthenus*] floribus aggregatis subgeminato-fasciculatis, squamis ovatis cuspidatis tubo brevioribus, foliis lineari-lanceolatis quinquenerviis cauleque scabris. *Waldst et Kitaib. pl. hung. I. t. 38.* (in collibus arenosis. Jun. Jul.)

2. *D. deltoides*: floribus solitariis, squamis calycinis ovato-lanceolatis binatis, foliis linearibus acutis cauleque pubescentibus, petalis crenatis. *Fl. dan. t. 577.* (in pascuis, campis et nemoribus. Jun. Jul.)

*b. Dianthus reptans*: ramis longereptantibus. (in collibus arenosis.)

3. *D. arenarius*: caulibus subunifloris, squamis calycinis ovatis obtusis, corollis multifidis, foliis linearibus. (in graminosis siccioribus arenosis. Jul.)

## TRIGYNIA.

159. *CUCUBALUS*. Calyx inflatus. Petala quina unguiculata absque corona ad faucem. Capsula trilocularis.

1. *C. Beken*: calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corol-

lis subnudis. *Fl. dan.* t. 914. (in pratis et nemoribus. Jun. Jul.)

*b. Cucubalus pallidus*: foliis ovato-acuminatis, calycibus inflatis decoloribus, corollis albis. (in pascuis.)

2. *C. viscosus*: floribus lateralibus undique decumbentibus, caule indiviso, foliis basi reflexis. (in tribus montibus, montibusque passerinis et Kupawna. Jul.)

3. *C. tataricus*: petalis bifidis, floribus secundis decumbentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo. (in montosis arenosis sylvaticis, montibus passerinis, tribus montibus, Kunzowa. Jul.)

160. *SILENE*. Calyx ventricosus. Petala quina unguiculata coronata ad faucem. Capsula trilocularis.

1. *S. nutans*: floribus paniculatis secundis nutantibus, petalis bifidis, caule adscendente, foliis lanceolatis scabris. *Fl. dan.* t. 242. (in sylvis, nemoribus, pratis, arvisque aridis. Mai. Jun.)

2. *S. baccifera*: [*Cucubalus bacciferus*] calycibus fructiferis cernuis inflatis laevibus, capsulis coloratis, ramis divaricatis. *Gmel. in act. petropol.* 1759. Vol. XIV. t. 17. f. 1. (in nemoribus et fluvium amnibus, in Kunzowa, Perowa et montibus passerinis. Jul. Aug.)

3. *S. noctiflora*: calycibus decemangularibus, dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo, petalis bifidis. *Engl. bot.* t. 291. (in locis incultis, ruderatis, nemoribusque. Jun. Aug.)

161. STELLARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quina bipartita. Capsula unilocularis polysperma.

1. *S. nemorum*: foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Fl. dan.* t. 271. (in nemoribus et umbrosis. Jun. Jul.)
2. *S. Holostea*: foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. *Fl. dan.* t. 698. (in nemoribus et sylvis. Mai. Jun.)
3. *S. arvensis*: [*graminea*] foliis lineari-subulatis margine laevibus, panicula divaricata, petalis bipartitis longitudine calycis. *Fl. dan.* t. 414. (in hortis, pomariis et sylvis, ad sepes et domos. Jun. Jul.)
4. *S. palustris*: [*glauca*] foliis lineari-lanceolatis integerrimis, floribus paniculatis, petalis bipartitis calyce majoribus. *Gmel. flor. sib.* IV. t. 61 f. 2. (in paludibus. Jun. Aug.)
5. *S. uliginosa*: foliis elliptico-lanceolatis, pedunculis subgeminatis paucifloris, petalis calyce brevioribus, caule quadrangulo decumbente. *Fl. dan.* t. 415. (in paludosis et uliginosis. Jun. Jul.)

162. ARENARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quina integra. Capsula unilocularis polysperma.

1. *A. trinervia*: foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Fl. dan.* t. 429. (in sylvis, ad vias et in hortis. Jun. Aug.)
2. *A. serpyllifolia*: foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Fl. dan.* t. 377. (in arvis et sylvis arenosis. Mai. Sept.)

3. *A. campestris*: [rubra] foliis filiformibus mucronulatis internodio brevioribus, caulibus prostratis glabris, seminibus compresso-angulatis scabriusculis. *Loesel. pruss.* t. 63. (in collibus arenosis, inter segetes. Jun. Aug.)

*b. Arenaria urbana*: ramosissima, caulibus adscendentibus, calycibus pilosis. (in arenosis, ad sepes et in hortis. Jul. Aug.)

## P E N T A G Y N I A.

163. *SEDUM*. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Squamae quinae nectariferae ad germinum basin. Capsulae quinae uniloculares polyspermae.

1. *S. Telephium*: foliis oblongis serratis, corymbo composito folioso, caule erecto. *Fl. dan.* t. 686. (in sylvis collibusque siccissimis arenosis, in vallis, muris, tectisque. Jul. Aug.)

*b. Sedum purpureum*: floribus purpureis. (in arvis et campis aridis arenosis, inter segetes.)

2. *S. acre*: foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Engl. bot.* t. 839. (in campis vallisque siccissimis sterilissimis, in muris et tectis. Jun. Aug.)

3. *S. sexangulare*: foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. *Decand.* t. 118. (in campis apricis. Jun. Jul.)

164. *OXALIS*. Calyx pentaphyllus. Petala quina unguibus connexa. Stamina inaequalia: quina exteriora breviora basi connata. Capsula angulis dehiscens pentagona.

1. *O. Acetosella*: acaulis, scapo unifloro foliis longiore, foliis ternatis obcordatis, stylis longitudine staminum interiorum, radice articulata. *Fl. dan.* t. 980. (in sylvis umbrosis ad arborum adultiorum truncos. Mai.)

*b. Oxalis purpurascens*: corollis purpurascens. (in Sokolnika.)

165. AGROSTEMMA. Calyx monophyllus coriaceus. Petala quina unguiculata, limbo obtuso indiviso. Capsula unilocularis.

1. *A. Githago*: hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. *Fl. dan.* t. 576. (inter segetes. Jul. Aug.)

*b. Agrostemma alba*: corollis albis. (in hortis. Jul. Aug.)

166. LYCHNIS. Calyx monophyllus oblongus laevis. Petala quina unguiculata, limbo saepe bifido. Capsula quinquelocularis.

1. *L. Flos cuculi*: petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Fl. dan.* t. 590. in pratis humidiusculis. Jun. Jul.)

2. *L. Viscaria*: petalis integris, caule geniculis viscoso. *Fl. dan.* t. 1032. (in nemoribus, pratisque siccis. Jun.)

3. *L. pratensis*: [dioica] petalis (albis) bifidis, floribus dioicis, capsulis conicis, caule foliisque pubescentibus. *Fl. dan.* t. 792. (in agrorum versuris, inter segetes, ad domos. Jun. Aug.)

4. *L. sylvestris*: petalis (rubris) bifidis, floribus dioicis, capsulis subrotundo-ovatis, caule pedunculisque hirsutis, foliis pubescentibus.



*Schkuhr. t. 124.* (in sylvis et graminosis humidiusculis. Jul. Aug.)

167. CERASTIUM. Calyx pentaphyllus. Petala quina bifida. Capsula unilocularis apice dehiscens.

1. *C. vulgatum*: erectiusculum hirsutum superne subviscosum, foliis lanceolatis, calycibus acutiusculis petala subaequantibus, capsulis pedicello brevioribus. *Fl. Lond.* 2. (in siccioribus, cultis et hortis. Mai. Jun.)

2. *C. semidecandrum*: procumbens villosò-viscosum subincanum, foliis ovato-oblongis, calycibus acuminatis petala aequantibus, capsulis pedicello brevioribus. *Fl. dan. t. 1212.* (in pascuis sterilibus apricis. Mai. Jun.)

3. *C. arvense*: caulibus declinatis, foliis lineari-lanceolatis subpubescentibus, petalis calyce longioribus, capsula oblonga dentibus obliquis dehiscente. *Fl. dan. t. 626.* (in arvis et campis. Mai. Jun.)

4. *C. aquaticum*: foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Engl. bot. t. 538.* (in humidis, pratis paludosis, ad lacuum fossarumque ripas. Jun. Sept.)

168. SPERGULA. Calyx pentaphyllus. Petala quina integra. Capsula ovata unilocularis quinquevalvis.

1. *S. arvensis*: foliis verticillatis, pedunculis fructiferis reflexis, seminibus reniformibus. *Fl. dan. t. 1033.* (in arvis arenosis siccis, inter segetes. Jun. Aug.)



2. *S. nodosa*: foliis oppositis laevibus subulatis, superioribus fasciculatis, calyce inermi. *Fl. dan.* t. 96. (in pascuis arenosis humidis, in paludibus. Jul. Aug.)

## D O D E C A N D R I A.

### MONOGYNIA.

169. *ASARUM*. Calyx tri - quadrifidusve germi-  
ni insidens. Corolla nulla. Capsula coriacea co-  
ronata subsexlocularis polysperma.

1. *A. europaeum*: foliis reniformibus obtusis gla-  
bris geminatis, calyce trifido. *Fl. dan.* t. 633.  
(in nemoribus umbrosis, praesertim ad caudi-  
ces coryli. Mai.)

170. *LYTHRUM*. Calyx duodecimdentatus. Pe-  
tala sena calyci inserta. Capsula bilocularis poly-  
sperma.

1. *L. Salicaria*: foliis oppositis cordato-lanceo-  
latis, floribus spicatis dodecandris. *Fl. dan.* t.  
671. (in humidis, ad fossas. Jun.)

b. *Lythrum quadrifolium*: foliis quaternis  
lanceolatis (circa Kupawna.)

### T R I G Y N I A.

171. *EUPHORBIA*. Calyx monophyllus ventrico-  
sus. Corolla tetra - seu pentapetala. Germen pedi-  
cellatum. Capsula tricocca.

1. *E. Peplus*: umbella trifida: dichotoma, invo-  
lucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis pe-

tiolatis. *Fl. dan.* t. 1100. (in cultis, oleraceis, hortis. Mai. Aug.)

2. *E. helioscopia*: umbella quinquefida: bifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis glabris, capsulis laevibus. *Fl. dan.* t. 725. (in cultis. Jun. Jul.)

3. *E. Esula*: umbella multifida: bifida, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus, foliis uniformibus *Blackw.* t. 163. (in agris, viis, campis, vallisque arenosis. Mai. Jul.)

*b. Euphorbia latifolia*: major, foliis latioribus. (in paludosis umbrosis.)

4. *E. palustris*: umbella multifida: bi-trifida: bifida involucellis ovatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. *Fl. dan.* t. 866. (in humidis et paludosis. Mai. Aug.)

## D O D E C A G Y N I A.

172. **SEMPERVIVUM.** Calyx duodecimpartitus. Petala duodena. Capsulae duodenae polyspermae.

1. *S. tectorum*: foliis ciliatis, propaginibus patulis, floribus dodecandris dodecagyniis, nectariis cuneiformibus carunculatis. *Fl. dan.* t. 601. (in collibus, siccis, muris, tectisque. Jul.)

2. *S. globiferum*: foliis ciliatis, propaginibus globosis. *Schmid. icon.* t. 26. (in collibus arenosis. Jul.)

# I C O S A N D R I A .

## M O N O G Y N I A .

173. PRUNUS. Calyx quinquefidus inferus. Petala quina. Drupae nux suturis prominulis.

1. *P. Padus*: floribus racemosis, racemis pendulis, foliis deciduis duplicato-serratis subrugosis, petiolis biglandulosis. *Fl. dan.* t. 205. (in nemoribus et hortis Mai.)

2. *P. spinosa*: pedunculis solitariis, foliis elliptico-lanceolatis subtus pubescentibus, fructibus rectis, ramis spinosis. *Fl. dan.* t. 926. (in sepibus vivis, ad vias, in desertis Mai.)

3. *P. insiticia*: pedunculis geminis, foliis lanceolato-ovatis convolutis subtus villosis, ramis spinescentibus, fructibus subrotundis. *Kern.* IV. t. 29. (in sepibus et hortis Mai. Jun.)

## D I G Y N I A .

174. AGRIMONIA. Calyx hypocrateriformis: tubo fauce constricto, limbo quinquepartito. Petala quina calyci inserta. Semina bina calyce inclusa.

1. *A. Eupatoria*: calycibus fructiferis hispidis, foliis caulinis pinnatis, foliolis oblongo-ovatis, spicis elevatis, petalis calyce duplo longioribus. *Fl. dan.* t. 588 (in sylvis, nemoribus, sepibus, vallisque Jul. Aug.)

## T R I G Y N I A .

175. SORBUS. Calyx quinquefidus. Petala quina. Pomum triloculare, loculis monospermis.

1. *S. aucuparia*: foliis pinnatis, foliolis duplicato-serratis glabriusculis, petiolo communi pubescente. *Fl. dan. t. 1034.* (in nemorosis, hortisque. Jun.)

## P E N T A G Y N I A .

176. *MESPILUS*. Calyx quinquefidus. Petala quina. Bacca di - seu pentasperma.

1. *M. Oxyacantha*: [*Crataegus Oxyacantha*] foliis obtusis subtrifidis serratis glabris, floribus digynis, pedunculis calycibusque subglabriusculis, calycinis segmentis lanceolatis acutis. *Fl. dan. t. 634.* (in sepibus vivis. Jun.)

2. *M. monogyna*: foliis acutis subtrifidis serratis glabris, floribus monogynis, pedunculis calycibusque subpubescentibus, calycinis segmentis lanceolatis acuminatis. *Fl. dan. t. 1162.* (cum priore. Jun.)

177. *SPIRAEA*. Calyx quinquefidus. Petala quina. Capsulae quinae pluresve bivalves polyspermae.

1. *S. salicifolia*: foliis oblongo-lanceolatis serratis basi cuneatis glabris, racemis conferto-paniculatis. *Pall. fl. ross. I. t. 21.* (in sylva Astankina. Jul. Aug.)

2. *S. Filipendula*: foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus corymbosis. *Fl. dan. t. 635.* (in pratis, pascuisque montosis, in sylvis. Jul.)

3. *S. Ulmaria*: foliis pinnatis subtus tomentosis, impari majore trilobo, lateralibus indivisis,

corymbis proliferis. *Fl. dan.* t. 547. (in pratis uliginosis umbrosis. Jun. Jul.)

## P O L Y G Y N I A.

178. *ROSA*. Calyx urceolatus quinquefidus carnosus, collo coarctatus. Petala quina. Semina plurima hispida calycis interiori lateri affixa.

1. *R. cinnamomea*: [*majalis*] germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. *Fl. dan.* t. 1214. (in sylvaticis, circa Gorenki, Kuskowa, et Archangelsk. Jun.)

2. *R. canina*: germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Fl. dan.* t. 551. (in dumetis, sepibus, ad vias. Jun.)

179. *RUBUS*. Calyx quinquefidus. Petala quina. Bacca composita acinis monospermis.

1. *R. Idaeus*: foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. dan.* t. 788 (in nemoribus, hortisque. Jun.)

b. *Idaeus albus*: fructibus albidis. *Du Ham. arb.* t. 10. (in hortis.)

2. *R. caesius*: foliis ternatis subnudis, lateralibus bilobis, caule aculeato tereti. *Fl. dan.* t. 1213. (in dumetis et sylvis. Jul. Aug.)

3. *R. corylifolius*: foliis subquinatis subtus pilosis, lateralibus sessilibus, aculeis rectiusculis, calycibus fructus inflexis. *Engl. bot.* t. 827. (in montibus passerinis, Zarizina, Swirlowa, Jun. Jul.)



4. *R. fruticosus*: foliis subquinnatis subtus tomentosis, foliolis petiolatis, aculeis aduncis, caule angulato, calyce reflexo. *Fl. dan. t. 1163.* (in nemoribus et sylvis. Jun. Sept.)

5. *R. saxatilis*: foliis ternatis, flagellis reptantibus herbaceis. *Fl. dan. t. 134.* (in sylvis nemoribusque, locis saxosis. Jun. Jul.)

180. FRAGARIA. Calyx decemfidus. Petala quina. Receptaculum seminum ovatum, baccatum deciduum.

1. *F. vesca*: calyce fructus reflexo, pubescentia petiolorum patentissima, pedunculorum adpressa. *Blackw. t. 77.* (in sylvis, nemoribus, pascuis, collibusque siccis sterilibus. Mai. Jul.)

b. *Fragaria sylvestris*: serratura terminali proximis paulo longiore. *Schkuhr. t. 45.* (in pascuis pratisque. Mai.)

c. *Fragaria semperflorens*: pedunculis nonnullis radicalibus. (in hortis. Mai. Sept.)

d. *Fragaria alba*: fructibus albis. (in hortis. Jun.)

2. *F. collina*: calyce fructus erecto, foliis acute serratis utrinque pubescentibus, pubescentia pedunculorum erecta, petiolorum patentissima, (in sylvaticis siccis circa Gorenki et in Perowa, Jun.)

3. *F. elatior*: calyce fructus reflexo, pubescentia pedunculorum et petiolorum patentissima. *Loebel, icon. I. t. 677.* (in locis desertis graminosis et in hortis. Mai. Jun.)



181. *POTENTILLA*. Calyx decemfidus. Petala quina. Semina subrotunda nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

\* *Foliis pinnatis.*

1. *P. Anserina*: foliis interrupte pinnatis sericeis, foliolis argute serratis, caule repente, pedunculis unifloris. (in fossis siccis, pascuis sterilibus, ad vias et sepes. Jun. Aug.)

*b. Anserina sericea*: [*cana*] foliis utrinque sericeis. (in solo argilloso occurrit.)

2. *P. supina*: foliis pinnatis, foliolis oblongis profunde dentatis, caule decumbente dichotomo, pedunculis axillaribus solitariis. *Pluk. alm. t. 106, f. 7.* (in inundatis, ad fluvios. Jun. Aug.)

\*\* *Foliis digitatis.*

3. *obscura*: [*salisburgensis?*] foliis septenatis quinatisque, foliis lanceolatis grosse dentatis, petalis obcordatis calycem aequantibus, caule erecto. (in Sokolnika. Jul. Aug.)

4. *P. argentea*: foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. *Fl. dan. t. 865,* (in ruderatis, ad vias. Jun. Aug.)

5. *P. intermedia*: foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, caule erectiusculo ramosissimo. (in ruderatis, ad sepes. Jul.)

6. *P. verna*: foliis quinatis obovatis dentatis pubescentibus, petalis obcordatis calyce majoribus, caulibus declinatis. *Engl. bot. t. 37.* (in nemoribus, pascuis editioribus et collibus aridis. Mai.)

7. *P. reptans*: foliis quinatis cuneiformibus argute serratis, stipulis lanceolatis integerrimis, pedunculis axillaribus unifloris, caule procumbente sarmentoso. *Fl. dan.* t. 1164. (in ripa declivi Occae. Jun. Aug. *Stephan.*)

\*\*\* *Foliis ternatis.*

8. *P. norvegica*: foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. *Fl. dan.* t. 171. (in agris arenoso-glareosis Jul. Aug.)

9. *P. ruthenica*: foliis radicalibus subpinnatis, caulinis ternatis, foliolis ovatis profunde serratis, utrinque cauleque adpresso-pilosis, pedunculis alaribus solitariis. *Moris. hist.* II. t. 20, f. 2. (in arvis, ad sepes. Jul. Aug.)

182. TORMENTILLA. Calyx octofidus. Petala quaterna. Semina subrotunda nuda receptaculo parvo exsucco affixa.

1. *T. erecta*: [*officinalis*] caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Fl. dan.* t. 589 (in pascuis, campis, versurisque sterilibus. Jun. Jul.)

183. GEUM. Calyx decemfidus. Petala quina. Semina arista geniculata.

1. *G. urbanum*: floribus erectis, aristis uncinatis nudis, foliis caulinis ternatis, radicalibus lyrato-pinnatis. *Fl. dan.* t. 672. (in umbrosis et dumetis, ad sepes et domos. Jun.)

2. *G. intermedium*: floribus nutantibus, petalis longitudine calycis, aristis uncinatis nudis, seminibus pilosis, foliis radicalibus lyrato-pinnatis, caulinis ternatis. *Petiv. brit.* t. 40, f. 2. (in ruderatis, umbrosis, sepibusque. Jun. Aug.)

3. *G. rivale*: floribus nutantibus, petalis longitudine calycis, aristis plumosis medio tortis, foliis radicalibus lyrato-pinnatis, caulinis simplicibus trifidis. *Fl. dan.* t. 722. (in pratis humidis, nemoribus. Jun.)

184. COMARUM. Calyx decemfidus. Petala quina. Receptaculum seminum ovatum spongiosum persistens.

1. *C. palustre*: foliis pinnatis, petalis calyce minoribus. *Fl. dan.* t. 636. [(in pratis uliginosis. Jun. Aug.)]

## P O L Y A N D R I A.

### M O N O G Y N I A.

185. ACTAEA. Calyx tetraphyllus. Corolla tetrapetala. Bacca unilocularis. Semina semiorbiculata.

1. *A. spicata*: racemo ovato, petalis staminibus longioribus, fructibus baccatis. *Fl. dan.* t. 498. (in nemoribus montosis. Mai. Jun.)

186. CHELIDONIUM. Calyx diphyllus. Petala quaterna. Siliqua supera bivalvis unilocularis. Semina plurima cristata.

1. *C. majus*: pedunculis umbellatis, foliorum pinnis sublobatis obtuse dentatis, petalis integerrimis. *Fl. dan.* t. 542. (in ruderalis et hortis. Jun. Aug.)

2. *C. laciniatum*: [*quercifolium*] pedunculis umbellatis, foliorum pinnis pinnatifido-laciniatis

acute dentatis, petalis incis. *Mill. dict. t. 92.*  
(in ripa utraque Mosquae et Jausae amnis. Jul.)

187. *PAPAYER*. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala. Capsula unilocularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.

1. *P. Rhoeas*: capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incis. *Engl. bot. t. 645.* (inter segetes, in hortis. Jun. Jul.)

2. *P. somniferum*: calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis. glaucis. *Blackw. t. 482.* (in oleraceis, hortisque. Jun. Aug.)

h. *Papaver plenum*: petalis numerosis omnium gradationum rubicundis albisque. *Blackw. t. 483.* (in hortis)

188. *NYMPHAEAE*. Calyx tetra - pentaphyllusve. Corolla polypetala. Bacca multilocularis, loculis polyspermis.

1. *N. lutea*: foliis cordatis integerrimis, lobis approximatis, calyce pentaphyllo petalis longiore. *Fl. dan. t. 603.* (in stagnis, fluviis, lacubus. Jul. Aug.)

2. *N. alba*: [*Castalia speciosa*] foliis cordatis integerrimis, lobis imbricatis rotundis, calyce tetraphyllo. *Fl. dan. t. 602.* (in aquis stagnantibus. Jun. Aug.)

189. *TILIA*. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula coriacea evalvis quinquelocularis, loculis quaternis abortientibus, monosperma.

1. *T. microphylla*: [*parvifolia*] foliis cordato-subrotundis acuminatis argute serratis, nuce

subglobosa vix costata fragili. *Fl. dan.* t. 555:  
(in sylvis, nemoribusque. Jul.)

2. *T. platyphylla*: [*grandifolia*] foliis cordato-subrotundis acuminatis inaequaliter serratis, nuce turbinata costata lignosa. *Schkuhr.* t. 141.  
(ad pagos, in hortis. Jun.)

## T R I G Y N I A.

190. DELPHINIUM. Calyx corollinus submonophyllus quinquepartitus, lacinia superiore calcarata. Petalum unicum seu duo, nectario calcarato terminatum. Capsulae tres seu una.

1. *D. Consolida*: germine glabro solitario, calcare calycem excedente, caule ramoso, foliis linearibus multipartitis. *Fl. dan.* t. 683. (in agris arvisque restibilibus Jul. Aug.)

2. *D. elatum*: nectariis diphyllis, labellis ovatis emarginatis, laciniis brevissimis inaequalibus, foliis subpeltatis tripartitis, laciniis multifidis. *Mil. ic.* t. 250. f. 2. (circa monasterium St. Simeonis *Adam*; et in campis trans pontem Dragomilovensem. Jun. *Henning.*)

191. ACONITUM. Calyx corollinus pentaphyllus, foliolo superiori concavo galeato. Petala bina superiora ungue longissimo incurvo canaliculato nectariis calcaratis terminato, inferiora linearia. Capsulae ternae seu quinae erectae.

1. *A. Lycoctonum*: cuculli calcare spirali, labio emarginato ovato, calycis galea conica elongata, foliis palmatis pubescentibus, laciniis tri-



fidis dentatis. *Jasqu. austr.* t. 380. (in sylvis montosis. Jul. Aug.)

2. *A. septentrionale*: cuculli calcare revoluto, labio subemarginato spathulato, calycis galea conica elongata, foliis palmatis pubescentibus, laciniis trifidis divaricatis dentatis. *Fl. dan.* t. 123. (in nemorosis umbrosis. Jul.)

## P E N T A G Y N I A.

192. *AQUILEGIA*. Calyx nullus. Corolla pentapetala. Nectaria quina, foliolis calcaratis, inter petala. Capsulae quinae distinctae.

1. *A. vulgaris*: nectariis incurvis corollam subaequantibus, foliis ternatis, foliolis tripartitis subrotundis crenatis. *Fl. dan.* t. 695. (in nemoribus hortisque. Jun.)

Variat corollis caeruleis rubris, albisque, nec non floribus plenis.

## P O L Y G Y N I A.

193. *PULSATILLA*. Calyx nullus. Corolla hexapetala. Semina plura caudata, cauda plumosa.

1. *P. vulgaris*: [*Anemone Pulsatilla*] scapo involucrato unifloro, petalis rectis, nectariis pedicellatis, foliis bipinnatis incisis. *Fl. dan.* t. 153. (in collibus apricis, montibus passerinis. Mai.)
2. *P. pratensis*: scapo involucrato unifloro villosissimo, petalis apice reflexis, nectariis pedicellatis, foliis bipinnatis incisis. *Fl. dan.* t. 611. (in campis apricis umbrosis circa Kupavna. Mai.)



194. ANEMONE. Calyx nullus. Corolla pentasque enneapetala. Semina plura caudata.

1. *A. sylvestris*: caule bifloro folioso, foliis tripartitis, laciniis trifidis dentatis, seminibus subrotundis lanatis, stigmate persistente. *Kniph. cent.* V. n. 12. (in sylvaticis montosis circa equariam Pachrinae. Mai)

2. *A. nemorosa*: caule unifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis lanceolatis trifido-dentatis, corolla hexapetala. *Fl. dan.* t. 549. (in nemoribus, dumetis, pratisque aquosis. Mai.)

*b. Anemone violacea*: corollis violaceo-lilacinis. (cum praecedente.)

3. *A. ranunculoides*: caule subbifloro, foliis caulinis ternis ternatis, foliolis subtrifidis apice dentatis, petalis oblongis obtusis patentibus. *Fl. dan.* t. 140. (in nemorosis, dumetis. Mai)

195. THALICTRUM. Calyx nullus. Petala quaterna vel quina. Semina ecaudata.

1. *T. minus*: foliolis subrotundis trifidis incisis, floribus cernuis. *Fl. dan.* t. 732. (in pratis, collibusque herbidis, rarius Jul.)

2. *T. angustifolium*: foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Pluk. almag.* t. 65. f. 6. (in pratis humidis, sylvarumque marginibus. Jun. Jul.)

3. *T. flavum*: caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Fl. dan.* t. 939. (in pratis, nemoribusque subhumidis. Jul. Aug.)

4. *T. aquilegifolium*: fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. *Jacqu. austr.* t. 518. (in pratis et umbrosis. Jul.)

196. *FICARIA*. Calyx triphyllus. Petala octona vel novena, ungue nectarifero. Semina compressa obtusa nuda.

1. *F. verna*: [*Ranunculus Ficaria*] radice tuberosa fasciculata, caule decumbente, foliis cordatis angulatis petiolatis. *Fl. dan.* t. 499. (in dumetis umbrosis, udisque. Mai.)

197. *RANUNCULUS*. Calyx pentaphyllus. Petala quina, intra unguem poro mellifero. Semina nuda.

\* *Foliis simplicibus.*

1. *R. Flammula*: foliis ovato-lanceolatis obtusiusculis petiolatis, caule declinato. *Fl. dan.* t. 575. (in pascuis udis, ad margines lacuum fossarumque. Jul. Sept.)

2. *R. Lingua*: foliis lanceolatis acuminatis, caule erecto multifloro. *Fl. dan.* t. 755 ) in fossis, lacubus et paludibus. Jul. Aug.)

\*\* *Foliis dissectis et divisis.*

3. *R. cassubicus*: foliis radicalibus subrotundo-cordatis crenatis, caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. *Loesel. pruss.* t. 72. (in nemoribus et sylvis, in Petrowsk, Astankina, Swirlowa, sylva St. Mariae, et alibi. Mai.)

4. *R. auricomus*: foliis radicalibus reniformibus crenatis incis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Fl. dan.* t. 665. (in nemoribus, pascuisque humidis. Mai.)

5. *R. sceleratus*: foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, floralibus lanceolatis petiolatis, fructibus oblongis. *Fl. dan.* t. 571. (in

paludibus, fossis, locis inundatis vadosis. Jul. Aug.)

6. *R. aconitifolius*: foliis quinquelobis dentatis, lobis acuminatis, intermediis trifidis, floralibus summis digitatis sessilibus lanceolatis. *Curt. mag.* t. 204. (in montibus passerinis, monticulisque ad Kunzowa. Jun.)

7. *R. bulbosus*: calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto multifloro, foliis compositis, radice bulbosa. *Fl. dan.* t. 551. (in pascuis, pratis, hortisque. Mai. Jun.)

*b. Ranunculus campestris*: bulbo radicali carente. (in campis.)

8. *R. hirsutus*: [*Philonotis*] foliis ternatis, superioribus trifidis linearibus, caule erecto multifloro hirsuto, calycibus acuminatis demum retroflexis, radice fibrosa. *Fl. Lond.* n. 15. (in locis udis prope Astankina, in sylva St. Mariae et Sokolnika. Jun. Jul.)

9. *R. repens*: calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Fl. dan.* t. 795. (in pascuis, agris, cultis, hortisque. Jun. Aug.)

10. *R. acris*: calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, summis linearibus. *Engl. bot.* t. 652. (in pratis et pascuis. Jun. Jul.)

*b. Ranunculus hortensis*: corolla saturate citrina, flore pleno. (in hortis.)

11. *R. lanuginosus*: calycibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis, foliis

trifidis lobatis crenatis holosericeis. *Fl. dan. t.* 397. (in nemorosis, ad Perowa et Kunzowa. Jul. Aug.)

12. *R. polyanthemos*: calycibus patulis hirsutis, pedunculis sulcatis, foliis semiseptemlobis, laciniis tridentatis acutis, radice fibrosa. *Steph. ic. pl. III. t.* 29. (in pratis, versuris, campisque herbidis. Jun. Jul.)

13. *R. arvensis*: foliis trifido-decompositis, laciniis linearibus, seminibus aculeatis. *Fl. dan. t.* 219. (inter segetes et in agris, in hortis, cultisque. Jun. Aug.)

14. *R. aquatilis*: foliis submersis capillaceis, emer-sis subpeltatis. *Engl. bot. t.* 101. (in aquis seg-nibus, fossisque. Jul. Aug.)

15. *R. fluviatilis*: foliis omnibus dichotomo-ca-pillaceis, caule dichotomo. *Fl. dan. t.* 376. (in fluviis et rivulis. Jul. Aug.)

198. *TROLLIUS*. Calyx nullus. Petala decem usque quatuordecim. Nectarium: corona polyphylla, foliolis linearibus. Capsulae plurimae ovatae polyspermae.

1. *T. europaeus*: corollis conniventibus, nectariis staminum longitudine. *Fl. dan. t.* 133. (in pratis herbidis subhumidis et in nemorosis. Mai.)

199. *CALTHA*. Calyx nullus. Petala quina. Nectarium nullum. Capsulae plures polyspermae.

1. *C. palustris*: foliis cordato-reniformibus, caule erecto. *Fl. dan. t.* 668. (in pratis humentibus et paludosis. Mai. Jun.)

# D I D Y N A M I A.

## GYMNOSPERMIA.

200. *AJUGA*. Calyx quinquefidus. Corollae labium superius minimum bidentatum. Stamina labio superiore longiora.

1. *A. pyramidalis*: tetragono-pyramidalis villosa, foliis radicalibus maximis. *Engl. bot. t. 1270.* (ad margines sylvarum. Jul. Aug.)

*b. Ajuga alba*: corollis candidis. (in monticulis. Jun. Jul.)

2. *A. lanata*: [*genevensis*] foliis radicalibus caulinis minoribus. *Bull. herb. t. 361.* (in pratis, collibusque nemorosis. Jun. Jul.)

3. *A. reptans*: glabra, stolonibus. reptantibus *Fl. dan. t. 925.* (in nemoribus, pratisque. humi-  
midiusculis. Jun. Jul.)

*b. Ajuga carnea*: corollis carneis. (in um-  
brosis, ad sepes.)

201. *NEPETA*. Calyx inaequaliter quinquedentatus. Corollae labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexa. Stamina approximata.

1. *N. Cataria*: floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-serratis. *Fl. dan. t. 580.* (in ruderatis prope Slobodam Germanorum, nec non in vallo arcem (*Kreml*) cingente. Jul. Aug.)

*b. Cataria suaveolens*: odorata. (variat in hortis. Jul. Aug.)



202. MENTHA. Calyx quinquedentatus. Corolla subaequalis quadrifida, lacinia latiore emarginata. Stamina erecta distantia.

1. *M. sylvestris*: spicis cylindraceis basi interruptis, foliis ovato-oblongis subsessilibus argute inaequaliter serratis canescentibus subtus tomentosis, calycibus pedunculisque hirsutis. *Fl. dan.* t. 484. (in ruderatis humidiusculis, collibus sylvaticis circa Pachrina. Aug.)

2. *M. viridis*: spicis cylindraceis interruptis, foliis lanceolatis subsessilibus basi cuneatis argute serratis utrinque glabris, calycis dentibus subhirsutis. *Sole monogr.* t. 5. (in fossis et paludibus. Jul. Aug.)

3. *M. aquatica*: spicis capitatis subinterruptis, foliis ovatis serratis petiolatis subtus pubescentibus, calycibus hirsutis, pilis pedunculorum reflexis. *Sole monogr.* t. 10. 11. (in aquosis. Jul. Aug.)

4. *M. arvensis*: floribus verticillatis, foliis ovatis petiolatis serratis hirtis, calycibus pedunculisque hirsutis, caule ramosissimo. *Fl. dan.* t. 512. (in agris subhumentibus messe finita, nec non ad fossarum margines. Aug. Sept.)

5. *M. austriaca*: floribus verticillatis, foliis ovatis petiolatis serratis hirtis, calycibus hirsutis, pedunculis glabris, caule erecto. *Jacqu. austr.* V. t. 430. (in udis et fossis frequentissime. Jul. Aug.)

203. GLECHOMA. Calyx quinquefidus. Corolla ringens. Antherarum singulum par in formam crucis connivens.



1. *G. hederacea*: glabra, foliis reniformibus crenatis, calycinis laciniis ovatis acutis. *Fl. dan.* t. 789. (in hortis, cultis, pratis, sepibus, dumetis, fructicetis. Mai. Jun.)

b. *Glechoma grandiflora*: corollis calyce duplo longioribus. (in hortis, ad vias. Jun.)

204. LAMIUM. Calyx quinquedentatus. Corollae labium superius integrum fornicatum, labium inferius bilobum, faux inflata utrinque margine dentata.

1. *L. maculatum*: foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, junioribus maculatis, petiolis aequalibus, verticillis decemfloris, labio superiori acuto denticulato. *Hayne et Drewes.* t. 8. (in nemorosis, ad sepes, in hortis. Mai. Jul.)

2. *L. album*: foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis, petiolis dilatatis, verticillis vigintifloris, labio superiore obtuso integerrimo. *Fl. Lond.* t. 20. (in cultis et ruderalis. Jun. Jul.)

b. *Lamium carneum*: floribus carneis. (cum praecedente.)

3. *L. purpureum*: foliis cordatis obtusis crenatis petiolatis, superioribus confertis. *Fl. dan.* t. 523. (in cultis, hortis, ad sepes. Mai. Jun.)

4. *L. amplexicaule*: [*Pollichia amplexicaulis*] foliis subrotundis obtusis crenatis, floralibus sessilibus amplexicaulibus. *Fl. dan.* t. 752. (in cultis, agris, pomariis, hortis. Jun. Jul.)

205. GALEOPSIS. Calyx quinquedentatus. Corollae labium superius subcrenatum fornicatum, labium inferius supra bidentatum.

1. *G. latifolia*: [*Ladanum*] foliis ovato-lanceolatis aequaliter dentato-serratis, calycibus hirsutis, dentibus rectis inaequalibus: ternis calyce brevioribus. *Schkuhr.* t. 160. (in arvis et agris. Jul. Sept.)
2. *G. angustifolia*: foliis lineari-lanceolatis denticulatis, calycibus villosis: pilis adpressis, dentibus inaequalibus: ternis longitudine calycis. *Ehrh. herb.* n. 137. (in agris, hortisque. Jul. Sept.)
3. *G. Tetrahit*: internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus, corollis calyce parum longioribus, caule hirtio. *Engl. bot.* t. 207. (in arvis, ad sepes, inter segetes. Jun. Aug.)
4. *G. versicolor*: [*cannabina*] internodiis caulinis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis, calycibus pungentibus, corollis calyce quadruplo longioribus, galea ventricosa, caule hirtio. *Fl. dan.* t. 929. (inter segetes et in nemorosis, dumetis, sepibus. Jul. Aug.)

206. *GALEOBDOLON*. Calyx quinquefidus inaequalis aristatus. Corollae labium superius integerrium fornicatum, inferius trifidum, laciniis omnibus acutis.

1. *G. luteum*: [*Galeopsis Galeobdolon*] foliis omnibus ovatis, involucro tetraphyllo. *Fl. Lond.* t. 40. (in nemorosis et sylvaticis umbrosis. Jun. Jul.)

207. **BETONICA.** Calyx quinquedentatus aristatus. Corollae labium superius adscendens planiusculum, tubus cylindricus.

1. *B. officinalis*: spica interrupta, corollae galea integra, lacinia media labii inferioris emarginata, calycibus glabriusculis. *Fl. dan. t. 726.* (in nemoribus et pratis. Jun. Jul.)

*b. Betonica alba*: corollis albis. (in Astankina et Petrowsk. Jul.)

208. **STACHYS.** Calyx quinquefidus. Corollae labium superius fornicatum, labium inferius lateribus reflexum, lacinia intermedia majore emarginata. Stamina deflorata versus latus reflexa.

1. *S. sylvatica*: verticillis sexfloris, foliis rugosis cordatis petiolatis. *Fl. dan. t. 1102.* (in nemoribus umbrosis. Jul. Aug.)

2. *S. palustris*: verticillis sexfloris, foliis linearilanceolatis semiamplexicaulibus sessilibus. *Fl. dan. t. 1103.* (in humidis rivulis et ripis, nec non in cultis humidiusculis. Jul.)

3. *S. annua*: verticillis sexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis laevibus petiolatis, caule erecto. *Jacqu. austr. t. 360.* (in siccis, agris glareosis. Jun. Jul.)

209. **LEONURUS.** Calyx quinquedentatus. Corollae lobium superius planum integrum, inferius tripartitum, lacinia media indivisa.

1. *L. Cardiaca*: foliis cuneiformi-ovatis trilobis dentatis, corollis calyce pungente majoribus, lacinia media labii inferioris acuta. *Fl. dan. t. 727.* (in ruderatis et hortis. Jul. Aug.)

210. PHLOMIS. Calyx angulatus. Corollae labium superius incumbens compressum villosum.

1. *P. tuberosa*: foliis radicalibus cordatis scabris, floralibus oblongo-lanceolatis, bracteis subulatis hispidis, caule glabro. *Buxb. cent.* I. t. 6. (in ripa Occae. Jul. Stephan.)

211. CLINOPODIUM. Involucrum multisetum, verticillo subjectum. Calyx bilabiatus. Corollae labium superius planum obcordatum rectum.

1. *C. vulgare*: capitulis verticillatis, bracteis setaceis hispidis, foliis superne pilosis remote dentatis, caule subsimplici. *Fl. dan.* t. 930. (in ruderatis, dumetis, nemoribus. Jul.)

*b. Clinopodium variegatum*: foliis variegatis minoribus subintegerrimis, corollis niveis. (cum priore, rarius.)

212. ORIGANUM. Spica tetragona. Corollae labium superius erectum planum, inferius tripartitum, laciniis aequalibus.

1. *O. vulgare*: spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis longitudine calycum. *Engl. bot.* t. 1145. (in nemoribus montosis, umbrosis. Jul. Aug.)

*b. Origanum humile*: [album] panicula densa coarctata, spiculis oblongis, corollis albis. (cum antecedente, rarius.)

213. THYMUS. Calycis bilabiati faux villis clausa. Corollae labium superius emarginatum.

1. *T. Serpyllum*: floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. *Fl. dan.* t. 1165. (in collibus apricis arenosis, ver-

sus monasterium St. Simeonis, in sylva St. Annae, nec non in Petrowsk. Jul. Aug.)

214. *ACYNOS*. Calyx bilabiatus sulcatus piloso-hispidus, basi gibbus, fauce villosus. Corolla ringens, fauce subinflata: labio superiore erecto emarginato, inferiore tripartito patente: lacinia intermedia concava. Stamina omnia fertilia.

1. *A. vulgaris*: [*Thymus Acynos*] caule erecto basi ramoso, foliis ovatis acutis antice serratis, verticillis sexfloris. *Engl. bot.* t. 411. (in campis siccis glareosis. Jul. Aug.)

215. *DRACOCEPHALUM*. Calyx quinquedentatus vel bilabiatus. Corollae faux inflata, labium superius concavum,

1. *D. hyssopifolium*: [*Ruyschiana*] floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Moris. hist.* III. t. 5. f. 9. (inter frutices, inque umbrosis humidis. Jun.)

2. *D. nutans*: floribus verticillatis, bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis calyce duplo longioribus nutantibus. *Gmel. fl. sib.* III. t. 49. in arvis et pratis, tribus montibus. Jun. Jul.)

3. *D. thymiflorum*: floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus, *Gmel. fl. sib.* III. t. 50. (in aggeribus, siccisque, in vallo urbano magno, sicut et in vallo arcis (*Kreml*) Jul.)

216. *SCUTELLARIA*. Calyx ore integro, post florescentiam clauso, operculato. Corollae faux trigono-compressa.

1. *S. galericulata*: foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Fl. dan.* t. 637. (in



pratis humidis umbrosis, ad fossas, rivulos et lacuum ripas. Jul. Aug.)

217. PRUNELLA. Calyx bilabiatus. Filamenta bifurca, altero apice antherifero. Stigma bifidum.

1. *P. vulgaris*: calycis labio superiore truncato triaristato, corollis calyce duplo majoribus. *Fl. dan.* t. 910. (in pratis, pascuis, sepibus, sylvis, viis, hortisque. Jun. Aug.)

2. *P. grandiflora*: calycis labio superiore trifido, corollis calyce quadruplo majoribus. *Schkuhr.* t. 168. (in collibus herbidis. Jul. Aug.)

*b. Prunella alba*: floribus albis. (in nemoribus ad Podolsk, nec non in Zarizina,)

## ANGIOSPERMIA.

218. RHINANTHUS. Calyx quadrifidus ventricosus. Capsula bilocularis obtusa compressa.

1. *R. major*: [*Crista galli*] caule glabro ramoso maculato, calyce glabro, corollae labio superiore compresso apice bidentato: dentibus pistilloque exserto violaceo-coloratis. *Ehrh. herb.* n. 56. (in pascuis, pratisque humidis. Jun. Jul.)

2. *R. minor*: caule glabro immaculato, calyce glabro, corollae labio superiore compresso breviori pistilloque incluso unicoloribus. *Ehrh. herb.* n. 46. (in pratis et pascuis. Jun. Jul.)

3. *R. villosus*: [*Alectorolophus*] caule calyceque villosa, corollae labio superiore compresso breviori, pistillo exserto. *Bull. herb.* t. 125. (inter segetes et in agris. Jul.)

219. MELAMPYRUM. Calyx quadrifidus. Corollae labium superius compressum, margine replicato.



Capsula bilocularis obliqua hinc dehiscens. Semina bina gibba.

1. *M. cristatum*: spicis quadrangularibus, bracteis coloratis cordatis imbricatis compactis denticulatis. *Fl. dan.* t. 1104. (in sylvis, nemoribus et pratis, Jun. Jul.)
2. *M. arvense*: spicis conicis laxis, bracteis coloratis lanceolatis pinnato-dentatis. *Fl. dan.* t. 911. (inter segetes, Jun. Jul.)
3. *M. nemorosum*: floribus secundis lateralibus, bracteis cordato-lanceolatis dentatis, summis sterilibus coloratis, calycibus lanatis. *Fl. dan.* t. 305. (in nemoribus, Jun. Jul.)
4. *M. pratense*: floribus secundis lateralibus remotis, foliis lanceolatis, floralibus hastatis, corollis clausis. *Engl. bot.* t. 113. (in nemorosis et dumetis, Jul.)
5. *M. sylvaticum*: floribus secundis lateralibus remotis, foliis omnibus lanceolatis, corollis hiantibus. *Fl. dan.* t. 145. (in nemorosis et sylvaticis, Jun.)

220. EUPHRASIA. Calyx quadrifidus cylindricus. Antherae inferiores altero lobo basi spinosae. Capsula bilocularis ovato-oblonga.

1. *E. officinalis*: foliis ovatis obtuse dentatis, laciniis labii corollae inferioris emarginatis. *Fl. dan.* t. 1037. (in pratis et pascuis aridis, campis herbidis, versuris, Jul. Aug.)
2. *E. nemorosa*: [*sylvestris*] caule elongato ramosissimo, foliis glabris subnitidis ovatis argute

serratis. *Bull. herb.* t. 253. (in sylvis, nemoribus, pratisque. Jun. Aug.)

b. *Euphrasia gigantea*: caule simplicissimo ultrapedali. (in sylvaticis.)

221. ODONTITES. Corollae galea recta antheras includens, labium inferius trifidum: laciniis linearibus. Antherarum lobi omnes spinosi. Capsula ovata, immarginata.

1. *O. rubra*: [*Euphrasia Odontites*] caule ramossissimo piloso-scabro, foliis lineari-lanceolatis serratis, floribus secundis. *Fl. dan.* t. 625. (in arvis, agris, pascuis, pratisque. Jul. Aug.)

222. PEDICULARIS. Calyx quinquefidus. Capsula bilocularis mucronata obliqua. Semina tunicata.

1. *P. palustris*: caule ramoso, foliis pinnatis, pinnis pinnatifido-dentatis, calycibus inflatis bipartitis cristatis, corollae galea obtusa truncata. *Engl. bot.* t. 399. (in paludibus, uliginibus. Jul. Aug.)

2. *P. Sceptum Carolinum*: caule simplici, foliis pinnatifidis, pinnis repandis crenulatis, calycibus quinquefidis cristatis, corollis clausis. *Fl. dan.* t. 26. (in pratis paludosis umbrosis, in Perowa. Jun.)

3. *P. comosa*: caule simplici, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis subdentatis, spica foliosa, calycibus quinquefidis, corollae galea bidentata. *Steph. monogr. ic.* (in pratis et pascuis, in montibus passerinis, ad amnem Mosquae Jausaeque, in vallo urbano magno, Petrowsk, Kuskowa, etc. Jun.)

223. LINARIA. Calyx quinquepartitus. Corolla personata calcarata, palato bipartito. Capsula ovata bilocularis apice multivalvis polysperma.

1. *L. minor*: [*Antirrhinum minus*] foliis linearilanceolatis obtusis cauleque ramoso diffuso glanduloso-pilosis, pedunculis axillaribus calyce multoties longioribus. *Fl. dan.* t. 502. (in arvis et ruderatis sabulosis et glareosis, in vallo urbano magno. Jul. Aug.)

2. *L. vulgaris*: [*Antirrhinum Linaria*] foliis lanceolato-linearibus confertis glabris, caule erecto spicato, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis, calycibus glabris calcaribus brevioribus. *Fl. dan.* t. 982. (in sepibus, aggeribus, versuris, viis, campis herbidis, nemoribus. Jun. Aug.)

b. *Antirrhinum Peloria*: corolla regulari quinquefida, *Engl. bot.* t. 260. (in hortis. Jul. Aug.)

224. SCROPHULARIA. Calyx quinquefidus. Corolla subglobosa resupinata. Capsula bilocularis.

1. *S. nodosa*: foliis cordatis serratis glabris subtrinerviis, caule acutangulo. *Fl. dan.* t. 1167. (in sepibus et dumetis succulentis. Jun. Aug.)

2. *S. aquatica*: foliis cordatis serratis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Fl. dan.* t. 507. (in humidis, ad fossas. Jun. Aug.)

225. LINNAEA. Calyx superus duplex: fructus tetraphyllus, floris quinquepartitus. Corolla campanulata. Bacca sicca trilocularis.

1. *L. borealis*: floribus geminatis. *Fl. dan.* t. 3.  
(in sylvis, Gorenki et Archangelsk. Jun. Jul.)

226. LIMOSELLA. Calyx quinquefidus. Corolla campanulata quinquefida aequalis. Capsula unilocularis bivalvis polysperma.

1. *L. aquatica*: foliis lanceolato-spathulatis, scapis foliis brevioribus. *Fl. dan.* t. 69. (in inundatis et lacunis. Jul. Sept.)

*b. Limosella tenuifolia*: foliis linearibus angustissimis vix apice dilatatis, scapis foliis aequalibus. (cum praecedente.)

*c. Limosella diandra*: [*silesiaca*] staminibus duobus. *Krock. siles.* t. 27. f. B. (cum antecedente passim.)

227. LATHRAEA. Calyx quadrifidus. Glandula depressa ad basin suturae germinis. Capsula unilocularis, receptaculo fungoso.

1. *L. Squamaria*: caule simplicissimo multifloro, floribus pendulis, labio inferiore trifido. *Fl. dan.* t. 136. (in nemoribus, sylvisque umbrosis, ad radices Coryli. Mai.)

228. OROBANCHE. Calyx diphyllus, foliolis bipartitis lobatis lateralibus. Corolla ringens, laciniis subaequalibus. Glandula sub basi germinis. Capsula unilocularis bivalvis polysperma.

1. *O. caryophyllacea*: caule simplici, calycis foliolis bipartitis, corolla tubulosa, labii inferioris laciniis obtusis, limbo fimbriato-crispo, staminibus intus hirsutis, stylo glabriusculo. *Sabbat. hort.* III. t. 11. (in nemoribus circa Kuskowa, Jun.)

# TETRADYNAMIA.

## SILICULOSA.

229. MYAGRUM. Silicula subglobosa evalvis: immatura bilocularis, matura unilocularis monosperma.

1. *M. paniculatum*: caule erecto, foliis lanceolatis subdentatis sagittatis amplexicaulibus, staminibus simplicibus, siliculis subrotundo - globosis reticulato - rugosis. *Fl. dan.* t. 204. (juxta agros, interque segetes, in vallo circa murum album [Kitaigorod] Jun. Jul.)

230. BUNIAS. Silicula subtetraëdra evalvis biseu quadrilocularis rugosa.

1. *B. orientalis*: siliculis ovatis gibbis verrucosis, foliis inferioribus runcinato - lyratis, superioribus lanceolatis. *Gmel. fl. sib.* III. t. 57. (in pratis, campis, agrorum versuris. Jun. Jul.)

231. DRABA. Silicula integra ovali - oblonga, valvulis planiusculis dissepimento parallelis. Stylus nullus.

1. *D. verna*: foliis oblongis acutiusculis subserratis subhirtis, scapo nudo, petalis bifidis, stigmatate sessili. *Fl. dan.* t. 983. (in agris, arvis, collibus, aridis. Mai.)

2. *D. muralis*: caule ramoso, folis ovatis amplexicaulibus dentatis hirtis, siliculis patentibus glabris. *Engl. bot.* t. 912. (in ruderatis, collibus, muris. Jun. Jul.)

b. *Draba intermedia*: caule ramoso, ramis longissimis, foliis maximis grosse dentatis hir-



tis, siliculis patentibus glabris. (in ruderatis, sterilioribus.)

3. *D. nemoralis*: caule ramoso, foliis ovatis amplexicaulibus dentatis, siliculis patentibus pubescentibus. *Houttuyn. syst.* IV. t. 60. f. 1. (in nemoribus, pascuis, arvis, solo glareoso. Jun. Aug. *Londes.*)

232. *LEPIDIUM*. Silicula emarginata cordata polysperma, valvulis carinatis dissepimento contrariis.

1. *L. sativum*: floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Blackw.* t. 23. (in agris et cultis, Jun. Jul.)
2. *L. ruderales*: floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Fl. dan.* t. 184. (in ruderatis, agrisque limosis, ad vias. Mai. Aug.)

233. *THLASPI*. Silicula emarginata obcordata polysperma, valvulis navicularibus marginato-carinatis.

1. *T. arvense*: siliculis orbiculatis compressis lacvibus, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. dan.* t. 793. (in agris, cultis, hortis. Jun.)
2. *T. campestre*: siliculis subrotundis glanduloso-punctatis, foliis sagittatis subdentatis incanis. *Fl. dan.* t. 1221. (in arvis, campisque editioribus apricis et montosis, ad vias, solo argilloso. Mai. Jun.)
3. *T. Bursa pastoris*: siliculis deltoideo-obcordatis, foliis radicalibus lyrato-pinnatifidis hirsutis. *Fl. dan.* t. 729. (in hortis, cultis, agris, ruderatis. Mai. Sept.)



*b. Thlaspi simplicifolium*: foliis indivisis.  
*Bauh. pin.* 108. (cum praecedente.)

234. *IBERIS*. Corolla irregularis, petalis binis exterioribus majoribus. Silicula polysperma emarginata.

1. *I. nudicaulis*: herbacea, foliis radicalibus ly-rato-pinnatifidis, caule centrali nudo simplici, filamentis basi appendiculatis. *Engl. bot.* t. 327. (in agris, arvisque arenosis sterilissimis, at-que in campis editioribus. Mai. Jun.)

235. *ALYSSUM*. Silicula subintegra ovata bilocu-laris bivalvis, loculis polyspermis, valvulis conca-vis dissepimento parallelis, stylo coronata.

1. *A. incanum*: caule erecto, foliis lanceolatis in-canis integerrimis, floribus corymbosis, petalis bifidis calyce duplo longioribus. *Schkuhr.* t. 181. (in apricis siccis, ad sepes et vias. Jun. Aug.)
2. *A. calycinum*: caule herbaceo, foliis spathu-latis stellato-pubescentibus, floribus corym-bosis, petalis integris calycem subaequantibus, filamentis brevioribus basi appendiculatis. *Jacqu. austr.* t. 338. (in campis aridis, montosis. Jun. Jul. *Stephan.*)
3. *A. sativum*: [*Myagrum sativum*] caule erecto, foliis amplexicaulibus pilosis integerrimis, pe-talis integris, staminibus simplicibus, siliculis obovatis inflatis. *Fl. dan.* t. 1038. (inter sege-tes [*Linum praesertim*] et in hortis. Jun. Jul.)

236. LUNARIA. Silicula elliptica compresso-plana pedicellata, valvulis dissepimento aequalibus parallelis planis. Calyx foliolis saccatis.

1. *L. rediviva*: foliis cordatis mucronato-dentatis, siliculis utrinque attenuatis. *Lam. ill. t. 561.* (in montibus passerinis et Kunzowa. Jun.)

## S I L I Q U O S A .

237. CARDAMINE. Calyx subhians. Stigma integrum. Siliqua elastice dissiliens, valvulis revolutis.

1. *C. impatiens*: foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisis, stipulis ciliatis, petalis quaternis cito pereuntibus, caule simplici. *Engl. bot. t. 80.* (in montibus passerinis, Archangelsk et Kunzowa. Jun.)
2. *C. hirsuta*: [*parviflora*] foliis pinnatis exstipulatis: foliolis rotundatis repando-dentatis petiolatis, summis oblongis incisis petiolatis, floribus tetrandris. *Fl. dan. t. 735.* (in Gorenki. Jun.)
3. *C. sylvatica*: foliis exstipulatis pinnatis: foliolis petiolatis oblongis lanceolatisque incisodentatis: extimo ovali, floribus tetradynamis. *Fl. dan. t. 148.* (in Kunzowa, montibusque passerinis. Jul)
4. *C. pratensis*: foliis pinnatis, foliolis radicalibus sublyrato-rotundatis dentatis, caulinis lanceolatis. *Fl. dan. t. 1039.* (in pratis et pascuis aquosis. Mai. Jun.)

5. *C. amara*: foliis pinnatis, foliolis inferioribus elliptico - oblongis repandis dentatis, caule basi stolonifero radicante. *Engl. bot. t. 1000.* (in nemoribus humidis, ad montium passerinorum radicem, in Gorenki, Petrowsk, Archangelsk. Mai)

238. *SISYMBRIUM*. Calyx patens. Corolla patens. Siliqua dehiscens valvulis rectiusculis.

1. *S. Nasturtium*: siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis cordato - subrotundis dentato-repandis glabris, caule basi radicante. *Fl. dan. t. 690.* (ad scaturigines, rivulosque puriores. Jun. Jul.)

2. *S. sylvestre*: siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis elliptico - lanceolatis inciso - serratis. *Fl. dan. t. 931.* (in pascuis humidis, ruderalis, ad ripas fluviorum. Jun. Aug.)

3. *S. palustre*: siliquis declinatis oblongo - ovatis, foliis pinnatifidis serratis, petalis calyce brevioribus. *Fl. dan. t. 409.* (in locis udis. paludibusque. Jun. Jul.)

4. *S. amphibium*: siliquis declinatis oblongo-ovatis, foliis oblongo-lanceolatis pinnatifidisque serratis, petalis calyce longioribus. *Fl. dan. t. 984.* (ad ripas fluviorum, fossarumque margines. Jul. Aug.)

5. *S. Sophia*: foliis decompositis, laciniis sublinearibus glaucis pilosis, petalis calyce minoribus. *Fl. dan. t. 528.* (in ruderalis, pagis, muris, viisque limosis. Mai, Aug.)

6. *S. Loeselii*: foliis runcinatis acutis hirtis, caule retrorsum hispido. *Jacqu. austr. t. 324.* (in cultis et ruderalis. Jun.)

239. *ERYSIMUM*. Calyx clausus. Siliqua columnaris exacte tetraëdra.

1. *E. officinale*: siliquis spicae adpressis, foliis lyrato-runcinatis. *Fl. dan. t. 560.* (in ruderalis, ad vias. Jun. Aug.)

2. *E. Barbarea*: foliis inferioribus lyratis, lobo terminali rotundato, superioribus obovatis dentatis. *Engl. bot. t. 443.* (in nemorosis, pratis humidis, ad ripas et fossas. Mai.)

3. *E. Alliaria*: foliis cordatis dentatis. *Fl. dan. t. 934.* (in sepibus, dumetis, cultis, hortis. Jun. Aug.)

4. *E. cheiranthoides*: foliis lanceolatis obsolete denticulatis, siliquis patulis stylo obtusiusculo terminatis. *Fl. dan. t. 731. et 923.* (in sepibus, dumetis, arvisque. Jun. Jul.)

240. *ABABIS*. Glandulae nectariferae quaternae, singulae inter calycis foliola, squamae instar reflexae.

1. *A. thaliana*: foliis radicalibus oblongis petiolatis, caulinis lanceolatis sessilibus, caule erecto basi hirto, petalis calyce duplo longioribus. *Fl. dan. t. 1106.* (in agris sabulosis, circa Kuskowa et alibi. Jun. Aug.)

241. *TURRITIS*. Calyx connivens erectus. Corolla erecta. Siliqua longissima angustata.

1. *T. glabra*: foliis radicalibus dentatis hispidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris.

*Fl. dan.* t. 809. (in pascuis siccis apricis, in vallis pratisque umbrosis. Jun. Jul.)

2. *T. hirsuta*: foliis omnibus cauleque hirsutis, *Fl. dan.* t. 1040 (in montibus passerinis aliisque nemorosis montosis. Jun. Jul.)

242. **BRASSICA**. Calyx erectus connivens. Glandulae inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem. Semina globosa.

1. *B. campestris*: radice cauleque tenui, foliis cordato-acuminatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis subhispidis. *Fl. dan.* t. 550. (in agris, non argillosis, inter segetes. Jun.)

2. *B. Napus*: radice caulescente fusiformi, foliis laevibus, superioribus cordato-lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus lyratis dentatis. *Blackw.* t. 224. (inter segetes, solo arenoso. Mai. Jun.)

3. *B. Rapa*: radice caulescente orbiculari depressa carnosa, foliis radicalibus lyratis scabris, caulinis integerrimis laevibus. *Blackw.* t. 226. (inter segetes passim. Jun.)

243. **SINAPIS**. Calyx patens. Corollae ungues recti. Glandula inter stamina breviora et pistillum, interque longiora et calycem. Siliquae rostratae.

1. *S. arvensis*: siliquis multangulis toroso-turgidis rostro ancipiti longioribus, foliis ovatis sublyratis. *Fl. dan.* t. 753. (in agris, inter segetes. Jun. Aug.)

2. *S. alba*: siliquis hispidis, rostro obliquo longissimo ensiformi. *Blackw.* t. 29. (in agris interque segetes. Jun.)

3. *S. nigra*: siliquis glabris tetragonis racemo adpressis, foliis ramulorum deflexis, summis linearibus integerrimis glabris *Engl. bot. t. 969.* (in agris, ruderatis. Jun. Jul.)

244. *RAPHANUS*. Calyx clausus. Glandulae melliferae binae inter stamina breviora et pistillum, totidem inter stamina longiora et calycem. Siliqua torosa subarticulata teres rostrata.

1. *R. Raphanistrum*: foliis lyratis, siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus. *Fl. dan. t. 678.* (in agris, inter segetes. Jun. Jul.)
2. *R. sativus*: foliis lyratis, siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Lam. ill. t. 566.* (in oleraceis Jun)

*b. Raphanus niger*: radice ovato-oblonga compacta nigra, sapore acerrimo. (cultus.)

*c. Raphanus Radicula*: radice globosa amoene rubra albave. (in hortis et agris.)

## MONADELPHIA.

### PENTANDRIA.

245. *ERODIUM*. Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala regularis. Nectarium: glandulae quinae ad basin staminum; nectarilymata quina squamaeformia. Semina quina arillata aristata, aristis spiraliibus introrsum barbatis.

1. *E. cicutarium*: [*Geranium cicutarium*] pedunculis multifloris, foliis pinnatis, pinnis pinnatifidis incisis, corollis calyce majoribus, caule



hirto prostrato. *Cavan. diss.* IV. t. 95. f. 1. (in agris, hortis, viis, sterilibus. Jun. Aug.)

## DE CANDRIA.

246. GERANIUM. Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala regularis. Nectarium: glandulae quinae melliferae, basi longiorum filamentorum adnatae. Arilli quini monospermi aristati ad basin receptaculi rostrati: aristis nudis simplicibus.

\* *Pedunculis unifloris.*

1. *G. sibiricum*: pedunculis unifloris, caule erecto ramoso, foliis quinquelobo-palmatis, lobis oblongis inciso-dentatis. *Gmel. fl. sib.* III. t. 67. (in collibus trans Occam. Jul. Aug. *Stephan.*)
2. *G. sanguineum*: pedunculis unifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. *Fl. dan.* t. 1107. (in sylvis et nemoribus. Jul. Aug.)

\*\* *Pedunculis bifloris: perennia.*

3. *G. sylvaticum*: pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-serratis, caule erecto corymboso, petalis subemarginatis. *Engl. bot.* t. 121. (in sylvis, nemoribusque montosis. Jun. Jul.)
4. *G. palustre*: pedunculis bifloris longissimis declinatis, foliis quinquelobis dentatis, caule decumbente adscendente, petalis integris. *Fl. dan.* t. 596. (in paludosis umbrosis. Jun. Jul.)
5. *G. pratense*: pedunculis bifloris, foliis subpeltatis multipartitis rugosis acutis, petalis

integrīs. *Engl. bot.* t. 404. (in pratis. Mai. Jul.)

\*\*\* *Pedunculis bifloris: annua.*

6. *G. rotundifolium*: pedunculis bifloris, foliis omnibus mollissime villosis: radicalibus reniformibus septemlobis, caulinis subrotundis basi truncatis quinquelobis trifidis, petalis integris longitudine calycis aristati, arillis hirsutis. *Engl. bot.* t. 157. (in cultis, agris, arvis, versuris. Jun. Aug. *Stephan.*)
7. *G. molle*: pedunculis bifloris, foliis reniformibus: radicalibus novemlobis, caulinis septemlobis, lobis trifidis, petalis bifidis longitudine calycis mutici, arillis glabris rugosis. *Fl. dan.* t. 679. (in plateis, pascuis, ruderatis, hortisque. Jul. Aug.)
8. *G. pusillum*: pedunculis bifloris, foliis subseptemlobis trifidis, floribus pentandris, petalis emarginatis longitudine calycis mutici, arillis pubescentibus. *Engl. bot.* t. 385. (in ruderatis, arvis, agris, cultis. Jun. Aug.)
9. *G. robertianum*: pedunculis bifloris, foliis ternatis quinatisque trifido-pinnatifidis, petalis integris calyce aristato duplo longioribus, arillis reticulatis. *Fl. dan.* t. 694. (in nemorosis, umbrosis, ruderatis, muribus, ad domos. Jul. Aug.)

## P O L Y A N D R I A.

247. MALVA. Calyx duplex: exterior triphyllus. Capsulae plurimae monospermae.

1. *M. rotundifolia*: caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. *Fl. dan.* t. 721. (in ruderatis, collibus, viis, plateis. Jun. Aug.)  
*b. Malva pusilla*: toto habitu minor teneriorque. *Engl. bot.* t. 241. (in ruderatis.)
  2. *M. sylvestris*: caule erecto herbaceo, foliis septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. *Fl. dan.* t. 1223. (in campestribus, sepibus, viis. Jul. Aug.)
  3. *M. mauritiana*: caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis, pedunculis petiolisque glabriusculis. *Cavanill.* II. t. 25. f. 2. (in cultis, hortisque sponte, etiam in vallo arcis. (*Kremlin*) Jun. Aug.)
  4. *M. crispa*: caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavanill.* II. t. 23. f. 1. (ad sepes, in hortis et pomariis. Jul. Aug.)
248. LAVATERA. Calyx duplex: exterior trifidus. Capsulae plurimae monospermae.
1. *L. vulgaris*: [*thuringiaca*] caule herbaceo tomentoso, foliis subtomentosis: inferioribus angulatis, superioribus trilobis, lobo intermedio longiore obtuso, pedunculis axillaribus solitariis. *Jacqu. austr.* t. 311. (in nemoribus et dumetis. Jul. Aug.)

## DIADELPHIA.

### HEXANDRIA.

249. CORYDALIS. Calyx diphyllus. Corolla ringens. Filamenta bina membranacea, singulum antheris ternis. Siliqua bivalvis polysperma.

1. *C. bulbosa*: [*Fumaria bulbosa*] caule simplici, racemo terminali, bracteis oblongis pedunculo longioribus, foliis biternatis oblongis acutiusculis, radice tuberosa cava. *Fl. dan.* t. 605. (in dumetis et nemoribus umbrosis. Mai.)

*b. Corydalis alba*: floribus albis. (cum praecedente et sequente. Mai.)

2. *C. Halleri*: caule simplici, racemo terminali, bracteis cuneatis digitatis pedunculo longioribus, foliis biternatis, radice tuberosa. *Fl. dan.* t. 1224. (cum reliquis generis sui. Mai.)

250. FUMARIA. Calyx diphyllus. Corolla ringens. Filamenta bina membranacea, singulum antheris ternis. Silicula monosperma evalvis.

1. *F. officinalis*: caule ramoso diffuso, siliculis globosis retusis, foliis supradecompositis, foliolis cuneiformi-lanceolatis incisis. *Fl. dan.* t. 940. (inter segetes, in agris, cultis, hortis. Jun. Jul.)

### OCTANDRIA.

251. POLYGALA. Calyx pentaphyllus, (foliolis duobus alaeformibus coloratis. Legumen obcordatum biloculare.

1. *P. vulgaris*: floribus cristatis racemosis, alis calycinis trinerviis obtusis longitudine corollae, caulibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis acutiusculis. *Fl. dan.* t. 516. in pascuis, pratis, montosis, umbrosis. Jun. Aug.)

*b. Polygala elongata*: major, caule simpliciusculo adscendente. *Vaill. paris.* t. 32. f. 1. (in pascuis et sylvis.)

*c. Polygala carnea*: corollulis carneis (in pratis et herbidis.)

2. *P. amara*: floribus cristatis racemosis, caulibus erectiusculis, foliis subspathulatis, radicalibus obovatis. *Fl. dan.* t. 1169. (in pascuis, nemorosis, montosis siccis. Jun. Jul.)

*b. Polygala alba*: corollulis albis. (ad Mosquam fluvium.)

## DE CANDRIA.

252. GENISTA. Calyx  $\frac{2}{3}$  bilabiatus: dentibus binis superioribus brevissimis. Vexillum oblongum a pistillo staminibusque deorsum deflexum.

1. *G. tinctoria*: foliis lanceolatis glabris, ramis teretibus striatis erectis, leguminibus glabris. *Fl. dan.* t. 526. (in sylvaticis montosis, circa Kuskowa. Jun. Jul.)

253. ANTHYLLIS. Calyx ventricosus. Legumen subrotundum tectum mono- vel trispermum.

1. *A. Vulneraria*: herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. *Fl. dan.* t. 988.

(in pratis, campisque apricis sabulosis, circa Petrowsk et Tokarewa. Jun. Jul.)

254. *OROBUS*. Calyx basi obtusus: laciniis superioribus profundioribus brevioribus. Stylus linearis.

1. *O. vernus*: foliis pinnatis trijugis ovatis acuminatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Fl. dan.* t. 1226. (in nemoribus. Mai.)

2. *O. tuberosus*: foliis pinnatis tri-quadrjugisve lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule alato. *Fl. dan.* t. 781. (in sylvaticis et pratis. Mai. Jun. *Stephan.*)

255. *LATHYRUS*. Calycis laciniae superioribus binae breviores. Stylus planus, supra villosus, superne latior.

1. *L. tuberosus*: pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Rivin. tetr.* t. 42. (inter segetes, humo argilloso. Jun. Aug.)

2. *L. pratensis*: pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis, foliolis lanceolatis. *Fl. dan.* t. 527. (in pratis, ad sepes. Jun. Aug.)

3. *L. sylvestris*: pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, internodiis membranaceis. *Fl. dan.* t. 325. (in sylvaticis et pratis montosis, in Petrowsk, Swirlowa. Jun. Jul.)

4. *L. latifolius*: pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis mem-



branaceis. *Engl. bot.* t. 1108. (in nemoribus subhumidis, ad sepes. Jun. Jul )

5. *L. palustris*: pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, foliolis lineari lanceolatis acutis, stipulis semisagittatis lanceolatis, internodiis membranaceis *Fl. dan.* t. 399. (in pascuis paludosis, dumetis humidis, montibus passerinis Jul. Aug.)

256. *Vicia*. Stigma latere inferiore transverse barbatum. Calyx superne emarginatus bidentatus, inferne dentibus tribus rectis longis. Vexillum emarginatum.

\* *Pedunculis elongatis.*

1. *V. dumetorum*: pedunculis multifloris, foliolis ovatis mucronulatis reflexis, stipulis lanceolatis serratis. *Spreng. hal.* t. 7. (in nemoribus montosis. Jun )
2. *V. sylvatica*: pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis ellipticis, stipulis lunatis setaceo-dentatis. *Fl. dan.* t. 277. (in sylvaticis et nemorosis montosis. Jul )
3. *V. cassubica*: pedunculis multifloris folio brevioribus, foliolis oblongis subpubescentibus, stipulis semisagittatis integerrimis lanceolatis. *Jacqu austr.* III. t. 229 (in nemoribus umbrosis arenosis, in Gorenki, Astankina. Jul )
4. *V. Cracca*: pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis obtusis, stipulis semisagittatis lineari-subulatis integerrimis. *Fl. dan.* t. 804. (inter se-

getes, ad sepes, in pratis, versuris, dumetis.  
Jun. Aug.)

5. *V. tenuifolia*: pedunculis multifloris folio longioribus, floribus imbricatis, foliolis linearibus glabriusculis trinerviis, stipulis linearibus integerrimis. *Roth.* (cum praecedente. Jun. Aug.)

\*\* *Floribus axillaribus subsessilibus.*

6. *V. sativa*: leguminibus sessilibus subbinatis, foliolis oblongo-ovatis truncatis mucronatis, stipulis dentatis notatis. *Fl. dan.* t. 522. (inter segetes. Jun. Aug.)

7. *V. angustifolia*: leguminibus sessilibus subbinatis patentibus, foliolis imis ovatis retusis emarginatis, superioribus linearibus apice integerrimis, stipulis dentatis, seminibus globosis. *Schkuhr.* t. 201. (inter segetes, in campis arenosis, nemoribusque. Jun. Jul.)

8. *V. sepium*: leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decrescentibus. *Fl. dan.* t. 699. (in pratis, sepibus, nemoribus, hortis. Mai. Jun.)

257. ERVUM. Calyx quinquepartitus. Stigma capitatum undique pilosum. Legumen oblongum.

1. *E. tetraspermum*: pedunculis subbifloris, leguminibus glabris tetraspermis, foliolis oblongis truncatis. *Fl. dan.* t. 95. (in agris, arvis, cultis, hortis. Jun. Aug.)

2. *E. hirsutum*: pedunculis multifloris, leguminibus hirsutis dispermis, foliolis linearibus obtusis. *Fl. dan.* t. 639. (in agris, arvis, cultis. Jul. Aug.)

258. Cicer. Calyx quinquepartitus longitudine corollae, laciniis quaternis superioribus vexillo decumbentibus. Legumen turgidum dispermum.

1. *C. Lens*: [*Ervum Lens*] pedunculis subbifloris, seminibus compressis, foliolis integerrimis. *Kniph. cent. IX.* (inter segetes, in cultis, hortisque. Jun. Jul.)

b. *Cicer macrospermum*: seminibus majoribus, leguminibus succulentis dulcibus. (in hortis.) Jun. Jul)

259. Cytisus Calyx bilabiatus, labio superiore bidentato. Carina erecta. Legumen basi attenuatum compressum.

1. *C. supinus*: floribus pedunculatis subbinatis axillaribus, caule decumbente, foliolis obovatis obtusis. *Jacqu. austr. I. t. 20.* (in collibus apricis sylvaticis, circa pagum Tokarewa. Jul Henning.)

260. Robinia. Calyx quadrifidus, lacinia superiore bipartita. Legumen gibbum elongatum.

1. *R. Caragana*: pedunculis simplicibus plurimis, foliis abrupte pinnatis subquadrijugis, petiolis inermibus, leguminibus cylindricis. *Du Ham. I. t. 19.* (in hortis et sepibus vivis. Mai. Jun.)

261. Coronilla. Calyx bilabiatus, dentibus superioribus connatis. Petala unguiculata. Vexillum vix alis longius. Lomentum teres articulatum rectum.

1. *C. varia*: herbacea, foliolis plurimis lanceolatis glabris, lomentis teretibus erectis. Ri-

vin. t. 219. (in sepibus, dumetis, nemoribus, interque segetes, Jul.)

262. ASTRAGULUS. Carina obtusa. Legumen plerumque biloculare gibbum. Semina biserialia.

1. *A. glycyphyllos*: caulescens prostratus, foliis glabris ovatis obtusis mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis, racemis pedunculatis folio brevioribus, leguminibus subtriquetris arcuatis. *Fl. dan. t. 1108.* (in nemoribus, circa Kunzowa et Zarizina, Jul.)

263. MELILOTHUS. [*Trifolium* Linn.] Calyx tubulosus quinquedentatus. Corolla decidua. Carina adpressa. Legumen oligospermum dehiscens calyce longius.

1. *M. caerulea*: racemis oblongis pedunculatis, leguminibus ventricosis seminudis dispermis mucronatis, caule erecto, stipulis lanceolatis membranaceis. *Blackw. t. 184.* (in cultis, hortis, Jul.)
2. *M. officinalis*: [*lutea*] leguminibus racemosis nudis dispermis subrogosis ovatis subcompressis acutis, stipulis subulatis, caule erecto. *Fl. dan. t. 934.* (in campestribus, pratis, arvis, sepibus, ruderatis, Jun. Jul.)
3. *M. vulgaris*: [*alba*] leguminibus racemosis nudis monospermis rugosis obovatis acutis, stipulis setaceis, caule erecto. (in ruderatis et cultis, Jun. Jul.)

264. TRIFOLIUM. Calyx tubulosus quinquedentatus. Corolla persistens. Carina adpressa. Legumen oligospermum evalve calyce tectum.

\* *Lotoidea*: *leguminibus tectis*, *poly-  
spermis*.

1. *T. hybridum*: capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, calycinis dentibus subaequalibus, foliolis ovato-oblongis emarginatis serrulatis, caule adscendente prostrato. *Sturm.* I. t. 15. (in cultis, pratis, ad vias. Jun. Jul.)

2. *T. repens*: capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, calycinis dentibus superioribus brevioribus, foliolis ovato-oblongis emarginatis serrulatis, caule repente. *Fl. dan.* t. 990. (in pratis, pascuis, campis, versuris, hortisque. Jun. Aug.)

b. *Trifolium pentaphyllum*: foliolis quaternis, quinis, senisve fusco-maculatis, (in hortis)

\*\* *Lagopoda*: *calycibus villosis*.

3. *T. pratense*: spicis densis ovatis, calycis dente infimo tubo corollae monopetalae inaequalis brevioris stipulis aristatis, foliis ovalibus integerrimis, caule adscendente, *Fl. dan.* t. 989. (in pratis, versuris, campis, hortisque. Jun. Aug.)

b. *Trifolium sativum*: multicaule elatius, foliolis lanceolato-oblongis, capitulis nudis pedunculatis subgeminis *Sturm.* I. t. 15. (cultum.)

4. *T. flexuosum*: [medium] spicis laxis subglobosis solitariis, calycis dente infimo tubum corollae monopetalae subaequalis aequante, stipulis subulatis, foliolis ellipticis tenuissime serrulatis striato-venosis, caulibus ramosis flexuo-

sis. *Jacqu. austr.* IV. t. 316. (in nemorosis montosis, e. g. montibus passerinis et Kunzowa. Jun. Jul.)

*b. Trifolium carneum:* corollulis carneis. (cum antecedente.)

5. *T. alpestre:* spicis densis subglobosis subgeminatis, calycis dente infimo tubum corollae monópetalae subaequalis aequante, stipulis setaceis, foliolis lanceolatis tenuissime serrulatis striato-venosis, caulibus simplicissimis strictis. *Sturm.* I. t. 15. (in collibus nemorosis. Jul. Aug.)

6. *T. arvense:* spicis villosissimis subcylindraceis, dentibus calycinis setaceis corolla longioribus, foliolis obovato-linearibus. *Fl. dan.* t. 724. (in arvis campisque sterilibus, inter segetes. Jun. Aug.)

\*\*\* *Lupulina: vexillis corollae inflexis.*

7. *T. montanum:* spicis subimbricatis subtribus, vexillis subulatis emarcescentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Fl. dan.* t. 1172. (in collibus aridis, nemoribusque montosis. Jun. Aug.)

8. *T. spadiceum:* spicis cylindricis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycinis dentibus inaequalibus subpilosis, foliolis infimis obcordatis, supremis ellipticis serrulatis, petiolo apice incrassato marginato, stipulis lanceolatis erectis cauleque erecto pubescentibus. *Sturm.* I. t. 16. (in pratis montosis siccioribus. Jun. Jul.)



9. *T. agrarium*: [aureum] spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycinis dentibus inaequalibus glabris, foliolis lanceolatis serrulatis, stipulis lanceolatis erectis glabris, caule erecto *Fl. dan. t. 558.* (in pratis, arvisque siccis. Jul. Aug.)

10. *T. campestre*: spicis ovatis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, pedunculis folia obovata obtusa aequantibus, stipulis oblique reflexis ciliatis, caule decumbente. *Fl. dan. t. 796.* (in agris cultioribus post messem. Jul. Aug.)

11. *T. procumbens*: [minus] spicis ovatis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, foliolis obovatis petiolatis emarginatis, calycibus pubescentibus, stipulis brevi-ovatis glabris, caule ramisque procumbentibus *Engl. bot. t. 1256.* (in pratis, campisque herbosis. Jun. Jul.)

12. *T. filiforme*: spicis capitatis hemisphaericis paucifloris, vexillis deflexis persistentibus laevibus, foliolis obcordatis denticulatis, calycibus glabris, caule procumbente. *Engl. bot. t. 1257* (in pratis argillosis. Jun. Jul.)

265. *Lotus*. Calyx tubulosus. Alae sursum longitudinaliter conniventes. Filamenta cuneiformia. Legumen cylindricum strictum.

1. *L. corniculatus*: capitulis depressis multifloris, calycibus erectis pilosis, caule subangulato solido decumbente, leguminibus teretibus patulis. *Fl. dan. t. 991.* (in pratis, graminosis et versuris siccioribus. Jun. Aug.)

2. *L. uliginosus*: [sylvaticus] capitulis depressis multifloris, calycibus recurvis barbatis, caule

tereti fistuloso decumbente, leguminibus tere-  
tibus. *Schkuhr. t. 211.* (in herbidis, sylvaticis,  
umbrosis humentibus. Jun. Aug.)

266. *MEDICAGO*. Carina corollae a vexillo defle-  
ctens. Legumen compressum cochleatum.

1. *M. falcata*: pedunculis racemosis, legumini-  
bus contorto-falcatis pubescentibus, foliolis  
oblongis apice dentatis. *Fl. dan. t. 233.* (in ag-  
geribus, pratis apricis siccis, ad vias. Jun.  
Aug.)

2. *M. lupulina*: spicis ovalibus, leguminibus  
uniformibus monospermis, stipulis integerri-  
mis, foliolis obovatis. *Fl. dan. t. 992.* (in pra-  
tis, pascuis, agrisque siccioribus. Jun. Jul.)

## P O L Y A D E L P H I A.

### P O L Y A N D R I A.

267. *HYPERICUM*. Calyx quinquepartitus. Pe-  
tala quina. Filamenta multa in quinque phalanges  
basi connata. Capsulae tri-seu quinqueloculares  
polyspermae.

1. *H. quadrangulare*: floribus trigynis, caule  
quadrangulo herbaceo, foliis pellucido-pun-  
ctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Fl. dan. t.*  
*640.* (in pratis humentibus, ad sylvarum mar-  
gines, in montosis Jun. Jul.)

2. *H. dubium*: floribus trigynis, caule obsolete  
quadrangulo, foliis obtusis epunctatis, folio-  
lis calycinis ellipticis. *Allion. pedem. t. 83. f. 1.*

(in pratis, aggeribus, sylvaticis, montosis. Jun. Jul.)

3. *H. perforatum*: floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis, foliolis calycinis lanceolatis. *Fl. dan.* t. 1043. (in nemoribus, dumetis, sepibus, campis herbidis. Jul. Aug.)
4. *H. montanum*: floribus trigynis corymboso-paniculatis terminalibus, calycibus serrato-glandulosis, foliis oblongis amplexicaulibus impunctatis, margine nigro-maculatis, caule tereti erecto. *Fl. dan.* t. 173. (in sylvaticis et nemorosis montosis. Jul.)
5. *H. hirsutum*: floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, caule tereti erecto pubescente, foliis oblongis basi attenuatis pellucido-punctatis subtus pubescentibus. *Fl. dan.* t. 302. (in collibus sylvaticis ad Kunzowa, et in montibus passerinis. Jun. Jul.)

## S Y N G E N E S I A.

### A E Q U A L I S.

268. TRAGOPOGON. Receptaculum nudum. Calyx simplex polyphyllus. Pappus plumosus stipitatus.

1. *T. pratense*: calycibus corollae radium subaequantibus, pedunculo tereti, foliis integris strictis. *Fl. dan.* t. 906. (in pascuis, pratis apertis, aggeribus. Jun. Aug.)

2. *T. orientale*: calycibus corollae radio brevioribus, foliis integris subundulatis. (in pratis circa Tokarewa. Jul. Henning.)
3. *T. majus*: calycibus corollae radium superantibus, pedunculo superne incrassato, corollulis apice rotundatis. *Jacqu. austr.* t. 29. (in montosis arenosis ad monasterium St. Simeonis. Aug.)

269. *SONCHUS*. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus ventricosus. Pappus pilosus sessilis.

1. *S. palustris*: pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi sagittatis. *Fl. dan.* t. 1109. (in pratis paludosis. Jun. Jul.)
2. *S. arvensis*: pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis runcinatis basi cordatis. *Fl. dan.* t. 606. (in agris humidiusculis argillosis, inter segetes. Jul. Aug.)
3. *S. oleraceus*: pedunculis subtomentosis umbellatis, calycibus glabris, foliis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus denticulatis subsinuatis. *Fl. dan.* t. 682. (in cultis, agris, hortis. Jun. Aug.)
4. *S. asper*; [*rigidus*] pedunculis calycibusque glabris, foliis ovato-oblongis integris dentatis: dentibus alternis minoribus, seminibus glabris. *Fl. dan.* t. 843. (in agris, arvisque. Jul. Sept.)

270. *LACTUCA*. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex stipitatus. Semina laevia.

1. *L. Scariola*: foliis verticalibus carina aculeatis runcinato-sinuatis denticulatis acutis. *Fl. dan.* t. 1227. (in ruderatis, aggeribus, ad vias, marginesque fossarum. Jun. Aug.)

b. *Lactuca sanguinea*: caule foliisque maculis sanguineis adpersis. *Herm. parad.* t. 191. (in agris. Aug.)

271. *PRENANTHES*. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus. Pappus simplex subsessilis. Flosculi simplici serie.

1. *P. muralis*: foliis lyrato-pinnatifidis dentatis, lobo terminali quinquangulati, floribus paniculatis. *Fl. dan.* t. 509. (in nemoribus umbrosis, ruderatis, circa ruinas. Jun. Jul.)

272. *LEONTODON*. Receptaculum nudum. Calyx duplex. Pappus stipitatus pilosus.

1. *L. Taraxacum*: calyce exteriori reflexo, scapo unifloro, foliis runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis. *Fl. dan.* t. 574. (in pascuis, pratis, viis, sepibus, versuris, cultis, hortis. Mai. Oct.)

b. *Leontodon laciniatum*: foliis minoribus runcinato-laciniatis. (cum antecedente.)

273. *APARGIA*. Receptaculum nudum. Pappus plumosus sessilis. Calyx imbricatus.

1. *A. incana*: [*Hieracium incanum*] scapo unifloro subnudo calyceque pubescente, foliis lanceolatis acutis subdenticulatis cano-scabris, pilis multifidis. *Jacqu. austr.* t. 287. (in montosis sylvaticis, ad urbem Kaluga. Jul. Stephan)



2. *A. autumnalis*: [*Hedypnois autumnalis*] scapis ramosis declinatis squamosis, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabriusculis. *Engl. bot.* t. 830. (in pratis, pascuis, aggeribus, versuris. Jul. Sept.)

3. *A. hispida*: [*Leontodon hispidum*] scapo nudo unifloro, calyce hirto, foliis runcinato-dentatis hirtis, pilis furcatis. *Fl. dan.* t. 862. (in pratis, pascuisque montosis. Jun. Jul.)

274. **THRINCIA**. Receptaculum favosum. Pappus difformis: marginalis membrana multifida, centralis stipitatus plumosus. Calyx octangularis octophyllus.

1. *T. hirta*: [*Apargia hirta*] scapo unifloro, calyce glabriusculo squamulis aucto, foliis lanceolatis sinuato-dentatis, pilis simplicibus. *Engl. bot.* t. 555. (in marginibus agrorum aridis, collibusque siccis. Jul.)

275. **PICRIS**. Receptaculum nudum. Pappus plumosus stipitatus. Semina transversim striata. Calyx calyculatus.

1. *P. hieracioides*: caule erecto scabro, foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, floribus corymbosis, calyce exteriori laxo. *Engl. bot.* t. 196. (in pratis, versuris, ad sylvarum limites. Jun. Jul.)

276. **HIERACIUM**. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus ovatus. Pappus simplex sessilis.

1. *H. Pilosella*: scapo unifloro, foliis integerimis ovatis subtus tomentosis, stolonibus repentibus. *Fl. dan.* t. 1110 (in pascuis aridis, col-



libus apricis, aggeribus, versuris, ad vias. Mai. Aug.)

2. *H. dubium*: scapo subquadrifloro nudo, foliis oblongis obtusis integerrimis, stolonibus repentibus. *Fl. dan.* t. 1111. (in pascuis subudis, sylvisque. Jun. Jul.)
3. *H. cymosum*: scapo folioso hispido, floribus corymboso - paniculatis, pedunculis propriis glomeratis, calycibus hispidis, foliis oblongo-lanceolatis integris hirtis. *Spreng. hal.* t. 10. (in sylvaticis, pascuis, montosis. Mai. Jun.)
4. *H. praemorsum*: scapo nudo racemoso, foliis ovatis pubescentibus subdentatis, floribus superioribus primoribus. *Fl. dan.* t. 942. (in collibus herbidis, nemorosis, sylvaticis. Jul.)
5. *H. murorum*: caule recto folioso pilosissimo simplici, floribus paniculatis, foliis ovatis basi profunde dentatis. *Fl. dan.* t. 1113. (in siccis, ruderalis, apricis, muris, Jun. Jul.)  
*b. Hieracium nemorosum*: [*sylvaticum*] caule folioso subramoso, foliis aequalibus ovatis dentato-sinuatis submaculatis. *Blackw.* t. 538. (in nemoribus et sylvis arenosis. Jun. Jul.)
6. *H. paludosum*: caule simplici, foliis glabris oblongis basi attenuatis runcinato-dentatis, caulinis amplexicaulibus, floribus paniculatis, calycibus hispidis. *Fl. dan.* t. 923. (in nemoribus umbrosis humidis. Jun. Jul.)
7. *H. sibiricum*: [*Crepis sibirica*] caule erecto paniculato sulcato pubescente, foliis rugosis, radicalibus oblongis dentatis, caulinis amplexicaulibus, basi inaequaliter profunde dentatis,

summis lanceolatis, calycibus laxis hispidis, *Gmel. fl. sib. III. t. 10.* (in sylvaticis graminosis. Jun. Jul.)

8. *H. sabaudum*: caule erecto simplici, foliis ovato-oblongis subglabris acutis sessilibus sub-amplexicaulibus basin versus dentatis, floribus corymbosis. *Fl. dan. t. 872.* (in nemoribus, humidiusculis, in montibus passerinis, tribus montibus, Kunzowa. Jul. Aug.)

9. *H. umbellatum*: caule erecto simplici, foliis linearibus subdentatis, floribus corymboso-umbellatis, calycibus squarrosis. *Fl. dan. t. 680.* (in pascuis editioribus siccis, ad scaturigines sylvarum. Jul. Aug.)

*b. Hieracium lineare*: foliis angustis linearibus. (in sylva prope monasterium St. Simeonis. Aug.)

277. CREPIS. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, squamis deciduis.

1. *C. tectorum*: foliis glabriusculis lanceolato-runcinatis, laciniis adscendentibus, summis linearibus filiformi-sagittatis amplexicaulibus, floribus corymbosis, calycibus pubescentibus. (in pascuis editioribus arenosis, aridis tectis, interque segetes. Jun. Jul.)

2. *C. biennis*: foliis hispidis runcinato-pinnatifidis, summis sessilibus lanceolatis dentatis carina hispido-aculeatis, calycibus pubescentibus muricatis. *Engl. bot. t. 149.* (in pratis, pascuis, ruderalis, nemoribus. Jul. Aug.)

278. HYPOCHOERIS. Receptaculum paleaceum. Calyx imbricatus. Pappus plumosus.

1. *H. maculata*: [*hirsuta*] caule subnudo, ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Fl. dan.* t. 149. (in nemorosis montosis, pratis asperis, ad vias. Jun. Aug.)

279. *LAPSANA*. Receptaculum nudum. Calyx subcalyculatus, squamis singulis interioribus canaliculatis. Pappus nullus.

1. *L. communis*: caulescens ramosa, foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis. *Fl. dan.* t. 500. (in cultis, hortis, ruderatis, sepibus. Jun. Jul.)

280. *CICHORIUM*. Receptaculum subpaleaceum. Calyx calyculatus. Pappus polyphyllus paleaceus.

1. *C. Intybus*: floribus axillaribus geminis subsessilibus, foliis runcinatis. *Fl. dan.* t. 907. (in versuris, pratis, viis, ruderatis. Jul. Aug.)

*b. Cichorium sativum*: radice crassiore succulenta. (cultum.)

*c. Cichorium variegatum*: foliis variegatis, (in hortis, cultum.)

281. *ARCTIUM*. Receptaculum paleaceum. Calyx globosus, squamis apice hamis inflexis. Pappus ætoso-paleaceus.

1. *A. Lappa*: foliis caulinis cordatis petiolatis denticulatis, calycibus laevibus. *Engl. bot.* t. 1228. (in ruderatis, ad vias et sepes. Jul. Aug.)

*a. Arctium majus*: squamis calycinis margine paleaceis: paleis obtusis clavatis. *Schkuhr.* II. t. 227.

*b. Arctium minus*: squamis calycinis margine paleaceis: paleis acutis cylindratis. *Schkuhr.* *ibid.*

2. *A. Bardana*: foliis caulinis cordatis petiolatis integerrimis, calycibus arachnoideo-tomentosis. *Fl. dan.* t. 642. (cum prioribus. Jul. Aug.)

232. *SERRATULA*. Receptaculum paleaceum seu villosum. Calyx imbricatus cylindraceus inermis. Pappus plumosus sive dentatus.

1. *S. tinctoria*: foliis argute serratis basi subpinnatifidis, corymbo fastigiato. *Fl. dan.* t. 281. (in pratis et nemoribus. Jun. Jul.)

2. *S. arvensis*: foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis undulatis spinosis glabris, caule paniculato. *Engl. bot.* t. 975. (in agris, cultis, arvis, viis. Jul. Aug.)

3. *S. setosa*: foliis oblongis glabris serrulatis setaceo-ciliatis obtusis mucronatis, caule corymboso. *Secliger* (in ruderalis, hortis ubique. Jul. Aug.)

283. *CARDUUS*. Calyx imbricatus ventricosus, squamis spinosis. Pappus capillaris seu scaber. Receptaculum villosum.

1. *C. nutans*: foliis semidecurrentibus spinosis, floribus cernuis, squamis calycinis superne patentibus. *Fl. dan.* t. 675. (in ruderalis, ad vias, pagosque. Jul. Aug.)

2. *C. acanthoides*: foliis decurrentibus sinuato-spinosis, calycibus globosis subpedunculatis, squamis linearibus recurvatis. *Engl. bot.* t. 975. (in ruderalis, viisque. Jul. Aug.)

3. *C. crispus*: foliis decurrentibus oblongis sinuatis margine spinosis subtus lanuginosis, floribus pedunculatis aggregatis terminalibus, caly-

cinis squamis lineari-subulatis mucronatis patulis. *Fl. dan.* t. 621. (in agris, cultis, sepibus. Jul. Aug.)

4. *C. marianus*: foliis amplexicaulibus hastatopinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis duplicato-spinosis. *Engl. bot.* t. 976. (in cultis, hortisque Jul. Aug.)

284. *CNICUS*. [*olim ad Carduum*] Calyx imbricatus ventricosus, squamis spinosis. Pappus plumosus. Receptaculum villosum

1. *C. palustris*: foliis decurrentibus nudis lanceolatis dentatis margine spinosis, floribus racemoso-glomeratis, squamis calycinis ovato-lanceolatis mucronatis adpressis. *Engl. bot.* t. 974. (in pratis humidis subpaludosis. Jul. Aug.)
2. *C. lanceolatus*: foliis decurrentibus hispidis pinnatifidis, laciniis bilobis divaricatis spinosis, calycibus ovatis arachnoideo-pubescentibus, squamis lanceolatis spinosis patentibus *Fl. dan.* t. 1173. (in ruderalis, agris, ad vias. Jul. Aug.)
3. *C. eriophorus*: foliis sessilibus pinnatifidis hispidis, laciniis geminatis divaricatis spinosis, calycibus globosis arachnoideo-villosis, squamis oblongis apice linearibus elongatis mucronatis reflexis. *Engl. bot.* t. 386. (in sterilibus, montosis. Jul. Aug.)
4. *C. heterophyllus*: foliis amplexicaulibus cordatis lanceolatis serratis ciliatis subtus tomentosis, inferioribus subincisis, calycinis squamis

lanceolatis adpressis submucronatis. *Allion. pedem.* t. 34. (in pratis montosis nemorosis, Jun. Jul.)

5. *C. helenioides*: foliis subcordatis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis subtus tomentosis, inferioribus subincisis, floribus aggregatis, squamis calycinis lanceolatis adpressis mucronatis. *Mill. dict.* t. 94<sup>2</sup> (in ruderatis. Jul.)

6. *C. serratuloides*: foliis lanceolatis sessilibus ciliatis subtus strigosis, radicalibus sinuatis, caule ramoso, squamis calycinis oblongo-lanceolatis mucronatis apice recurvatis. *Jacqu. austr.* t. 127. (in ruderatis, ad vias. Jul. Aug.)

7. *C. oleraceus*: foliis amplexicaulibus cordatis pinnatifidis ciliato-serratis, floribus terminalibus subracemosis bracteatis, bracteis subcoloratis ovatis, squamis calycinis lanceolatis spinosis. *Schkuhr.* t. 229. (in pratis umbrosis, subnemorosis humidis. Jun. Aug.)

285. *ONOPORDON*. Receptaculum favosum. Pappus capillaris. Calyx imbricatus, squamis mucronatis.

1. *O. Acanthium*: squamis calycinis patentissimis, foliis decurrentibus tomentosis sinuatis dentatis spinosis. *Fl. dan.* t. 909. (in ruderatis, pagis, collibus, sepibus, visque. Jun. Aug.)

286. *CARLINA*. Receptaculum paleaceo-setosum. Corollae flosculosae. Calyx radiatus, squamis marginalibus longis coloratis. Pappus paleaceo-plumosus.



1. *C. vulgaris*: caule multifloro corymboso pubescente, foliis lanceolatis dentatis spinosis subtus pubescentibus *Fl. dan. t. 1174.* (in sylvaticis montosis arenosis asperis. Jul. Aug.)

287. *BIDENS*. Receptaculum paleaceum planum. Semina tetragona. Pappus aristis binis seu quaternis erectis scabris. Calyx subaequalis calyculatus. (Corolla rarius flosculo uno alterove radiante instruitur.)

1. *B. tripartita*: floribus discoideis, calycibus exterioribus flore majoribus, seminibus erectis, foliis tripartitis lanceolatis dentatis. *Engl. bot. t. 1113.* (in inundatis, ad fossas, Jul. Aug.)

2. *B. cernua*: floribus subradiatis cernuis, calyce exteriori flore longiore, foliis lanceolatis subconnatis dentatis. *Engl. bot. t. 1114.* (in udis, humidis, paludosis Jul. Aug.)

*b. Bidens radiata*: [*Coreopsis Bidens*] floribus radiatis. *Moris hist. III. t. 5. f. 25.* (in paludosis profundioribus, inundatisque. Jul. Aug.)

*c. Bidens pumila*: [*minima*] foliis lanceolatis sessilibus, floribus seminibusque erectis. *Fl. dan. t. 312.* (in sphagnetis, uliginosis turfosis, paludibus Jul. Aug.)

288. *EUPATORIUM*. Receptaculum nudum. Pappus pilosus seu scaber. Calyx imbricatus. Stylus semibifidus longus.

1. *E. cannabinum*: foliis petiolatis tripartitis, laciniis lanceolatis serratis, intermedia longiore.

*Fl. dan. t. 745.* (in pratis paludosis, ad aquarum rivulos. Jul. Aug.)

## S U P E R F L U A.

289. *TANACETUM*. Receptaculum nudum. Pappus submarginatus. Calyx imbricatus hemisphaericus. Corollulae radii obsoletae, trifidae.

1. *T. vulgare*: foliis bipinnatis incisiss serratis. *Fl. dan. t. 871.* (in aggeribus versuris, sepibus, nemorosis, fruticetis. Jun. Aug.)

*b. Tanacetum crispum*: foliis crispis. *Dodan. pempt. 36* (in hortis. Jul. Aug.)

290. *ARTEMISIA*. Receptaculum subvillosum vel nudiusculum. Pappus nullus. Calyx imbricatus, squamis rotundatis conniventibus. Corollae radii nullae.

1. *A. campestris*: foliis caulinis setaceis pinnatis glabris, radicalibus pinnatis: laciniis trifidis incanis, caule procumbente ramoso virgato, floribus ovatis pedunculatis. *Fl. dan. t. 1175.* (in collibus aridis, campis apricis, ad pagos et coemeteria. Jul. Aug.)

2. *A. Absinthium*: foliis multipartitis sericeo-incanis, laciniis lanceolatis obtusiusculis, floribus racemosis hemisphaericis pendulis, receptaculo piloso. *Engl. bot. t. 1230.* (in sepulcris, ruderatis, aggeribus, viisque. Jun. Aug.)

3. *A. vulgaris*: foliis pinnatifidis subtus tomentosis, laciniis lanceolatis acutis, calycibus

subsessilibus racemosis ovatis tomentosis. *Fl. dan.* t. 1176. (in cultis, ruderatis, versuris, pagis. Jun. Jul.)

*b. Artemisia rubra*: caule floribusque rubris. (cum praecedente)

291, GNAPHALIUM. Receptaculum nudum. Pappus pilosus vel plumosus. Calyx imbricatus, squamis marginalibus rotundatis scariosis coloratis.

1. *G. dioicum*: sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, foliis radicalibus spathulatis, corymbo coarctato, floribus dioicis, calycinis squamis interioribus elongatis obtusis coloratis. *Fl. dan.* t. 1228. (in pascuis editioribus, versuris apricis, aridisque sylvaticis. Jun. Jul.)

*a. Gnaphalium masculum*: corollulis albis

*b. Gnaphalium femineum*: corollulis roseis.

2. *G. rectum*: caule herbaceo erecto simplici, foliis lineari-lanceolatis subtus sericeis, floribus terminalibus et axillaribus sessilibus spicatis. *Fl. dan.* t. 1229. (in sylvaticis montosis. Jul. Aug.)

3. *G. sylvaticum*: caule herbaceo erecto simplicissimo, foliis lanceolatis utrinque attenuatis lanatis, floribus terminalibus sessilibus spicatis. *Fl. dan.* t. 254. (in sylvis. Jul.)

4. *G. uliginosum*: caule herbaceo ramoso diffuso lanato, foliis lineari-lanceolatis utrinque angustatis tomentosis, floribus terminalibus congestis. *Fl. dan.* t. 859. (in humidiusculis, inundatis, uliginosis. Jul. Aug.)

*l. Gnaphalium nudum*: caule ramoso diffuso, floribus confertis foliisque utrinque nudis (in uliginosis, inundatis. Jul. Aug.)

292. *CONYZA*. Receptaculum nudum. Pappus simplex. Calyx imbricatus subrotundus. Corollae radii trifidae.

1. *C. squarrosa*: foliis scabris, caulinis ovato-oblongis serratis, rameis oblongo-lanceolatis subintegerrimis, caule herbaceo corymboso, calycibus squarrosis. *Fl. dan.* t. 622. (in siccis montosis. Jul. Aug.)

293. *ERIGERON*. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Corollae radii lineares angustissimae.

1. *E. canadense*: caule floribusque paniculatis hirtis, foliis lanceolatis ciliatis. *Fl. dan.* t. 292. (in arvis, ruderatis, cultis, hortis, sylvis. Jul. Aug.)

2. *E. acre*: caule racemoso piloso, pedunculis alternis unifloris, foliis lanceolato-ligulatis. *Engl. bot.* t. 1158 (in montosis apricis arenosis calcareis siccis Mai. Jul.)

294. *TUSSILAGO*. Receptaculum nudum. Pappus simplex. Calycis squamae aequales discum aequantes submembranaceae. Corollae femineae ligulatae sive edentulae.

1. *T. Farfara*: scapo unifloro subnudo bracteato, flore radiato, foliis cordatis angulatis dentatis subtus pubescentibus. *Fl. dan.* t. 595. (in aggeribus, agrisque limosis argillosis subhumidis, in ruderatis, sylvaticis. Mai.)

2. *T. Petasites*: thyrsos oblongo, floribus discoideis, foliis oblongo-cordatis inaequaliter denticulatis subtus pubescentibus, lobis approximatis. *Fl. dan.* t. 342. (ad margines fossarum et torrentum. Mai.)

*b. Tussilago hybrida*: thyrsos oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Hort. cliff.* 411.

295. *SENECIO*. Receptaculum nudum. Pappus simplex. Calyx cylindricus calyculatus, squamis apice sphacelatis.

1. *S. vulgaris*: corollis nudis, foliis amplexicaulibus pinnatifidis dentatis, floribus corymboso-coarctatis. *Fl. dan.* t. 513. (in ruderalis, agris, cultis, hortisque. Mai. Aug.)

2. *S. sylvaticus*: corollis revolutis, foliis pinnatifidis lobatis denticulatis subpilosis, calyculis brevissimis, caule corymboso erecto. *Rupp. fl. jenens.* t. 3. (in sylvis caeduis. Jul. Aug.)

*b. Senecio pumilus*: caule floreque simplici. *Schkuhr.* t. 267. (in ericetis montanis sterilibus. Jul. Aug.)

3. *S. Jacobaea*: radio patente, foliis lyrato-bipinnatifidis divaricatis dentatis glabris, caule erecto. *Engl. bot.* t. 1135. (in pascuis, pratisque editioribus nemorosis. Jul. Aug.)

4. *S. paludosus*: corollis radiantibus, foliis semiamplexicaulibus lanceolatis argute serratis subtus subvillosis, corymbo terminali divaricato, caule stricto. *Fl. dan.* t. 385. (in paludibus, aquis stagnantibus. Jun. Jul.)

5. *S. saracenicus*: corollis radiantibus, foliis lan-

ceolatis basi cuneatis argute serratis subsessilibus glabriusculis. *Jacqu. austr.* t. 186. (in paludibus nemorosis, montosis umbrosis. Jul. Aug.)

296. *SOLIDAGO*. Receptaculum nudum. Pappus simplex. Corollae radii circiter quinae. Calycis squamæ imbricatae clausae.

1. *S. Virgaurea*: caule erecto tereti superne ramoso et pubescente, foliis caulinis lanceolatis utrinque attenuatis serratis, inferioribus ellipticis pilosiusculis, racemis erectis, ligulis elongatis. *Fl. dan.* t. 663. (in nemoribus montosis, pascuis siccis, ad sylvarum margines. Jul. Aug.)

297. *INULA*. Receptaculum nudum. Pappus simplex. Antherae basi in setas duas desinentes.

1. *I. Helenium*: foliis amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Fl. dan.* t. 718. (ad pagos, in sylvaticis humidiusculis, et paludosis. Jun. Jul.)

2. *I. dysenterica*: foliis amplexicaulibus cordato-oblongis incano-tomentosis repandis obsolete denticulatis, ramis lateralibus medios superantibus patulis, squamis calycinis setaceis. *Fl. dan.* t. 410. (in pratis humidis, fossisque exsiccatis. Jul. Aug.)

3. *I. salicina*: [*Bupthalmum salicinum*] foliis amplexicaulibus lanceolatis recurvis nudis serratis scabriusculis, ramis angulatis, inferioribus altioribus. *Fl. dan.* t. 786. (in pratis nemorosis. Jul. Aug.)

4. *I. hirta*: foliis sessilibus lanceolatis obsolete serratis rigidis hirtis, caule subuni-floro, caly-



cinis squamis lanceolatis ciliatis. *Jacqu. [austr. t. 358. (in pratis montosis nemorosis. Jun. Jul.)*

298. CHRYSANTHEMUM. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx hemisphaericus imbricatus, squamis marginalibus membranaceis.

1. *C. Leucanthemum*: foliis amplexicaulibus lanceolatis serratis basi inciso-dentatis, caule erecto ramoso. *Fl. dan. t. 994. (in pratis, arvis, pascuis, inter segetes. Jun. Jul.)*

*b. Chrysanthemum sylvestre*: tota planta hirsuta atque robustior. (in arvis et sylvis. Jul.)

2. *C. montanum*: foliis inferioribus petiolatis spathulatis serratis, superioribus lineari-lanceolatis serratis, caule subunifloro. *Allion. pedemont. t. 37. f. 2. (in collibus siccioribus ad oppodium Podolsk. Jul.)*

299. PYRETHRUM. Receptaculum nudum planiusculum. Pappus marginatus. Calyx hemisphaericus imbricatus, squamis acutiusculis margine scariosis.

1. *P. corymbosum*: [*Chrysanthemum corymbosum*] foliis pinnatis, pinnis lanceolatis pinnatifidis argute serratis, summis confluentibus, pedunculis corymbosis. *Jacqu. austr. t. 379. (in sylvaticis montosis, in marginibus sylvae St. Annae, et in Kunzowa. Jun. Jul.)*

2. *P. Parthenium*: [*Matricaria Parthenium*] foliis pinnatis, pinnis oblongis obtusis pinnatifidis dentatis, summis confluentibus, caule ramoso, floribus corymbosis, radio calyce fere duplo

longiore, pappo dentato. *Fl. dan. t. 674.* (in cultis, hortisque. Jun. Jul.)

3. *P. inodorum*: [*Chrysanthemum inodorum*] foliis bipinnatis, pinnis lineari-filiformibus bivel tripartitis, caule diffuso ramoso, pappo gerrimo. *Fl. dan. t. 696.* (in ruderatis, arvis, agris, cultis. Jul. Aug.)

300. *MATRICARIA*. Receptaculum nudum cylindraceo-conicum. Pappus nullus. Calyx planus imbricatus, squamis margine scariosis.

1. *M. suaveolens*: foliis triplicato-pinnatis, squamis calycinis acutis. (in ruderatis, circa pagos. Jul. Aug.)

2. *M. Chamomilla*: foliis bipinnatifidis linearibus glabris, radio patente, squamis calycinis obtusiusculis. *Engl. bot. t. 1232.* (in agris, cultis, inter segetes. Jul.)

301. *ANTHEMIS*. Receptaculum paleaceum. Pappus nullus sive margo membranaceus. Calyx hemisphaericus subaequalis. Flosculorum radii plusquam quinque.

1. *A. arvensis*: receptaculis conicis, paleis lanceolatis, seminibus coronato-marginatis, foliis bipinnatis, laciniis lanceolato-linearibus. *Fl. dan. t. 1178.* (inter segetes, in agris, hortis, viis. Jun. Jul.)
2. *A. Cotula*: receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus nudis, foliis bipinnatis, foliolis subulatis tripartitis. *Fl. dan. t. 1179.* (in agris et ruderatis. Jun. Jul.)

3. *A. tinctoria*: foliis bipinnatifidis argute serratis subtus pubescentibus, caule erecto ramoso, pappo membranaceo integerrimo. *Fl. dan.* t. 741. (in collibus et aggeribus, arvis, dumetis, sepibusque. Jul. Aug.)

302. *ACHILLEA*. Receptaculum paleaceum. Pappus nullus. Calyx ovatus imbricatus. Flosculi radii circiter quaterni.

1. *A. Ptarmica*: foliis linearibus acuminatis aequaliter argute serrulatis glabris, caule paniculato, corymbis compositis, paleis integris. *Fl. dan.* t. 643. (in pratis humidiusculis, ad sylvam St. Annae, in Kunzowa et Perowa. Jul.)

2. *A. Millefolium*: foliis bipinnatis multifidis glabriusculis, pinnarum laciniis linearibus inciso-dentatis suberectis. *Fl. dan.* t. 737. (in pratis, pascuis, versuris, viisque. Jun. Aug.)

*b. Millefolium purpureum*: corollulis purpureis. (in aggeribus, coemeteriis et sylvis. Jul. Aug.)

## FRUSTRANEA.

303. *HELIANTHUS*. Receptaculum paleaceum planum. Pappus diphyllus. Calyx imbricatus subsquarrosus.

1. *H. tuberosus*: foliis triplinerviis scabris, inferioribus cordato-ovatis, superioribus ovatis acuminatis alternis, petiolis basi ciliatis. *Jacqu. hort.* t. 161. (in campis et cultis perennans)

304. *CENTAUREA*. Receptaculum setosum. Pappus simplex. Corollae radii infundibuliformes longiores irregulares.

1. *C. phrygia*: calycibus recurvato-plumosis, foliis oblongis indivisis scabris mucronato-serrulatis. *Fl. dan.* t. 520. (in pratis montosis sylvaticis. Jun. Jul.)

2. *C. Cyanus*: calycibus serratis, foliis linearibus sessilibus integerrimis, infimis basi pinnatifidis. *Fl. dan.* t. 993. (inter segetes. Jun. Jul.)

Variat in hortis corollis coeruleis, cyaneis, violaceis, lilacinis, purpureis, sanguineis, rubris, incarnatis, roseis et albis.

3. *C. paniculata*: calycibus ciliatis ovatis adpressis, foliis inferioribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifidis, caule paniculato. *Moris. hist.* III. t. 28. f. 15. (in collibus, ruderalis, versuris, agris, arvis, viis. Jun. Jul.)

4. *C. Scabiosa*: calycibus ciliatis pubescentibus, foliis pinnatifidis scabriusculis, laciniis lanceolatis acutis basi pinnatifidis. *Fl. dan.* t. 1231. (in pratis, versuris, arvis, aggeribus, nemoribus. Jun. Jul.)

5. *C. Jacea*: calycibus scariosis, squamis ovatis apice laceris, foliis lanceolatis integerrimis, radicalibus subdentatis, ramis angulatis. *Fl. dan.* t. 519. (in pratis, graminosis, pascuis, sylvaticis. Jun. Aug.)

## NECESSARIA.

305. *FILAGO*. Calyx imbricatus Receptaculum nullum. Pappus nullus. Flosculi feminei inter squamas calycis locati.

1. *F. arvensis*: [*Gnaphalium arvense*] caule erecto herbaceo paniculato, foliis oblongo-lanceolatis lanuginosis, floribus congestis subspicatis mollissime tomentosis. (in campis et arvis sterilibus. Jul. Aug.)

## GYNANDRIA.

### MONANDRIA.

306. *ORCHIS*. Corolla pentapetala, petalo superiore fornicato. Labellum basi subtus calcareatum. Anthera terminalis adnata

\* *Radicibus testiculatis.*

1. *O. bifolia*: labello lineari integerrimo obtuso, cornu germine duplo longiore, foliis caulinis vaginantibus brevissimis, radicalibus binis oblongis basi attenuatis. *Fl. dan.* t. 235. (in nemoribus, pascuis humidis. Mai. Jun.)
2. *O. cucullata*: labello trifido, laciniis acutis, calcare germine breviorē incurvato, spica laxa secunda, foliis radicalibus binis ovatis. *Gmel. sibir.* I. t. 3. f. 2. (in montibus passerinis, Archangelsk, Perowa, Gorenki, Kuskowa, Petrowsk. Jun. Jul.)
3. *O. coriophora*: labello trifido, lacinia media angustiore integerrima, lateralibus reflexis den-



ticulatis, calcare brevissimo, petalis conniventibus *Hall. stirp.* t. 34. (in pratis. Jun.)

4. *O. Morio*: labello trifido, lobis crenatis obtusis: medio emarginato, petalis adscendentibus obtusis, cornu conico adscendente germine brevior. *Schkuhr.* t. 271. in pratis humidiusculis. Mai. Jun.)

5. *O. mascula*: labello trifido crenulato obtuso, lobo medio bifido, cornu obtuso adscendente germen aequante, petalis acutis: exterioribus reflexis, foliis lato-lanceolatis, *Jacqu. ic. rar.* t. 180 (in pratis humidis nemorosis. Jun. Jul.)

6. *O. militaris*: labello tripartito punctato scabro, laciniis lateralibus linearibus, intermedia biloba obtusa cum mucrone interjecto, petalis acutis conniventibus, cornu recto germine duplo brevior, bracteis obsoletis. *Hall. stirp.* t. 28. (in nemoribus, sylvaticis. Mai. Jun.)

\*\* *Radicibus palmatis.*

7. *O. latifolia*: labello leviter trilobo lateribus reflexo, petalis superioribus conniventibus, binis lateralibus reflexis, cornu conico germine brevior, bracteis flore longioribus. *Fl. dan.* t. 266. (in pratis humidis. Jun. Jul.)

Variat corollis violaceis, sanguineis, purpureis, rubris, incarnatis, roseis, albisque, nec non foliis fusco-maculatis.

*b. Orchis angustifolia*: foliis lineari-lanceolatis canaliculatis, spica conferta, labello subcuneato, lobo intermedio obsoleto, bulbo bipartito divaricato. (in pratis paludosis. Jun. Jul.)



8. *O. maculata*: labello plano trilobo crenato, petalis superioribus conniventibus, lateralibus patentibus, cornu cylindraceo germine brevior, bracteis longitudine germinis. *Fl. dan.* t. 933. (in nemoribus, pratisque succulentis. Jun. Jul.)

*b. Orchis alba*: corollis albis.

9. *O. conopsea*: labello obtuse trilobo, petalis lateralibus patentissimis, cornu subulato germine duplo longiore. *Fl. dan.* t. 224. (in pratis nemorosis montosis. Mai. Jun.)

307. NEOTTIA. Corolla pentapetala ringens, petalis exterioribus lateralibus antice circa basin labelli ventricosi connexis. Anthera stylo acuminato parallela, postice inserta.

1. *N. repens*: [*Satyrium repens*] foliis radicalibus ovatis petiolatis reticulatis, scapo vaginato floribusque pubescentibus, floribus secundis, labello petalisque lanceolatis. *Fl. dan.* t. 810. (in sylvis sterilibus, versus Butirki, Petrowsk. Jun. Jul.)

2. *N. spiralis*: [*Ophrys spiralis*] labello ovato crispato crenulato, spica tortili, floribus secundis, foliis radicalibus subpetiolatis oblongis. *Fl. dan.* t. 387. (in nemorosis montosis, herbidisque sylvaticis. Jul. Aug.)

308. SATYRIUM. Corolla pentapetala ringens, petalo superiore fornicato. Labellum lineare, partitum vel subintegrum. Calcar breve subinflatum aut nullum. Anthera orchidis.

1. *S. viride*: bulbis palmatis fibrosis, foliis oblongis obtusis, labello lineari trifido, lacinia in-

termedia brevior. *Engl. bot.* t. 94. (in pratis sylvaticis montosis, in Perowa et Kunzowa. Jul. Aug.)

2. *S. Monorchis*: [*Ophrys Monorchis*] bulbo globoso, scapo nudo, labello trifido cruciato basi subgibboso. *Fl. dan.* t. 22. (in collibus graminosis, pratisque subhumidis. Jun.)

309. *EPIPACTIS*. Corolla pentapetala erecto-patens. Labellum ecalcaratum. Anthera opercularis persistens. Pollen pulvereo-granulatum.

1. *E. latifolia*: [*Serapias latifolia*] foliis ovatis amplexicaulibus, bracteis inferioribus flore longioribus, floribus pendulis, labello integerrimo acuminato petalis brevioribus, germinibus pubescentibus. *Fl. dan.* t. 31. (in sylvis montosis. Jun. Jul.)

2. *E. palustris*: [*Serapias longifolia*] foliis lanceolatis amplexicaulibus, bracteis flore brevioribus, floribus pendulis, labello crenato obtuso petalis aequali, germinibus pubescentibus. *Fl. dan.* t. 267. (in pratis udis sylvaticis prope Kuskowa. Jul.)

3. *E. grandiflora*: [*Serapias lancifolia*] foliis oblongo-lanceolatis sessilibus, bracteis germine longioribus, floribus erectis, labello obtuso petalis breviori, germine glabro. *Engl. bot.* t. 271. (in sylvaticis montosis; solo calcareo. Jul.)

4. *E. rubra*: [*Serapias rubra*] foliis lanceolatis, bracteis germine glabro longioribus, floribus erectis, labello acuto lineis undulatis notato. *Fl. dan.* t. 345. (cum praecedente. Jul.)

5. *E. Nidus avis*: [*Ophrys Nidus avis*.] caule aphylo vaginato, labello obcordato petala obtusa duplo superante. *Fl. dan.* t. 181. (in nemoribus umbrosis, ad radices querci. Jun.)

6. *E. ovata*: [*Ophrys ovata*] caule bifolio, foliis ovatis oppositis, labello lineari petalis obtusis triplo longiore. *Fl. dan.* t. 137. (in nemorosis. Mai. Jun.)

7. *E. cordata*: [*Ophrys cordata*] caule bifolio, foliis cordatis, labello basi utrinque unidentato. *Engl.bot.* t. 358. (in sylvis humentibus montosis, circa Gorenki. Jul.)

310. MALAXIS. Corolla pentapetala patens resupinata. Labellum concavo-patulum adscendens. Anthera opercularis.

1. *M. monophylla*: [*Ophrys monophylla*] folio subsolitario ovato acuto, scapo triquetro, labello concavo acuminato. *Jacqu. coll.* IV. t. 13. f. 2. (in paludibus sylvaticis. Jul.)

b. *Malaxis bifolia*: major, foliis binis. *Buxb. cent.* III t. 26. (in umbrosis. Jul.)

311. CYMBIDIUM. Corolla pentapetala erecta vel patens. Labellum basi concavum ecalcaratum, lamina patula. Anthera opercularis decidua. Pollen globosum.

1. *C. Corallorhiza*: [*Ophrys Corallorhiza*] caule aphylo vaginato, floribus erectis, petalis lanceolatis, infimis deflexis, labello oblongo integro. *Fl. dan.* t. 451. (in sylvaticis paludosis, Kunzowa et Kuskowa. Jun. Jul.)

## DIANDRIA.

312. *CYPRIPEDIUM*. Corolla tetrapetala patens. Labellum ventri cosum inflatum. Stylus superne-lobo petaloideo appendiculatus.

1. *C. guttatum*: caule diphylo, foliis alternis ovato-oblongis obtusis, lobo styli ovato emarginato deflexo, labello petalis obtusis longiore. *Amm. ruth.* t. 22. (in montibus passerinis. Jul. Fortunatow.)

## HEXANDRIA.

313. *ARISTOLOCHIA*. Calyx nullus. Corolla monopetala ligulata basi ventricosa. Capsula sex-locularis infera polysperma.

1. *A. Clematitis*: foliis subrotundo-cordatis obtusiusculis petiolatis, caule erecto, pedunculis unifloris aggregatis, corollis erectis, labio oblongo. *Fl.dan.* t. 1235. (in sylvaticis et nemorosis. Jun.)

## MONOECIA.

### MONANDRIA.

314. *CHARA Mas.* Calyx nullus. Corolla nulla. Anthera globosa sessilis.

*Femina*: Calyx nullus. Corolla nulla Stylus nullus. Stigmata quina. Bacca unilocularis polysperma.

1. *C. vulgaris*: caulibus ramulisque basi nudis, ramulis teretibus, articulis foliosis, foliolis oblongo-subulatis, bracteis bacca brevioribus. *Engl. bot. t. 336.* (in aquis stagnantibus, Jun. Aug.)

## DIANDRIA.

315. *LEMNA*. *Mas*: Calyx monophyllus. Corolla nulla.

*Femina*: Calyx monophyllus. Corolla nulla. Stylus singulus. Capsula unilocularis disperma.

1. *L. trisulca*: foliis lanceolatis in petiolum attenuatis cruciatim cohaerentibus, radicibus solitariis. *Engl. bot. t. 926.* (in agris stagnantibus, lacubus et fossis. Jun.)

2. *L. minor*: foliis ellipticis utrinque planis basi cohaerentibus, radicibus solitariis. *Engl. bot. t. 1095.* (cum priore. Jun.)

3. *L. gibba*: foliis ellipticis subtus hemisphaericis basi cohaerentibus, radicibus solitariis. *Engl. bot. t. 1233.* (cum antecedentibus.)

4. *L. polyrhiza*: foliis ellipticis planis basi cohaerentibus, radicibus fasciculatis *Schkuhr. t. 287.* (cum ceteris generis sui. Jun.)

## TRIANDRIA.

316. *TYPHA*. *Mas*: Amentum cylindricum. Calyx obsoletus triphyllus. Corolla nulla.

*Femina*: Amentum cylindricum sub-masculo. Calyx nullus. Corolla nulla. Semen unicum pe-

dicellatum, pedicello basi pilis longis pappi instar cincto.

1. *T. latifolia*: foliis linearibus planis, spica mascula femineaque approximatis, utraque cylindrica *Fl. dan.* t. 645. (in paludibus, piscinis, fossisque profundioribus Jul).
2. *T. angustifolia*: foliis linearibus canaliculatis, spica mascula femineaque remotis, utraque cylindrica. *Fl. dan.* t. 815. (in paludibus, stagnisque Jul.)

317. SPARGANIUM. *Mas*: Amentum subrotundum. Calyx triphyllus. Corolla nulla.

*Femina*: Amentum subrotundum. Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stigma bifidum. Drupa exsucca monosperma.

1. *S. ramosum*: foliis basi triquetris, lateribus concavis, pedunculo communi ramoso, stigmate lineari, *Engl. bot.* t. 744. (in aquis lente fluentibus. Jul)

2. *S. simplex*: foliis basi triquetris, lateribus planis, pedunculo communi simplici, stigmate lineari. *Engl. bot.* t. 745. (in aquosis, paludosis. Jul)

318. CAREX. *Mas*: Amentum imbricatum. Calyx squama solitaria. Corolla nulla.

*Femina*: Amentum imbricatum. Calyx squama solitaria. Corolla ventricosa monopetala apice bidentata. Stigmata bina ternave. Nux triquetra corolla persistenti inclusa.

\* *Spicis dioicis.*



1. *C. dioica*: [*Linnaeana*] spica dioica simplici, stigmatibus binis, fructibus erectiusculis ovatis nervosis, foliis culmisque glabris, radice repente. *Schkuhr.* t. A. f. 1. (in pratis spongiosis paludosis. Mai.)

\*\* *Spica unica androgyna.*

2. *C. pulicaris*: spica androgyna simplici superne mascula, stigmatibus binis, fructibus oblongis teretiusculis glabris reflexis utrinque attenuatis, squama oblonga persistente longioribus. *Schkuhr.* t. A. f. 3. (in pratis, pascuisque limosis. Mai.)

\*\*\* *Spicis androgynis sessilibus alternis.*

3. *C. Chordorhiza*: spicis androgynis superne masculis in formam ovatam aggregatis, fructibus ovatis acuminatis, foliis culmeis adpressis, culmo basi subramoso. *Schkuhr.* t. G. f. 31. (in paludibus, circa Gorenki. Mai. *Londes.*)
4. *C. arenaria*: spica androgyna composita, spiculis alternis confertis: superioribus masculis, inferioribus femineis, intermediis apice masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis marginatis bifidis ciliato - serratis, culmo incurvo. *Schkuhr.* t. B. f. 6. (in arenâ mobili. Jun.)
5. *C. intermedia*: [*disticha*] spica androgyna composita, spiculis alternis confertis, inferioribus remotiusculis: superioribus et inferioribus femineis, intermediis masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis marginatis bifidis ciliato - serratis, culmo erecto. *Schkuhr.* t. B. f. 7. (in pratis udis et paludibus. Jun. Jul.)

6. *C. Schreberii*: [*praecox*] spica androgyna composita, spiculis ovatis alternis confertis inferne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis bidentatis. *Schkuhr. t. B. f. 9.* (in collibus herbidis, siccis graminosis. Mai. Jun.)
7. *C. leporina*: [*Lachenalii*] spica androgyna, spiculis tribus subrotundo - ellipticis inferne masculis alternis congestis, fructibus ellipticis compressis acuminatis, ore integris. *Schkuhr. t. Fff. f. 129.* (in pratis. Mai.)
8. *C. ovalis*: [*leporina*] spica androgyna composita, spiculis subsenis subrotundo - ellipticis alternis subapproximatis inferne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis marginatis bidentatis ciliato - serratis. *Schkuhr. t. B. f. 8.* (in pratis udis circa Butirki. Mai. Jun.)
9. *C. vulpina*: spica androgyna composita, spiculis numerosis ternatim quinatimve aggregatis oblongis confertis superne masculis; stigmatibus binis, fructibus ovatis bidentatis compressotriquetris patentibus, bracteis setaceis. *Schkuhr. t. C. f. 10.* (in paludibus, ad fossas. Mai. Jun.)
10. *C. brizoides*: spica androgyna composita subdisticha, spiculis subquinis alternis curvatis oblongo - lanceolatis approximatis inferne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis marginatis bifidis. *Host. gram. I. t. 47.* (in graminosis umbrosis. Mai. Jun.)
11. *C. muricata*: [*canescens*] spica androgyna composita, spiculis ovatis superne masculis approximatis, stigmatibus binis, fructibus hori-

zontalibus ovatis plano-convexis bidentatis basi marginatis, margine ciliato-serratis. *Schkuhr.* t. E. f. 22. (in sylvis, pratisque humidis. Mai.)

12. *C. stellulata*: [*echinata*] spica androgyna composita, spiculis subquaternis remotiusculis inferne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovato-acuminatis bidentatis margine ciliato-serratis horizontalibus, squamis ovatis acutis. *Schkuhr.* t. C. f. 14. (in pratis humidis versus Butirki. Jun.)

13. *C. remota*: spica androgyna composita, spiculis alternis remotis inferne masculis, bracteis foliaceis longissimis suffultis, fructibus ovatis acuminatis bifidis compressiusculis. *Schkuhr.* t. E. f. 23. (in sylvis, nemoribusque subhumidis. Mai. Jun.)

14. *C. elongata*: [*multiformis*] spica androgyna composita, spiculis subduodenis alternis approximatis cylindraceis inferne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovato-acuminatis emarginatis nervosis patulis squama ovata obtusa longioribus *Schkuhr.* t. E. f. 25. (in paludosis, nemoribus humidis. Jun.)

\*\*\* *Spicis androgynis paniculatis.*

15. *C. paniculata*: spicis androgynis paniculatis superne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis superne marginatis bidentatis margine ciliato-serratis, culmo triquetro. *Schkuhr.* t. D. f. 20. (in paludibus, nemoribus udis. Mai. Jul.)

- \*\*\*\*\* *Spicis sexu distinctis: mascula solitaria, femineis sessilibus seu incluse pedunculatis.*
16. *C. pilulifera*: [montana] spica mascula solitaria, femineis subternis approximatis elliptico-subrotundis sessilibus, stigmatibus ternis, fructibus subrotundis breve rostratis pubescentibus squama oblonga acuta brevioribus, culmo decumbente. *Schkuhr. t. I. f. 39.* (in nemoribus subudis. Mai.)
17. *C. collina*: [montana] spica mascula solitaria, femineis subgeminis approximatis ellipticis sessilibus, fructibus oblongis brevissime rostratis pubescentibus, foliis radicalibus annotinis culmo longioribus. *Schkuhr. t. F. f. 29.* (in collibus apricis et montosis. Mai. Jun.)
18. *C. ciliata*: [ericetorum] spica mascula solitaria, femineis subgeminis approximatis oblongis sessilibus, fructibus subrotundo-obovatis pubescentibus squama oblonga obtusa majoribus. *Schkuhr. t. I. f. 42.* (in ericetis, collibusque arenosis. Mai.)
19. *C. digitata*: spica mascula solitaria sessili, femineis subternis linearibus remotiusculis, stigmatibus ternis, fructibus obovatis rostratis triquetris pubescentibus squamam obovatam mucronatam aequantibus, bracteis vaginatis obliquis mucronatis margine membranaceis. *Schkuhr. t. H. f. 38.* (in collibus herbidis nemorosis, sylvisque umbrosis. Jul. Aug.)
20. *C. flava*: spica mascula solitaria, femineis subternis subapproximatis ellipticis incluse pe-

dunculatis, stigmatibus ternis, fructibus ovatis reflexis rostratis, rostro curvato bidentato, squama ovato-lanceolata longioribus. *Schkuhr. t. H. f. 36.* (in pratis pascuisque humidis. Mai.)  
 \*\*\*\*\* *Spica mascula solitaria. femineis plus minusve pedunculatis.*

21. *C. pilosa*: spica mascula solitaria, femineis subternis distantibus, binis inferioribus remotis, stigmatibus ternis, fructibus ovatis rostratis, ore membranaceo obliquo emarginato, squama ovata majoribus, foliis ciliatis. *Schkuhr. t. M. f. 49.* (in sylvis montanis. Mai. Jun.)

22. *C. panicea*: spica mascula solitaria, femineis subbinis remotiusculis, suprema subincluse pedunculata, infima longe pedunculata, stigmatibus ternis, fructibus ovatis obtusis squama ovata majoribus. *Schkuhr. t. L l. f. 100.* (in pratis udis, nemoribusque humentibus. Jun. Henning.)

23. *C. sylvatica*: [*Drymeja*] spica mascula solitaria, femineis quaternis remotis filiformibus pedunculatis cernuis, stigmatibus ternis, fructibus ovati-rostratis bifidis. squamam ovatam membranaceam mucronatam subaequantibus. *Schkuhr. t. L l. f. 101.* (in nemoribus, sylvisque humentibus. Jun. Jul.)

24. *C. Pseudo-Cyperus*: spica mascula solitaria, femineis quaternis geminatis pedunculatis pendulis cylindricis, stigmatibus ternis, fructibus ovato-lanceolatis bicuspidatis reflexis squamam



setaceam aequantibus. *Schkuhr.* t. M m. f. 102. (in fossis, praesertim in tribus montibus et montibus passerinis. Mai.)

Var: spica androgyna. *Henning.*)

25. *C. pallescens*: spica mascula solitaria, femineis subternis pedunculatis cernuis ellipticis, stigmatibus ternis, fructibus ovato-oblongis obtusis squamam oblongam cuspidato-mucronatam aequantibus, foliis pubescentibus. *Schkuhr.* t. K k. f. 99. (in pratis, pascuis, sylvisque paludosis. Mai. Jun.)

26. *C. limosa*: [*elegans*] spica mascula solitaria, femineis binis ovatis pedunculatis pendulis, fructibus ellipticis compresso-triquetris brevissime rostellatis, ore integro. *Schkuhr.* t. X. f. 78. (in pratis udis, paludibusque turfosis. Mai.)

27. *C. caespitosa*: spica mascula subsolitaria, femineis cylindraceis obtusis subternis distantibus, infima brevissime exserte pedunculata, stigmatibus binis, fructibus ovatis obtusis ore pertusis squama oblonga obtusa majoribus, foliis patulis. *Schkuhr.* t. A a. et B b. f. 85. in pratis paludosis turfosis. Mai. Jun.)

\*\*\*\*\* *Spicis masculis pluribus.*

28. *C. filiformis*: spicis masculis geminis, femineis geminis ovato-oblongis sessilibus distantibus, stigmatibus ternis, fructibus ellipticis bifurcatis lanatis squamam oblongo-lanceolatam subaristatam aequantibus. *Schkuhr.* t. K. f. 45. (in paludibus nemorum profundis. Mai. Jun.)



29. *C. acuta*: [*gracilis*] spicis masculis binis ternisve, femineis subquaternis subpedunculatis subnutantibus cylindraceis remotis, stigmatibus binis, fructibus oblongis brevissime rostellatis, ore integro pertuso, squamam oblongam acutam subaequantibus. *Schkuhr* t. E e. f. 92. (in paludibus, pratis udis, inundatis, ad fossas. Mai. Jun.)

b. *Carex nigra*: spicis masculis nigris, femineis erectis. *Schkuhr*. t. F f. 92. (cum praecedente. Jun)

30. *C. paludosa*: [*rufa*] spicis masculis binis, femineis ternis erectis cylindraceis attenuatis, inferioribus pedunculatis, stigmatibus ternis, fructibus ovatis nervosis bidentatis squama lanceolata aristata latioribus eamque aequantibus. *Schkuhr*. t. O o. f. 103. (in fossis et paludibus. Mai)

31. *C. vesicaria*: [*inflata*] spicis masculis subquaternis, femineis binis erectis pedunculatis cylindraceis, stigmatibus ternis, fructibus oblongis inflatis rostratis bicuspidatis squama lanceolata majoribus, culmo acute triquetro. *Schkuhr*. t. S s. f. 106. (in paludibus, udisque sylvaticis. Mai. Jun.)

32. *C. ampullacea*: [*bifurca*] spicis masculis tribus, femineis binis cylindraceis breve pedunculatis erectis, fructibus subglobosis inflatis rostratis bifurcatis, culmo obtuse triquetro. *Schkuhr*. t. T t. f. 107. (in paludosis. Mai. Jun.)

33. *C. hirta*: spicis masculis binis, femineis tribus oblongis remotis, inferioribus breve pedunculatis, stigmatibus ternis, fructibus oblongis acuminatis bicuspidatis squama oblonga aristata majoribus, vaginis foliisque hirtis. *Schkuhr. t. Uu. f. 108.* (in pratis et versuris sabulosis udisque. Mai.)

## T E T R A N D R I A.

319. *ALNUS. Mas*: Amentum receptaculis cuneiformibus truncatis trifloris compositum. Calyx squama. Corolla quadripartita.

*Femina*: Amentum. Calyx squamae biflorae. Corolla nulla. Semina compressa ovata nuda.

1. *A. glutinosa*: [*Betula Alnus*] foliis subrotundocuneatis obtusis subretusis glutinosis, axillis venarum subtus villosis. *Kern. Würt. II. t. 14.* (in pratis udis, ad fossas. Apr. Mai.)

320. *URTICA. Mas*: Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Nectarium centrale cyathiforme.

*Femina*: Calyx hivalvis. Corolla nulla. Semen unicum nitidum.

1. *U. urens*: foliis oppositis ellipticis subquinque-nerviis argute serratis, spicis glomeratis geminatis. *Fl. dan. t. 739.* (in cultis ruderatis, ad sepes. Jun. Aug.)

2. *U. dioica*: foliis oppositis cordatis ovato-lanceolatis grosse serratis, floribus dioicis, spicis paniculatis glomeratis geminatis petiolo longio-

ribus. *Fl. dan.* t. 746. (in ruderatis, sepibus, hortis. Jun. Aug.)

## P E N T A N D R I A.

321. *XANTHIUM*. *Mas*: Calyx communis imbricatus. Corollae monopetalae quinquefidae infundibuliformes. Receptaculum paleaceum.

*Femina*: Calyx involucrium diphyllum uniflorum. Corolla nulla. Drupa sicca muricata bifida. (Nux bilocularis.

1. *X. strumarium*: caule inermi, foliis cordatis trinervatis lobato-serratis. *Fl. dan.* t. 970. (in ruderatis, arvis, ad vias. Jul.)

322. *AMARANTHUS*. *Mas*: Calyx tri- seu pentaphyllus. Corolla nulla. Stamina terna quinave.

*Femina*: Calyx maris. Corolla nulla. Styli terni. Capsula unilocularis circumscissa. Semen unicum.

1. *A. Blitum*: glomerulis triandris subspicatis, floribus triphyllis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Pluken. phyt.* t. 212. f. 2. (in cultis, hortis. Jul. Aug.)

## P O L Y A N D R I A.

323. *CERATOPHYLLUM*. *Mas*: Calyx multipartitus. Corolla nulla. Stamina sena, dena, usque vicena, brevissima. Antherae tricuspidatae.

*Femina*: Calyx hexaphyllus imbricatus. Corolla nulla. Pistillum singulum. Stylus filiformis. Nux monosperma.

1. *C. demersum*: foliis dichotomo-bigeminis, fructibus trispinosis. *Engl. bot.* t. 947. (in aquis stagnantibus, lacubus, fossis. Jun. Jul.)

324. MYRIOPHYLLUM. *Mas*: Calyx quadrifidus bracteatus. Corolla tetrapetala, caduca. Stamina quaterna, sena, octonave,

*Femina*: Calyx et Corolla maris. Pistilla quaterna. Stylus nullus. Semina quaterna corticata.

1. *M. spicatum*: foliis omnibus pinnatis capillaceis, spica terminali verticillata nuda. *Fl. dan.* t. 681. (in fossis et stagnis. Jul. Aug.)

2. *M. verticillatum*: foliis pinnatis capillaceis, summis pectinato-pinnatifidis, floribus axillaribus verticillatis. *Fl. dan.* t. 1046. (in aquis quietis, in montibus passerinis et tribus montibus. Jul. Aug.)

325. SAGITTARIA. *Mas*: Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Filamenta fere vicena quaterna.

*Femina*: Calyx et Corolla maris. Pistilla multa. Semina plurima nuda.

1. *S. sagittifolia*: foliis lanceolatis acuminatis sagittatis, lobis lanceolatis rectis, scapo simplici petiolisque sulcato-angulatis. *Fl. dan.* t. 172. (in fluviis, lacubus, piscinis, fossis. Jun. Jul.)

*b. Sagittaria natans*: foliis longissimis natantibus. (in aquis profundis.)

326. POTERIUM. *Mas*: Calyx tetraphyllus. Corolla quadripartita. Stamina tricena usque quadragena

*Femina*: Calyx et Corolla maris. Pistilla bina. Bacca e tubo corollae indurato.

1. *P. Sanguisorba*: inerme, caulibus subangulo-

sis. *Engl. bot.* t. 806. (in pratis montosis asperis calcareis. Jun.)

327. *QUERCUS. Mas*: Calyx subquinquefidus. Corolla nulla. Stamina quina ad dena usque.

*Femina*: Calyx monophyllus integerrimus scaber. Corolla nulla. Styli bini usque quini. Nux coriacea calyce persistente basi cincta.

1. *Q. Robur*: foliis oblongis petiolatis glabris sinuatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis sessilibus. *Engl. bot.* t. 1342. (in nemoribus et sylvis. Mai.)

2. *Q. pedunculatus*: foliis oblongis subsessilibus glabris sinuatis, lobis rotundatis, fructibus oblongis pedunculatis. *Fl. dan.* t. 1180. (cum priore. Mai.)

328. *BETULA. Mas*: Amentum imbricatum squamis peltatis trifloris. Calyx squama. Corolla nulla. Stamina dena usque duodena.

*Femina*: Amentum imbricatum. Calyx squamam biflora. Corolla nulla. Semen singulum alatum.

1. *B. alba*: foliis ovato-deltoides acuminatis duplicato-serratis glabris. *Blackw.* t. 240. (in nemoribus, sylvis, propriisque betuletis Mai.)

b. *Betula pendula*: foliis deltoides acuminatis inciso-duplicato-serratis glabris, strobilorum squamis subtrilobis. *Schkuhr.* III. t. 283. (cum priore. Mai.)

2. *B. nana*: foliis orbiculatis crenatis glabris subtus reticulato-venosis. *Fl. dan.* t. 91. (in paludibus montosis sylvaticis, ad urbem Klin. Mai. Stephan.)

329. *CORYLUS. Mas*: Amentum imbricatum. Calyx squama. Corolla nulla. Stamina octona.

*Femina*: Calyx bipartitus lacerus. Corolla nulla. Styli bini. Nux ovata calyce persistente cincta.

1. *C. Avellana*: stipulis oblongis obtusis, calycibus fructus campanulatis apice patulis lacero-dentatis, foliis subrotundis cordatis acuminatis. *Engl. bot. t. 723.* (in nemoribus, sepibus, hortis. April Mai.)

*b. Corylus maxima*: calycibus patentissimis inciso-dentatis, nuce depressa ovata. (in hortis. Mai.)

## M O N A D E L P H I A.

330. *PINUS. Mas*: Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Stamina plurima. Antherae nudaе.

*Femina*: Calyces strobili: squama biflora. Corolla nulla. Pistillum singulum. Nux ala membranacea excepta.

1. *P. sylvestris*: foliis geminis rigidis, strobilibus ovato-conicis longitudine foliorum subgeminis basi rotundatis. *Lamb. pin. t. 1.* (in sylvis, pinetisque propriis. Mai.)
2. *P. Abies*: foliis solitariis tetragonis, strobilibus cylindraceis, squamis rhombeis complanatis margine repandis erosis. *Lamb. pin. t. 25.* (in sylvis et hortis. Mai.)

## D I O E C I A.

### D I A N D R I A.

331. *SALIX. Mas*: Amentum cylindraceum. Calyx squama. Corolla nulla. Glandula baseos nectarifera.



*Femina*: Amentum, Calyx, Corolla inaris. Stylus bifidus. Capsula unilocularis, bivalvis. Semina papposa.

\* *Foliis serratis, glabriusculis.*

1. *S. hermaphrodita*: foliis serratis glabris, floribus hermaphroditis diandris. (habitat circa Gorenki. Mai. *Londes.*)
2. *S. triandra*: triandra arborea, foliis oblongo-lanceolatis subtus glaucescentibus serratis serraturis inflexo-glandulosis, stipulis glabris ovatis crenatis deciduis, amentorum squamis villosis, capsulis glaberrimis pedicellatis. *Hoffmann. salic. t. 9. t. 10. et t. 23. f. 2.* (in pratis, salicetis, ad fossarum ripas. Mai.)
3. *S. amygdalina*: triandra fruticosa, foliis ovato-acuminatis basi inaequalibus serratis subtus glaucescentibus, stipulis semicordatis crenatis maximis, amenti squamis glabris, capsulis pedicellatis glaberrimis. *Linn. lappon. t. 8. f. 8.* (in palustribus, ad ripas. Mai.)
4. *S. pentandra*: pentandra amborescens, foliis ovalibus basi attenuatis crenulatis glabris subtus glaucis, stipulis subnullis, amenti squamis rotundatis basi villosis, capsulis glabris pedicellatis. *Fl. dan. t. 943.* (in paludosis montosis sylvaticis. Mai.)
5. *S. vitellina*: triandra arborescens, foliis serratis ovato-lanceolatis acutis supra glabris, serraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Hoffm. salic. t. 11. t. 12. et t. 24. f. 1.* (in humidis, salicetis, ad vias. Mai.)

6. *S. fragilis*: [*decipiens*] diandra arborescens, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis serratis, serraturis inflexis glandulosis, petiolis dentato-glandulosis, stipulis rotundatis obsolete dentatis deciduis, nectario gemino. *Hoffm. salic. t. 31* (in pratis, ad ripas Mai.)
  7. *S. monandra*: [*Helix*] monandra arborescens, foliis lanceolatis utrinque attenuatis serrulatis glabris subtus glaucescentibus, stipulis nullis, stylo-elongato filiformi, stigmatibus linearibus, capsulis lanatis. *Hoffm. salic. t. 1. f. 1. 3. et t. 5. f. 1. et t. 23. f. 1.* (in aquosis, salicetis. Mai.)
  8. *S. myrsinites*: frutescens, foliis ellipticis ovatis undique serrulatis utrinque glabris nitidis concoloribus, ramulis hirtis, amentis praecocibus, capsulis lanceolatis sericeo-pubescentibus. *Fl. dan. t. 1054.* (in fruticetis humidis montosis. Mai.)
- \*\* *Foliis serratis, pubescentibus.*
9. *S. incubacea*: [*angustifolia*] frutescens, foliis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis convexis supra glabris subtus incanis subsericeis, germinibus lanceolatis sericeis, stigmatibus subsessilibus. (in locis humidis arenosis. Mai.)
  10. *S. rosmarinifolia*: frutescens, foliis linearilanceolatis subintegerrimis planis, supra pubescentibus, subtus sericeis, germinibus lanceolatis villosis, stylis elongatis. (in arenosis et turfosis udis, in Gorenki. Mai. *Londes.*)
  11. *S. aurita*: diandra fruticosa, foliis obovatis adunce mucronatulis utrinque villosis reticula-

to-venosis, stipulis polymorphis, capsulis longius pedicellatis subulatis villosis. *Hoffm. salic.* t. 5. f. 3. et t. 22. f. 1. (in sepibus humidiusculis, nemoribusque udis. Mai.)

12. *S. caprea*: diandra arborea, foliis ovatis acuminatis undulatis repando-serratis, supra glabriusculis, subtus dense tomentosis venosis, stipulis sublunatis, capsulis pedicellatis ovatis birostratis villosis. *Hoffm. salic.* t. 3. et t. 21. f. a. b. c. (in sepibus nemoribusque siccis. Mai.)

13. *S. acuminata*: diandra arborescens, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis repandis apice dentatis, supra glabris, subtus tomentosis venosis, stipulis reniformibus dentatis, capsulis pedicellatis subulatis pubescentibus. *Hoffm. salic.* t. 6. et t. 22 f. 2. (in nemoribus locisque humidiusculis Mai.)

14. *S. viminalis*: diandra fruticosa, foliis lanceolato-linearibus longissime acuminatis integerrimis subtus sericeis, ramis virgatis, stylo elongato. *Hoffm. salic.* t. 2. t. 5. et t. 21. f. e. f. g. (ad fluviorum ripas. Mai.)

15. *S. alba*: triandra arborea, foliis lanceolatis acuminatis serratis utrinque sericis, serraturis infimis glandulosis, capsulis subsessilibus glabris birostratis. *Hoffm. salic.* t. 7. t. 8. et t. 24. f. 3. (ad pagos et urbes, in pratis et ad ripas fluviorum. Mai.)

332. FRAXINUS. *Hermaphroditi*: Calyx nullus seu quadripartitus. Corolla tetrapetala vel nulla. Stamina bina. Pistillum unicum. Samara mono-

sperma ala lanceolata terminata.

*Feminei*: Calyx quadripartitus sive nullus. Corolla tetrapetala vel nulla. Pistillum singulum. Samara ut supra.

1. *F. excelsior*: foliolis subpetiolatis lanceolatis acuminatis serratis glabris basi cuneatis, floribus nudis. *Fl dan.* t. 969. (in sylvis, sepibus, ad pagos. Mai.)

b. *Fraxinus simplicifolia*: foliis simplicibus serratis ternatisque.

c. *Fraxinus pendula*: ramis pendulis. (cum seteris. Mai.)

## T E T R A N D R I A.

335. VISCUM. *Mas*: Calyx quadripartitus. Corolla nulla. Filamenta nulla. Antherae calyci adnatae.

*Femina*: Stylus nullus. Bacca infera monosperma. Semen cordatum.

1. *V. album*: foliis lanceolatis obtusis enerviis, caule dichotomo, floribus quinis terminalibus glomeratis sessilibus. *Schkuhr.* t. 320. (in vivario Imperiali, parasiticum in quercubus. Mai.)

## P E N T A N D R I A.

334. CANNABIS. *Mas*: Calyx quinquepartitus, Corolla nulla.

*Femina*: Calyx monophyllus integer, latere hians. Corolla nulla. Styli bini. Nux bivalvis, intra calycem clausum.

1. *C. sativa*: foliis digitatis, caule erecto. *Lam. ill.* t. 814. (in cultis. Jun. Jul.)

335. HUMULUS. *Mas*: Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.

*Femina*: Calyx monophyllus, oblique patens integer. Corolla nulla. Styli bini. Semen singulum inter calycem foliatum.

1. *H. Lupulus*: foliis cordatis lobatis integrisque grosse serratis, caule volubili. *Fl. dan.* t. 1239. (in nemorosis, dumetis, sepibus. Jul. Aug.)

## O C T A N D R I A.

336. POPULUS. *Mas*: Amentum cylindraceum. Calyx squama lacera. Corolla turbinata obliqua integra.

*Femina*: Amentum, Calyx, Corolla maris. Stigma quadrifidum. Capsula bilocularis. Semina multa comosa.

1. *P. tremula*: foliis orbiculatis dentatis utrinque glabris, petiolis compressis, ramulis hirtis, [stigmatate purpurascente.] *Kerner.* t. 27. (in sylvis, arenosis, ad pagos. Mai.)
2. *P. nigra*: foliis deltoideis utrinque glabris acuminatis serratis, diametro longitudinali longiore, [stigmatate nigrescente.] *Kerner.* t. 28. (in pratis, humidis, ad ripas. Mai.)

## E N N E A N D R I A.

337. MERCURIALIS. *Mas*: Calyx tripartitus. Corolla nulla. Stamina novena vel duodena. Antherae globosae didymae.

*Femina*: Calyx et Corolla maris. Styli bini. Capsula dicocca bilocularis, loculis monospermis.

1. *M. perennis*: caule simplicissimo, foliis scabris, radice serpente. *Fl. dan.* t. 400. (in nemo-



ribus montensis, e. g. in montibus passerinis, Kunzowa. Mai.)

338. *HYDROCHARIS*. *Mas*: Spatha diphylla. Calyx trifidus. Corolla tripetala. Filamenta terna interiora styliфера.

*Femina*: Calyx trifidus. Corolla tripetala. Styli seni. Capsula sexlocularis infera polysperma.

1. *II. Morsus ranae*: foliis reniformibus integris petiolatis. *Fl. dan.* t. 878 (in fluminibus, stagnis, fossisque limosis. Jul)

### D O D E C A N D R I A.

339. *STRATIOTES*. *Mas*: Spatha diphylla. Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Nectaria vicena antheriformia. Stamina undena, duodena vel terna dena.

*Femina*: Spatha, Calyx, Corolla, Nectariumque maris. Styli seni bipartiti. Bacca sexlocularis polysperma.

1. . . *Aloides*: foliis ensiformi-triangularibus ciliato-aculeatis carinatis. *Fl. dan.* t. 337. (in aquis pigris, praesertim in tribus montibus. Jun. Jul.)

### M O N A D E L P H I A.

340. *JUNIPERUS*. *Mas*: Amentum ovatum. Calyx squama. Corolla nulla. Stamina terna.

*Femina*: Calyx tripartitus. Petala terna. Styli terni. Bacca trisperma, tribus tuberculis calycis inaequalis.

1. *J. communis*: foliis ternis patentibus mucronato-spinosis bacca longioribus. *Fl. dan.* t. 1119. (in sylvaticis sterilioribus arenosis, propriisque juniperetis. Mai.)



PARS SECUNDA.

PLANTAE CRYPTOGRAMAE.

---



## GONOPTERIDES.

1. *EQUISETUM*. Receptacula peltata plana polygona spicata, subtus indusiis quaternis usque septenis corniculatis clausis, tandem longitudinaliter rumpentibus et fructificationes occultantibus obsita. Stamina quaterna. Germen ovatum. Stylus nullus. Semen unicum.

1. *E. arvense*: caulibus sterilibus simpliciter ramosis, ramis scabriusculis tetragonis, fructificantibus simplicibus, vaginis cylindraceis inciso-dentatis, dentibus acutis. *Bolton*. t. 34. (in agris, arvis et campis sterilioribus. Mai. Jun.)

2. *E. fluviatile*: caulibus sterilibus simpliciter ramosis, ramis scabriusculis octogonis, fructificantibus simplicibus, vaginis infundibuliformibus lacero-dentatis, dentibus aristatis. (in fluviorum fossarumque ripis humidis. Jun.)

3. *E. sylvaticum*: caulibus sterilibus fructificantibusque duplicato-ramosis, ramis scabriusculis deflexis tetragonis, ramulis subtriquetris. *Fl. dan.* t. 1182. (in sylvis, nemoribusque umbrosis. Mai.)

b. *Equisetum capillare*: ramis capillaceis. (cum antecedente, Mai.)

4. *E. limosum*: caulibus subramosis, ramis subduodenis pentagonis laevibus glabris, spica

terminali. *Fl. dan.* t. 1184. (in fossis ripisque lacuum et fluviorum, in inundatis. Jun.)

5. *E. palustre*: caulibus simpliciter ramosis glabris sulcatis, ramis pentagonis apice spiciferis. *Fl. dan.* t. 1183. (in pratis paludoso-spongiosis. Jun.)

6. *E. hyemale*: caulibus simplicibus erectis scaberrimis apice spiciferis, vaginis discoloribus basi apiceque sphacelatis, dentibus aristatis omnino caducis. *Engl. bot.* 915. (in paludibus. Aug. Oct.)

## STACHYOPTERIDES.

2. *LYCOPodium*. Capsulae reniformes uniloculares bivalves polyspermae. Semina minutissima pulveriformia.

1. *L. clavatum*: caule repente, ramis adscendentibus, foliis sparsis enerviis incurvato-setigeris, spicis geminatis cylindricis pedunculatis, squamis ovatis acuminatis eroso-denticulatis. (in sylvaticis turfosis. Jul. Aug.)

2. *L. complanatum*: caule erecto, ramis alternis dichotomis, foliis bifariis connatis apice patentibus, superficialibus solitariis adpressis, pedunculis quadrifidis tetrastachyis, spicis teretibus cylindricis. *Fl. dan.* t. 78. (in pratis sylvaticis montosis. Jul. Aug.)

3. *L. annotinum*: caule repente, ramis adscendentibus basi bis bipartitis, ramulis simplicibus, foliis quinquefariis lineari-lanceolatis mucronatis apice serrulatis patentibus, ad incre-

menta annua contractis, spicis solitariis sessilibus terminalibus. *Fl. dan.* t. 27. (in nemoribus, sylvisque umbrosis uliginosis. Aug. Sept.)

4. *L. Selago*: foliis sparsis octofariis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis imbricato-patulis rigidis, caule dichotomo erecto, ramis fastigiatis. *Fl. dan.* t. 104. (in nemoribus sabulosis humidis. Jul.)

## SCHISMATOPTERIDES.

3. *BOTRYCHIUM*. Capsulae subglobosae, rachi racemi compositi adnatae, discretae nudae uniloculares, valvulis binis postice connexis transverse dehiscentes.

1. *B. Lunaria*: [*Osmunda Lunaria*] scapo superne unifrondoso, fronde pinnata, pinnis lunatis integerrimis. *Fl. dan.* t. 18. (in collibus pascuisque apricis ac siccis, ad sylvarum margines. Mai. Jun.)

2. *B. rutaceum*: scapo superne unifrondoso, fronde bipinnatifida, laciniis emarginatis bi- seu tridentatis obtusis. *Fl. dan.* t. 18. f. 3. (cum antecedente, in uliginosis prope Butirki, nec non ad aquaeductum versus pagum Alexejewsk. Mai. Jun.)

4. *OSMUNDA*. Capsulae subglobosae pedicellatae striatae semibivalves paniculatae: Indusium nullum.

1. *O. regalis*: frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis subintegerrimis basi inferiore subauri-

culatis, inferioribus oppositis, panicula bipinnata fructificante in apice frondis. *Fl. dan.* t. 217. (in paludibus nemorosis. Mai. Jun.)

## F I L I C E S.

5. *POLYPODIUM*. Sori subrotundi sparsi. Indusia nulla.

1. *P. vulgare*: frondibus profunde pinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis obtusis crenulatis approximatis, superioribus sensim minoribus, soris solitariis, stipite paleaceo. *Fl. dan.* t. 1060 (in sylvis umbrosis ad arborum truncos. Mai.)
2. *P. Phegopteris*: frondibus bipinnatifidis, pinnis duabus infimis deflexis, laciniis lineari-lanceolatis obtusis integerrimis ciliatis, infimis adnato-decurrentibus cum oppositis rhombum fere formantibus, venis hirtis, soris solitariis marginalibus. *Bolton.* t. 20. f. a, b. (in nemoribus umbrosis. Aug.)
3. *P. Dryopteris*: frondibus tennatis bipinnatis patulo-deflexis, laciniis obtusis subintegerrimis, soris marginalibus, radice filiformi. *Engl. bot.* t. 616. (in nemoribus montosis. Aug.)

6. *ASPIDIUM*. [*Polypodium* olim] Sori subrotundi sparsi. Indusium umbilicatum.

1. *A. Oreopteris*: frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis glabris subtus resinoso-glandulosis pinnatifidis, laciniis lanceolatis obtusis integerrimis, infimis sublongioribus, soris marginali-



bus. *Fl. dan.* t. 1121. (in montibus passerinis. Jun. Jul.)

2. *A. cristatum*: frondibus pinnatis, pinnis subcordato-oblongis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis dentato-serratis, stipite paleaceo. *Bolton.* t. 23. (in sylvis, nemoribusque humidis. Jun. Jul.)

3. *A. aculeatum*: frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis subfalcatis acutis mucronato-serratis, basi superiore truncatis, inferiore abbreviato-cuneatis, superioribus fructificantibus, stipite rachique paleaceis. *Bolton.* t. 26. (in montibus passerinis, Kunzowa. Jul.)

4. *A. Filix mas*: frondibus bipinnatis, pinnulis oblongis obtusis serratis, serraturis muticis, soris costae mediae approximatis, stipite rachibusque paleaceis. *Bolton.* t. 24. (in nemoribus saxosis umbrosis. Mai.)

5. *A. spinulosum*: frondibus bipinnatis, pinnulis oblongis decurrentibus confluentibus inciso-dentatis, laciniis mucronato-serratis, stipite paleaceo, indusiis glandulosis, *Fl. dan.* t. 707. (in nemoribus. Mai.)

7. *ATHYRIUM*. [sub *Polypodio*] Sori subrotundi sparsi. Indusium laterale, hinc dehiscens.

1. *A. fragile*: frondibus bipinnatis, pinnulis oblongis obtusis inciso-serratis, serraturis obtusis denticulatis, rachi alata. *Bolton.* t. 27. (in fissuris viarum cavarum sylvarum. Mai. Jun.)

2. *A. Filix femina*: frondibus bipinnatis, pinnulis oblongo-lanceolatis inciso-serratis, serra-

turis bi- seu tridentatis acutiusculis, soris oblongis rectis. *Bolton.* t. 25. (in nemoribus et sylvis umbrosis. Jun. Sept.)

3. *A. molle*: frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis pinnatifidis, laciniis linearibus apice conniventi-serratis. *Ehrh. crypt.* t. 91. (in nemoribus ad arborum radices. Mai. Sept.)

8. **STRUTHIOPTERIS.** Capsulae partem frondis inferiorem dense tegentes. Indusia squamiformia marginalia interius dehiscentia.

1. *S. germanica*: [*Osmunda Struthiopteris*] frondibus sterilibus bipinnatifidis, laciniis integerimis acutiusculis aequalibus. *Fl. dan.* t. 169. (in nemoribus umbrosis, ad Gorenki et Archangelsk. Jul. Aug.)

9. **ASPLENIUM.** Sori lineares transversales sparsi. Indusia ē venis lateralibus orta costam versus dehiscentia.

1. *A. Ruta muraria*: frondibus alternatim subdecompositis, pinnulis cuneiformibus apice incis. *Fl. dan.* t. 190. (in muris antiquis. Jun. Jul.)

10. **PTERIS.** Sori continui lineares marginales. Indusium e margine frondis inflexum interius dehiscentia.

1. *P. aquilina*: frondibus tripartitis bipinnatis, foliolis inferioribus pinnatifidis, summis indivisis. *Schkuhr.* t. 95. (in pinetis et sylvis acerosis. Aug. Sept.)

## CALYPTRATAE.

### 11. PHASCUM Peristomium nullum.

1. *P. cuspidatum*: subacaule, foliis ovatis cuspidatis patulis, intimis conniventibus. *Dillen. t. 32. f. 11.* (in pomariis, hortis, cultis, fossis exsiccatis. Mai.)
2. *P. muticum*: acaule, foliis ovato-concavis muticis conniventibus. *Dillen. t. 32. f. 12* (cum praecedente, et in muris argillosis Mai. Sept.)
3. *P. subulatum*: caulescens, foliis lineari-subulatis patulis, perichaetialibus longissimis. *Fl. dan. t. 249.* (in arenosis sylvaticis, ad aggeres et vias. Mai. Jun.)

### 12. SPHAGNUM. Calyptra medio transversim rupta.

1. *S. latifolium*: [*palustre*] foliis ovatis concavis obtusis, ramis apice turgidis. *Dillen. t. 32. f. 1.* (in paludibus turfosis, propriisque sphagnetis. Sept. Oct.)
2. *S. capillifolium*: foliis ovato-lanceolatis planiusculis acuminatis, ramis apice capillaceis. *Dillen. t. 32. f. 2.* (cum antecedente, in rivulis. Sept. Oct.)
3. *S. cuspidatum*: foliis subulatis patentiusculis planis undulato-acuminatis. *Dillen. t. 32. f. 2. B.* (in aquosis fluitans et pedalem longitudinem superans. Jul. Aug.)

### 13. GYMNSTOMUM. Calyptra integra secedens. Peristomium nudum.

1. *G. truncatum*: [*Bryum truncatulum*] foliis ovatis acuminatis planis integerrimis, capsula ob-

ovata truncata. *Dillen.* t. 45. f. 7. (in hortis, cultis, muris, ad fossas, viasque. Mai.)

2. *G. ovatum*: [*Pottia cavifolia*] foliis ovatis obtusis integerrimis concavis aristatis, capsula ovata. *Hedw. musc.* t. 6. (in muris, agrisque limosis. Mai.)

14. **TETRAPHIS.** Peristomium dentibus quaternis liberis.

1. *T. pellucida*: [*Mnium pellucidum*] trunco erecto, foliis ovato-lanceolatis integris, capsula cylindrica. *Dillen.* t. 31. f. 2. (in sylvaticis udīs et paludosis, ad arborum radices. Aug. Sept.)

15. **SPLACHNUM.** Peristomium dentibus octonis geminis. Capsula cum apophysi.

1. *S. ampullaceum*: apophysi ampullaeformi capsulam excedente, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, superioribus denticulatis. *Dillen.* t. 44. f. 3. (in paludibus turfosis, raro. Aug.)

16. **ENGALYPTA.** Peristomium dentibus sedecim simplicibus integris. Seta terminalis. Calyptra campaniformis maxima.

1. *E. vulgaris*: [*Bryum exstinctorium*] caule simplici, foliis spathulato-lanceolatis, calyptra basi integra. *Dillen.* t. 45. f. 8. (in locis arenosis, collibus, muris. Mai.)

17. **LEERSIA.** Peristomium dentibus senis denis angustis erectilibus integris.

1. *L. cirrhata*: [*Mnium cirrhatum*] trunco erecto ramoso, foliis linearibus siccitate tortilibus carinatis, capsula ovata. *Fl. dan.* t. 538. f. 4. (in colliculis arenosis. Mai. Jun.)

2. *L. lanceolata*: [*Bryum lanceolatum*] trunco erecto, foliis lanceolato - concavis acuminatis, capsula ovata. *Hedw. musc.* II. t. 23. (ad margines fossarum in muris argillaceis. Sept.)

18. GRIMMIA. Peristomium dentibus senis denis simplicibus integris. Seta terminalis. Calyptra exilis.

1. *G. apocarpa*: [*Bryum apocarpum*] trunco ramoso diffuso, foliis ovatis acuminatis: perichaetialibus piliferis, capsula ovata sessili. *Fl. dan.* t. 480. (super arborum truncos. Mai. Sept.)

19. WEISSIA. Peristomium dentibus senis denis latiusculis reflexilibus integris.

1. *W. viridula*: [*Grimmia crista*] subacaulis, foliis subulatis siccitate tortilibus, capsulae ellipticae operculo subulato. *Hedw. musc.* III. t. 5. (ad vias cavae, in locis submontosis. Mai.)

2. *W. Dicksonii*: [*Bryum Dicksonii*] trunco ramoso, foliis linearibus carinatis siccitate subcrispis, capsulis erectis ovato - cylindraccis. *Dicks.* III. t. 7. et IV. t. 7. (in arborum truncis emortuis. Oct.)

20. FISSIDENS. Peristomium dentibus senis denis brevioribus inflexis.

1. *F. bryoides*: [*osmundoides*] trunco simplici ascendente, foliis distichis oblongis obtusiusculis, seta terminali. *Hedw. posthum.* t. 40. (in viis cavis, ad aggeres fossarum, in sylvis umbrosis. Oct.)

2. *F. taxifolius*: [*Hypnum taxifolium*] trunco simplici, foliis distichis oblongo - lanceolatis, seta



subradicali. *Dillen.* t. 34. f. 2. (in sylvaticis et nemorosis umbrosis. Sept.)

3. *F. pulvinatus*: [*Dicranum pulvinatum*] foliis obtusis oblongis piliferis, seta arcuata. *Dillen.* t. 50. f. 65. (in muris et saxis. Mai. Oct.)

21. *DICRANUM*. [*Bryum olim*] Peristomium dentibus senis denis simplicibus flexis solidis fissis.

1. *D. purpureum*: trunco subdichotomo, foliis lanceolato - acuminatis erecto - patulis carinatis, capsula cylindrica. *Dillen.* t. 49. f. 52. (in sterilibus, ericetis montosis, muris. Mai.)

2. *D. glaucum*: trunco erecto ramoso, foliis imbricatis ovato - lanceolatis enerviis glaucis, operculo curvirostro. *Dillen.* t. 46. f. 20. (in sylvaticis et ericetis humidis. Mai.)

3. *D. scoparium*: trunco ramoso, foliis lanceolato - subulatis secundis, seta solitaria, operculo obliquo. *Dillen.* t. 46. f. 16. A. B. (in nemoribus ad arborum truncos et radices. Mai.)

4. *D. heteromallum*: trunco simpliciusculo, foliis subulatis falcatis secundis, capsulae cernuae operculo curvirostro. *Dillen.* t. 47. f. 37. (in scrobibus, fossarum marginibus, viis cavis et muris. Jun.)

5. *D. fastigiatum*: trunco ramoso, ramis fastigiatis, foliis linearibus carinatis obtusiusculis apice serrulatis adpressis, capsulae cylindricae rectae operculo subulato. (in turfosis, sphagnetis. Mai.)

22. *TRICHOSTOMUM*. Peristomium dentibus senis denis simplicibus rectis capillaribus fissis.

1. *T. canescens*: [*Bryum canescens*] trunco ra-



meso, foliis ovato-lanceolatis striatis reflexis apice incanis, capsulae ellipticae operculo subulato. *Dillen.* t. 47. f. 27. B. C. D. E. (in montosis sterilibus. Mai. Sept.)

23. *POLYTRICHUM*. Peristomium dentibus tricenis, binis brevibus apice epiphragmate nexis.

1. *P. yuccaefolium*: [commune] trunco simplici erecto, foliis lanceolato-acuminatis serrulatis reflexis, capsula oblonga tetraëdra. *Dillen.* t. 54. f. 1. (in sylvaticis humidis turfosis. Mai. Jun.)

2. *P. juniperinum*: [juniperifolium] trunco simplici, foliis lanceolato-acuminatis integerrimis carina scabris, capsula oblonga tetraëdra. *Dillen.* t. 54. f. 2. (in ericetis, pascuisque sterilibus. Jun.)

3. *P. piliferum*: trunco subsimplici, foliis lanceolatis integerrimis revolutis apice piliferis, capsula tetraëdra. *Dillen.* t. 54. f. 3. (in ericetis, umbrosis. Mai. et Sept.)

4. *P. nanum*: subacaule, foliis lanceolatis obtusis apice serrulatis, seta flexuosa, capsula turbinate cernua. *Dillen.* t. 55. f. 6. (in ericetis sylvaticis. Mai. et Sept.)

5. *P. aloides*: trunco simplicissimo, foliis lanceolatis obtusis serrulatis, capsula cylindrica subobliqua. *Dillen.* t. 55. f. 7. (in ericetis sterilibus umbrosis. Mai. et Sept.)

6. *P. undulatum*: [*Bryum undulatum*] trunco erecto subsimplici, foliis lanceolatis serratis undulatis siccitate tortilibus, capsula cylindrica

cernua, calyptra infra apicem laevi. *Hoffm. crypt. t. 1.* (in sylvaticis umbrosis humidis. Mai. Aug.)

24. BARBULA. Peristomium ciliis numerosis tortilibus.

1. *B. unguiculata*: [*Bryum unguiculatum*] trunco subramoso, foliis lanceolatis carinatis mucronatis nervosis, capsula oblonga. *Dillen. t. 48. f. 48.* (in campis aridis, viis, muris et ericetis. Mai.)

2. *B. ruralis*: [*Bryum rurale*] trunco ramoso, foliis ovato-oblongis carinatis reflexis piliferis, operculo oblique conico. *Dillen. t. 45. f. 12.* (in tectis, aridis, truncis. Mai.)

3. *B. muralis*: [*Tortula muralis*] trunco subsimplici, foliis oblongo-spathulatis patulis piliferis, operculo acuminato. *Dillen. t. 45. f. 14. 15.* (in tectis, muris, saxisque. Mai.)

4. *B. subulata*: [*Tortula subulata*] trunco subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis patulis mucronulatis, capsulae cylindricae maximae operculo subulato. *Dillen. t. 45. f. 10.* (in argillaceis humidis et siccis, Mai.)

25. ORTHOTRICHUM. Peristomium figuratum duplex: externum dentibus senis denis acutis, internum ciliis fornicatis basi liberis.

1. *O. striatum*: [*Bryum striatum*] trunco erecto ramoso, foliis lanceolatis carinatis revolutis, capsulae pedunculatae ovatae striatae operculo obtusiusculo, peristomii interni ciliis senis de-

nis. *Fl. dan.* t. 537. f. 3. (ad saxa et sepes, in truncis arborum putridis. Mai. Jun.)

2. *O. anomalum*: trunco erecto subramoso, foliis lanceolatis carinatis revolutis obtusiusculis, capsulae pedunculatae ovatae sulcatae operculo obtuso, peristomio externo nullo. *Dillen.* t. 55. f. 9. (in muris antiquis, ad saxa arborumque truncos Mai.)

26. *NECKERA*. Peristomium figuratum duplex: externum dentibus senis denis acutis, internum ciliis rectis basi liberis.

1. *N. crispa*: [*Hypnum crispum*] trunco ramoso, foliis distichis oblongis transverse rugosis, capsulis pedunculatis. *Dillen.* t. 36. f. 12. (in nemorosis montosis ad arborum truncos solo calcareo. Sept.)

2. *N. viticulosa*: [*Hypnum viticulosum*] trunco repente ramoso, ramis erectis simpliciusculis, foliis ovatis obtusis subreflexis, capsulis pedunculatis. *Dillen.* t. 39. f. 43. (in siccioribus, ad saxa, Oct.)

27. *CLIMACIUM*. Peristomium duplex: externum dentibus senis denis acutis, internum ciliis rectis basi liberis, trabeculis transversalibus nexis.

1. *C. dendroides*: [*Hypnum dendroides*] trunco erecto basi nudiusculo, ramis fasciculatis terminalibus, foliis oblongis apice serrulatis nervosis. *Dillen.* t. 40. f. 48. (in nemorosis montosis, ad arborum radices. Mai. et Sept.)

28. **LESKEA**. [*Hypnum olim*] Peristomium externum dentibus senis denis acutis, internum ciliis uniformibus basi membrana connatis.

1. *L. trichomanoides*: trunco ramoso, ramis apice obtusis, foliis distichis oblongis obtusis subulnatis enerviis. *Dillen.* t. 34. f. 8. (ad arborum truncos. Mai.)
2. *L. complanata*: trunco ramoso repente, ramis apice attenuatis, foliis ovato-oblongis apiculatis enerviis. *Dillen.* t. 34. f. 7. (ad truncos et radices arborum. Mai.)
3. *L. sericea*: trunco ramoso repente, ramis erectis incurvis, foliis lanceolato-acuminatis tristriatis, seta muriculata, capsula erecta. *Dillen.* t. 42. f. 59. (ad truncos. Mai.)

29. **BARTRAMIA**. Peristomium externum dentibus senis denis acutis, internum membrana plicata dentibus geminis uniformibus coronata. Capsula subglobosa.

1. *B. pomiformis*: [*Webera pomiformis*] trunco ramoso, ramis brevioribus incrassatis, foliis lineari-subulatis argute serrulatis siccitate tortilibus. *Dillen.* t. 44. f. 1. (in viis cavis, ad sylvarum margines. Mai.)
2. *B. fontana*: [*Mnium fontanum*] trunco erecto, ramis terminalibus subverticillatis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis apice serrulatis subsecundis. *Dillen.* t. 44. f. 2. (in paludibus ad scaturigines. Mai. Jun.)

30. TRENTETOPHLIA. Corpuscula sessilia, inter axillas foliorum ovata, perichaetio cincta, clausa, decidua.

1. *T. erecta*: [*Bryum annotinum*] trunco erecto subramoso, foliis sparsis ovato-lanceolatis serratis, capsulae pendulae pyriformis operculo obtuso. *Hoffm. crypt. t. 14.* (in pratis arenosis, locisque inundatis. Jul. Sept.)

31. BRYUM. Peristomium externum dentibus senis denis acutis, internum membrana plicata dentibus integris et interpositis ciliis coronata.

1. *B. caespiticiu*m: [*Mnium caespiticiu*m] trunco erecto subramoso, foliis lanceolato-cuspidatis nervosis strictis, capsulae pendulae pyriformis operculo mammillari. *Dillen. t. 50. f. 66 A. B. C. D. E.* (in ericetis, sylvaticis, arenosis, caespite denso. Mai.)

2. *B. argenteu*m: [*Mnium argenteu*m] trunco erecto subramoso, foliis dense imbricatis ovatis obtusis mucronulatis argenteis, capsulae obovatae pendulae operculo obtuso. *Dillen. t. 50. f. 62.* (in muris, tectis, saxis, viis, ruderatis, collibus apricis. Sept. Oct.)

3. *B. capillare*: [*Mnium capillare*] trunco brevissimo, foliis substellatis ovatis nervosis piliferis siccitate involutis, capsulae obovatae pendulae operculo acuminato. *Dillen. t. 50. f. 67.* (in umbrosis humidis. Mai.)

32. MNIMUM. Peristomium externum dentibus senis denis acutis, internum membrana plicata denti-



bus foratis et interpositis ciliis coronata. Seta terminalis.

1. *M. palustre*: trunco erecto apice diviso, foliis lanceolato-acuminatis integerrimis patulis, capsulae subcernuae operculo obtusiusculo. *Dillen.* t. 31. f. 3. (in paludibus et scaturiginibus. Mai. Jun.)
2. *M. hornum*: trunco erecto subsimplici, foliis oblongo-lanceolatis serratis nervosis patulis, capsulae pendulae operculo mammillari. *Dillen.* t. 51. f. 71. (in nemorosis ad rivulos paludum. Mai.)
3. *M. cuspidatum*: [*Bryum cuspidatum*] trunco sterili reptante, foliis ovato-lanceolatis serratis cuspidatis, capsulae pendulae operculo convexo. *Dillen.* t. 53. f. 79. (in sylvaticis umbrosis et pomariis, ad fossas. Mai. Jun.)
4. *M. punctatum*: [*serpyllifolium*] trunco sterili reptante, foliis subrotundis integerrimis, capsulae ovatae operculo acuminato. *Dillen.* t. 53. f. 81. (ad fossas et in sylvaticis umbrosis, ad arborum radices. Mai. Jun.)
5. *M. roseum*: [*Bryum roseum*] trunco erecto simplici, foliis rosaceo-congestis ovato-lanceolatis acuminatis tenuissime serrulatis, capsulae pendulae operculo convexo. *Dillen.* t. 52. f. 77. (in nemoribus umbrosis ad fossas. Mai. Jun.)
6. *M. undulatum*: [*Bryum ligulatum*] trunco sterili reptante, foliis oblongis undulatis serratis,



capsulae pendulae operculo acutiusculo. *Dillen.*  
t. 52. f. 76. (ad fossas nemorum. Mai. Jun.)

33. *HYPNUM*. Peristomium externum dentibus  
senis denis acutis, internum membrana plicata den-  
tibus foratis et interpositis ciliis coronata. Seta  
axillaris.

1. *H. myosuroides*: [*Leskea vivipara*] trunco re-  
pente, ramis recurvis, foliis ovato-acuminatis  
integerrimis, [nervo vix conspicuo] capsula  
erecta. *Dillen.* t. 41. f. 50. (ad arborum radices  
in sylvaticis udis. Mai.)

2. *H. abietinum*: trunco decumbente ramoso, ra-  
mis pinnatis attenuatis rigidis, foliis imbricatis  
adpressis ovato-lanceolatis striatis, capsula cer-  
nua. *Dillen.* t. 35. f. 17. (in siccis sylvaticis  
montosis. Mai.)

3. *H. proliferum*: [*delicatum*] trunco decumbente  
ramoso pinnato, ramis apice convolutis, foliis  
ovato-acuminatis, summis enerviis papillois,  
capsula subcernua. *Dillen.* t. 35. f. 14. (in syl-  
vaticis ad arborum radices. Mai.)

4. *H. praelongum*: trunco decumbente, ramis  
laxis, foliis ovato-lanceolatis remotiusculis den-  
ticulatis, seta muriculata, capsulae cernuae  
operculo rostrato. *Dillen.* t. 35. f. 15. (in po-  
mariis et hortis ad arborum truncos et radices.  
Mai.)

5. *H. serpens*: trunco repente ramosissimo, foliis  
ovato-acuminatis basi nervosis, capsulae cer-  
nuae operculo mammillari. *Dillen.* t. 42. f. 64.

(ad truncos, praesertim *Oxyacanthae*, ad saxa et in muris vetustis. Mai et Sept.)

6. *H. velutinum*: trunco repente, ramis erectis simplicibus, foliis confertis ovato-lanceolatis subserratis, perichaetialibus crinitis, capsula cernua ovata. *Dillen.* t. 42. f. 61. (in muris, ruderatis, sylvaticis, ad arborum truncos. Mai.)

7. *H. plumosum*: trunco reptante, ramis bifariis depressis, foliis ovato-lanceolatis striatis, seta laevi, capsulae cernuae operculo conico. *Dillen.* t. 35. f. 16. (in sylvaticis ad saxa et truncos. Mai.)

8. *H. purum*: [*elegans*] trunco adscendente pinnato, foliis imbricatis ovalibus concavis mucronulatis nitidis, capsulae cernuae operculo mucronulato. *Dillen* t. 40. f. 45. (in pratis, nemorosisque umbris. Mai.)

9. *H. rutabulum*: trunco ramosissimo, foliis ovatis acuminatis patulis serrulatis, seta muriculata, capsulae cernuae operculo conico. *Dillen.* t. 38. f. 29. (in sylvaticis humidis. Mai. Jun.)

10. *H. denticulatum*: trunco subsimplici, foliis bifariam positis lanceolatis integerrimis, seta subbasilari, capsulae cernuae operculo conico. *Dillen.* t. 34. f. 5. (in umbris sylvaticis ad arborum radices. Mai.)

11. *H. triquetrum*: trunco pinnato, ramis sparsis subrecurvis, foliis deltoideo-lanceolatis patulis serrulatis striatis, capsulae cernuae oper-

- culo conico. *Dillen.* t. 38. f. 28. (in sylvis ad arborum truncos. Mai. et Oct.)
12. *H. squarrosum*: trunco erecto pinnato, foliis ovatis acuminatis recurvis, capsulae subnutantis operculo conico. *Dillen* t. 39. f. 38. (in pomariis, nemorosis et sylvaticis sterilibus. Mai. et Sept.)
13. *H. cuspidatum*: trunco pinnato, foliis lanceolatis patulis, summis convolutis, capsulae cernuae operculo conico. *Dillen.* t. 39. f. 34. (in pratis paludosis umbrosis. Jun. Jul.)
14. *H. compressum*: [*Schreberi*] trunco pinnato subcompresso, ramis subincurvatis, foliis laxè imbricatis ovatis concavis. *Dillen* t. 40. f. 47. (in sylvaticis et nemorosis declivibus. Mai. et Oct.)
15. *H. parietinum*: [*splendens*] trunco bipinnato, foliis adpressis ovato-acuminatis apiculatis, capsulae cernuae operculo rostrato. *Dillen.* t. 35. f. 13. (in ericetis et sylvis, ad arborum truncos. Mai. Jun.)
16. *H. commutatum*: trunco exacte pinnato, foliis ovato-subulatis tortilibus, setis rameis, capsulae cernuae operculo conico. *Hedw. musc.* IV. t. 26. (in sylvaticis udis, palustribus, rivulisque. Jul. Aug.)
17. *H. molluscum*: [*Crista castrensis*] trunco pinnato, ramis distichis suboppositis, foliis linearibus falcatis subdenticulatis. *Hedw. posth.* t. 76. (in sylvis ad arborum truncos et radices Mai. et Sept.)

18. *H. cupressiforme*: trunco prostrato pinnato, ramis simpliciusculis subincurvatis, foliis ovato-acuminatis arcte imbricatis, capsulae cernuae operculo rostrato. *Hedw. musc.* IV. t. 23. (in arboribus, praesertim salicibus vetustis. Mai.)
19. *H. extenuatum*: ramis filiformibus, foliis ovato-acuminatis incurvatis secundis enerviis. *Dillen.* t. 37. f. 23. B. C. D. (ad terram, arborum truncos et saxa. Mai.)
34. WEBERA. Peristomium externum dentibus senis denis acuminatis, internum membranaceum carinatum, cum et absque ciliis.
  1. *W. pyriformis*: [*Mnium pyriforme*] foliis planis acutis apice serrulatis, capsula pyriformi. *Dillen.* t. 44. f. 6. (ad margines fossarum, in muris, ruderatis, fodinis calcareis. Mai. et Sept.)
35. BUXBAUMIA. Peristomium externum dentibus senis denis truncatis brevissimis, internum filis multiplicibus conicis.
  1. *B. aphylla*: pedunculo elongato, capsula altero latere depressa marginata. *Buxb.* f. 11. 12. (in ericetis et sylvaticis arenosis umbrosis, ad collium margines. Mai.)
36. FONTINALIS. Peristomium externum dentibus senis denis, internum reticulum conicum.
  1. *F. antipyretica*: trunco triquetro ramosissimo, foliis ovatis acutis complicato-carinatis enerviis, capsula subsessili. *Dillen.* t. 33. f. 1. (in fluviis, fontibus, fossis, ad aggeres moletrarum. Mai.)
37. FUNARIA. Peristomii externi dentes apice cohaerentes, interni cilia fornicata.

1. *F. hygrometrica*: [*Koelreutera hygrometrica*] trunco subsimplici, foliis oblongis acuminatis, capsulae nutantis operculo plano. *Dillen.* t. 52. f. 75. (in humidis umbrosis limosis acmōntium rimis, nec non ad vias. Mai. Sept.)

## H E P A T I C A E.

38. JUNGERMANNIA. Capsula quadrivalvis. Semina filis spiralibus nexa.

1. *J. asplenioides*: trunco ramoso adscendente, foliis distichis ovatis denticulato-ciliatis. *Dillen.* t. 69. f. 5. (in nemoribus umbrosis humidiusculis. Mai.)
2. *J. viticulosa*: trunco ramoso adscendente, foliis distichis subrotundis integerrimis. *Dillen.* t. 69. f. 7. (in nemorosis udis montosis. Mai.)
3. *J. pusilla*: trunco brevissimo repente, foliis distichis imbricatis obovatis undulatis apice crenulatis. *Dillen.* t. 71. f. 22. (in apricis humidis glareosis sylvaticis. Jul. Sept.)
4. *J. bicuspidata*: trunco procumbente diffuso, foliis distichis subquadratis apice emarginato-bicuspidatis, calycibus lateralibus. *Dillen.* t. 70. f. 13. (in sylvaticis umbrosis. Mai.)
5. *J. bidentata*: trunco prostrato radicante, foliis ovatis apice emarginatis bidentatis, stipulis bipartitis quadridentatis. *Dillen.* t. 70. f. 11. (in locis umbrosis. Mai. et Sept.)
6. *J. ciliaris*: trunco repente glabro, foliis stipulisque ovatis incisus dentato-ciliatis imbricatis.



catis, calycibus glabris. *Dillen.* t. 69. f. 3. (in locis udis sylvaticis. Mai. Jun.)

7. *J. complanata*: trunco repente complanato, foliis stipulisque rotundatis planis integerrimis densissime imbricatis, calycibus oblongis compressis. *Dillen.* t. 72. f. 26. (ad arborum truncos. Mai.)

8. *J. platyphylla*: trunco procumbente, foliis ovatis imbricatis stipulisque integerrimis triplici ordine, intermediis duplo maioribus. *Dillen.* t. 72. f. 32. (ad radices arborum. Mai.)

9. *J. dilatata*: trunco repente dense caespitoso, foliis rotundatis imbricatis arcte adpressis, stipulis lateralibus ovatis, intermediis bifidis margine revolutis approximatis. *Dillen.* t. 72. f. 27. (ad truncos. Mai.)

10. *J. epiphylla*: fronde obverse ovata obtuse lobata, medio fructifera. *Dillen.* t. 74. f. 14. (ad fossas et rivulos atque in udis umbrosissimis. Mai. Jun.)

11. *J. pinguis*: frondibus carnosis oblongis dichotomis laciniatis, latere fructiferis. *Dillen.* t. 74. f. 42. (ad rivulorum parietes, inque locis udis umbrosis. Mai. Jun.)

39. MARCHANTIA. Capsula multivalvis sub peltis radiatis pedicellatis. Semina filis spiralibus nexa. Gemmulae duplices in cyathis et peltis.

1. *M. polymorpha*: frondibus obtuse lobatis, receptaculo gemmifero duplici, scyphiformi et peltato, seminifero radiato. *Dillen.* t. 76. et 77.



(in locis umbrosis humidis, in ruinis, ad scaturigines et fontes aquarum. Mai. et Sept.)

## HOMALLOPHYLLAE.

40. *RICCIA*. Capsula globosa intra frondis substantiam latens, apice demum forata. Semina nuda, utriculis diaphanis subtrilocularibus primum inclusa.

1. *R. glauca*: frondibus dichotomis apice emarginatis obtusis sulcatis. *Dillen.* t. 78. f. 10. (in agris sabulosis limosis post messem. Aug.)
2. *R. fluitans*: frondibus planis dichotome multifidis divaricatis furcatis apice obtusis reticulato-venosis. (in fossis, piscinis et aquis stagnantibus. Jun. Jul.)

## A L G A E.

41. *CONFERVA*. Tubuli subgeniculati, utriculis cylindricis massam granulosam continentibus.

1. *C. fontinalis*: filamentis simplicissimis aequalibus brevissimis lubricis viridi-ferrugineis caespitosis. *Fl. dan.* t. 651. f. 3. (in rivulis umbrosis ad lapides. Mai.)
2. *C. muralis*: [*Oscillatoria parietina*] filamentis viridi-sericeis curvato-implexis capillaribus. *Dillw. conf.* t. 7. (in muris vetustis versus septentrionem. Mai.)
3. *C. vaginata*: [*amphibia*] filamentis nigricantibus vaginatis, ramulis subsimplicibus divergentibus. *Vauch. conf.* t. 15. f. 13. (in muris vetustis pluvia humectatis. Mai.)

4. *C. furcata*: [*Ceramium caespitosum*] filamentis viridibus geniculatis divaricato ramosis, articulis cylindricis, globulis gemmiferis atropurpureis tuberculato-arillatis. (in fossis et aquis sègnibus. Mai.)
5. *C. velutina*: [*Byssus velutina*] filamentis viridibus erectiusculis subramosis hinc inde hyalinis, geniculis fasciatis contractis. *Michel. t. 89. f. 5.* (in ollis floralibus hortorum Mai.)
6. *C. glomerata*: [*cristata*] filamentis viridibus ramosissimis rectis geniculatis, ramis fasciculatis, articulis cylindricis granulosis. *Fl. dan. t. 651. f. 2.* (ad cataractas rivulorum molarum. Mai.)
7. *C. fluviatilis*: filamentis viridibus ramosis subnodulosis, articulis angulatis, geniculis dilatatis. *Dillen. t. 7. f. 47.* (in fluviis ad ligna vetusta. Mai.)
8. *C. gelatinosa*: [*Chara gelatinosa*] filamentis viridibus gelatinosis ramosissimis, ramulis fasciculatis dichotomis articulatis, articulis ellipticis, geniculis setis contractis. *Dillen. t. 7. f. 42.* (in rivulis et aquaeductibus. Mai.)
9. *C. reticulata*: filamentis reticulato-anastomosantibus. *Dillen. t. 4. f. 14.* (in fossis stagnantibus, rivulisque paludosis. Mai.)
42. ULVA. Membrana diaphana, granulis sparsis innatis.
1. *U. intestinalis*: tubulis simplicibus continuis inflatis anfractuosis. *Dillen. t. 9. f. 7.* (in fluminibus. Mai. Jun.)

43. RIVULARIA. Substantia gelatinoso-cartilaginea hyalina, nuda. Filamenta articulata recta subramosa per totam substantiam.

1. *R. endiviaefolia*: fronde suborbiculata planiuscula lacunosa palmato-multifida, ramulis teretibus truncatis crinitis, filamentis geniculatis brevibus crystallinis. (ad culmos graminum majorum in aquis segnibus putrescentium. Jun. Jul.)

2. *R. dura*: globosa solida dura, filamentis radiatis subdichotomis, articulis ovalibus. (ad caules Myriophyllorum et Potamogetonum. Jun. Jul.)

44. LINKIA. Substantia gelatinosa hyalina membrana obvoluta. Filamenta articulata curvata per totam substantiam.

1. *L. Nostoc*: [*Tremella Nostoc*] subrotunda difformis plicato-undulata virescens, demum membranacea et fugax. *Dillen.* t. 10. f. 14. (in campis et arvis colliculosis post pluvias. Jul. Sept.)

## SCUTELLATAE.\*)

45. OPEGRAPHA. Apothecia lirellae. Thallus crustaceus.

1. *O. vulgata*: crusta tenui effusa albo-virescente subpulverulenta, lirellis oblongo-linearibus

---

\*) Omnia haec genera olim sub nomine *Lichen* nota fuerunt. Omni tempore omnes inveniuntur.

simplicibus confertis. *Fl. dan.* t. 1242. f. 2.  
(in cortice Abietum.)

2. *O. pulverulenta*: [*Squamaria pulverulenta*] crusta effusa alba membranacea, lirellis connato-subramosis flexuosis linearibus pulverulentis. *Pers. annal. bot.* t. 1. f. 2. Bb. (in cortice Alni.)

3. *O. scripta*: [*Verrucaria scripta*] crusta tenuissima albo-virescente nigro limitata, lirellis flexuosis simplicibus ramosisque glabris. (in cortice Querci et Coryli.)

46. LECIDEA. Apothecia patellae. Thallus crustaceus, foliaceus.

1. *L. geographica*: [*Verrucaria geographica*] crusta flavescens areolata, margine petellulisque atris. *Hoffm. lich.* t. 54. f. 2. (in saxis ubique.)

2. *L. aurantiaca*: [*Verrucaria aurantiaca*] crusta determinata rimosa cinerascens, patellulis confertis convexis aurantiacis, margine dilutione. *Fl. dan.* t. 955. f. 1. (in truncis Ulmorum, Populorum.)

3. *L. lapicida*: [*Lichen pertusus*] crusta tartarea cinerea areolato-subrugosa, patellulis depressis confertis subconfluentibus angulosis atris. *Hoffm. lich.* t. 57. f. 2. (in truncis, saxisque.)

47. CALICIUM. Apothecia pilidia. Thallus crustaceus.

1. *C. claviculare*: [*salicinum*] crusta leproso-granulosa cinereo-olivacea, pilidiis ferrugineo-atris. *Dillen.* t. 14. f. 3. (in cortice Quercus, Ulmi et Salicum.)

48. VERRUCARIA. Apothecia tubercula. Thallus crustaceus.

1. *V. nitida*: [*Sphaeria nitida*] crusta effusa cartilagineo - membranacea laevigata pallide - virescente, tuberculis confertis papillatis atris nitidis. *Weig. obs. t. 2. f. 14.* (ad truncos Quercuum)

49. CLADONIA. Cephalodium non marginatum membrana seminifera obductum, nucleo thallode, podetiis suffultum. Thallus foliaceus, fruticulosus.

1. *C. coccifera*: [*coccinea*] podetiis brevibus cinereo - virescentibus, scyphis dilatatis integris clausis, cephalodiis marginalibus coccineis. *Dillen. t. 14. f. A. D.* (terrestris, in abietinis sabulosis.)
2. *C. pyxidata*: podetiis brevibus, scyphis cyathiformibus clausis integris, cephalodiis marginalibus fuscis. *Dillen. t. 14. f. 6. A.* (in lignorum caedibus et ericetis.)
3. *C. gracilis*: podetiis elongatis filiformibus acuminatis sterilibus scyphiferisque, scyphis clausis subulato - dentatis, cephalodiis pedicellatis fuscis. *Dillen. t. 14. f. 13. C. D.* (in ericetis colliculosis.)
4. *C. uncialis*: podetiis caespitoso - aggregatis tubulosis albo - virescentibus, ramulis brevibus patulis stellato - radiatis denticulatis perforatis, cephalodiis minutis globosis spadiceis. *Dillen. t. 16. f. 22.* (in ericetis sylvaticis.)
5. *C. paschalis*: [*Stereocaulon paschale*] podetiis suprafoliaceis, cephalodiis ab initio marginatis



subfuscis. *Hoffm. lich. t. 5. f. 1.* (in ericetis montosis.)

6. *C. rangiferina*: podetiis teretibus tubulosis ramosissimis cinerascentibus, axillis perforatis, ramulis apice cernuis, cephalodiis globosis. *Dillen. t. 16. f. 29.* (in sterilibus pinetis montosis.)

50. USNEA. Orbillae planae ambitu radiatae. Thallus loreus, filamentosus, fruticulosus.

1. *U. florida*: thallo subcrustaceo fruticuloso tereti exasperato fibrilloso, fibrillis horizontalibus, ramis sparsis subfastigiatis simpliciusculis, orbillis terminalibus albo-virescentibus, tuberculis gemmiferis luteis. *Dillen. t. 13. f. 13.* (in cortice Quercuum annosarum.)

2. *U. hirta*: thallo magis caespitoso gracilioreque praecedente. *Dillen. t. 13. f. 12.* (in arborum cortice, praesertim Pinuum, ad dumeta, sepes, saxa.)

51. CORNICULARIA. Orbillae scutellaeformes convexiusculae. Thallus cartilagineus fruticulosus.

1. *C. spadicea*: [tenuissima] thallo cartilagineo fruticuloso glabro castaneo, ramulis plano-compressis sublacunosis flexuosis denticulatis. *Dillen. t. 17. f. 31.* (in ericetis, sterilibusque montosis.)

2. *C. islandica*: thallo cartilagineo castaneo, ramulis compressis canaliculatis laciniatis: laciniiis bicornibus scutellisque ciliatis. *Hoffm. lich. t. 9. f. 1.* (in montosis sylvaticis et ericetis.)



52. *PARMELIA*. Apothecia scutellae. Semina tubulis inclusa. Thallus crustaceus, foliaceus, filamentosus

1. *P. candelaria*: [*Byssus candelaris*] crusta imbricato-lobata, lobis confertissimis lacrogranulatis viridi-flavis, scutellis planis concoloribus. *Fl. dan.* t. 899. f. 2. (in parietibus, saxis, arborumque corticibus.)
2. *P. murorum*: [*Psora saxicola*] crusta plicato-rugosa rimosa virescenti-flava, lobis incis, scutellis subconcoloribus, margine dilutiori. *Hoffm. lich.* t. 17. f. 3. (in saxis, muris, lignis, tectis, parietibus.)
3. *P. saxatilis*: [*Usnea crani*] thallo cinereo-glaescente scabro lacunoso, subtus nigro fibrilloso, scutellis badiis. *Dillen.* t. 24. f. 83. (in saxis et corticibus.)
4. *P. centrifuga*: [*Squamaria centrifuga*] thallo subcoriaceo virescente glabro punctato, sorediis subramosis, scutellis centralibus spadiceis, margine inflexo integro. *Hoffm. lich.* t. 16. f. 2. (in saxis.)
5. *P. stellaris*: [*Squamaria stellaris*] thallo cinereo, laciniis sublinearibus stellatis subtus cinereo-fibrillosis, scutellis caesiis, demum nigris. *Fl. dan.* t. 857. (in tectis ligneis, variarumque arborum cortice.)
6. *P. pulverulenta*: [*Squamaria pulverulenta*] thallo humectato viridi-fusco, sicco cinereo-pruinoso, subtus nigro tomentoso, scutellis

- caesiis. *Hoffm. lich.* t. 8. f. 2. (in salicum, aliarumque arborum truncis.)
7. *P. parietina*: [*Platisma parietinum*] thallo stellato flavo subtus subfibrilloso, laciniis rotundato-lobatis crispis, scutellis concoloribus. *Dillen.* t. 24. f. 76. (in parietibus, muris, arboribusque fructiferis.)
8. *P. olivacea*: [*Platisma olivaceum*] thallo stellato olivaceo-fusco nitido, centro rugoso plicato, subtus subfibrilloso, scutellis brunneis margine crenulato. *Dillen.* t. 24. f. 77. 78. (in saxi, Betularumque cortice.)
9. *P. caperata*: [*Platisma caperatum*] thallo subcoriaceo sulphureo-virescente subtus atro hispido, scutellis subcentralibus rufescentibus margine pulverulento. *Hoffm. lich.* t. 38. et 39. (ad saxa et arbores.)
10. *P. pulmonaria*: [*Pulmonaria reticulata*] thallo subcartilagineo lacunoso-reticulato flavido-fusco subtus hirto, laciniis sinuatis truncatis, scutellis submarginalibus rufo-fuscis. *Dillen.* t. 29. f. 113. (in cortice *Quercus annosae*.)
11. *P. nigra*: [*Lichen niger*] thallo foliaceo gelatinoso nigro, scutellis immersis concoloribus. *Hoffm. lich.* t. 3. f. 6. (ad saxa.)
12. *P. tenella*: [*Lichen hispidus*] thallo cinerascens, laciniis ciliatis obtusis apice fornicatis, scutellis caesio-nigris. *Fl. dan.* t. 1186. f. 1. (ad arborum corticem.)
13. *P. physodes*: [*Physcia physodes*] thallo glabro albicante subtus nigro-fusco, laciniis sinuato-

multifidis, scutellis rubris. *Dillen.* t. 20. f. 49.  
(in sylvis ad corticem arborum.)

14. *P. furfuracea*: [*Platisma furfuraceum*] thallo cinereo pulverulento subtus fusco nudo, scutellis lateralibus concavis. *Dillen.* t. 21. f. 52.  
(in Pinuum cortice, saxisque.)

15. *P. ciliaris*: [*Platisma ciliare*] thallo virescenti-glaucos subtus nudo albicante, laciniis apice fibrillosis, scutellis nigro-caesiis. *Hoffm. lich.* t. 3. f. 4. (ad arborum corticem.)

16. *P. prunastri*: [*Lichen corniculatus*] thallo molli rugoso-lacunoso exalbido, laciniis divaricatis attenuatis, scutellis concavis badiis *Dillen.* t. 21. f. 54. (in cortice arborum, praesertim Prunorum.)

17. *P. fraxinea*: [*Platisma fraxineum*] thallo caespitoso albo-cinerascente rugoso-lacunoso, laciniis laciniatis, scutellis planis concoloribus. *Dillen.* t. 21. f. 55. A. (in arborum cortice.)

18. *P. farinacea*: [*Platisma farinaceum*] thallo caespitoso cinereo, sorediis confertis marginalibus scutellisque pedicellatis concoloribus. *Dillen.* t. 23. f. 63. (in cortice Salicum et Betulae.)

19. *P. jubata*: [*Usnea jubata*] thallo cartilagineo tereti laevi cinereo, lorulis filiformibus ramosis, axillis compressis, scutellis concoloribus. *Dillen.* t. 12. f. 7. (ad corticem Abietis.)

53. PELTIGERA. Apothecia peltae. Semina tubulis inclusa. Thallus foliaceus lobatus subtus fibrillosus.

1. *P. canina*: thallo coriaceo expanso cinerascente subtus albidiori, venis fibrillisque fu-

screscentibus, lobis oblongis, peltis verticalibus anticis revolutis badio - rufis. *Fl. dan.* t. 767. f.

2. (terrestris, ad arborum truncos musco obtectos, in umbrosis.)

2. *P. apthosa*: thallo coriaceo expanso laete viridi, sorediis sparsis glaucis fuscis, subtus avenio nigro fibrilloso, peltis anticis rotundis rubris. *Engl. bot.* t. 1119. (in umbrosis pinetis, terrestres.)

54. *CETRARIA*. Apothecia peltae scutellaeformes centro adnatae. Thallus foliaceus margine crispus utrinque nudus.

1. *C. juniperina*: [*Squamaria juniperina*] thallo membranaceo pallide flavo subtus flavissimo lacero-laciniato, laciniis adscendentibus complicatis eroso-crispis, peltis elevatis badiis. *Fl. dan.* t. 1004. (ad truncos Juniperi.)

## XYLOMYCI.

55. *SPHAERIA*. Sclerocarpus. Perithecia sphaerica intus gelatinosa thecis spermatophoris farcta.

1. *S. militaris*: [*Clavaria militaris*] carnosa flavescens - rubra, clavula sphaerulis prominentibus tuberculosa. *Fl. dan.* t. 337. f. 1. (in sylvis ad truncos putrescentes, inter muscos, etc. post largas pluvias. Sept. Oct.)

2. *S. Hypoxylon*: [*Clavaria Hypoxylon*] gregaria ramosa compressa basi hirta. *Sowerb. fung.* t. 55. (in sylvis et hortis ad arborum putrescentium truncos. Jul. Aug.)

3. *polymorpha*: [*Clavaria digitata*] gregaria, forma varia, clavulis ventricosus sphaerulis un-

- dique cinctis. *Sowerb. fung. t. 69.* (ad truncos *Quercuum annosarum.* Aug. Sept.)
4. *S. fusca*: [*fragiformis*] difformis subconfluens fusca, intus subconcolor, sphaerulis umbilicatis subprominulis. *Hoffm. crypt. I. t. 5. f. 1.* (ad ramos exsiccatos *Coryli*, *Alni* et *Oxyacanthae.* Jul. Aug.)
5. *S. ribesia*: erumpens mollis elliptica subdepressa, sphaerulis dissectis albicantibus. (in ramis exsiccatis *Ribis rubri.* Hyeme.)
6. *S. deusta*: [*versipellis*] late effusa crassa undulato-rugosa pustulata, primo carnosae cinereo-albida pulverulenta, demum nigra rigida. *Tode mekl. II. t. 17. f. 129.* (in sylvis ad truncos vetustos. Jul. Sept.)
7. *S. Stigma*: [*Hypoxylon operculatum*] ambiente effusa laevis rimosa, ostioliis immersis planiusculis. *Bulliard. champ. t. 473. f. 2.* (ad ramos siccos *Oxyacanthae* et in sepibus vetustis. Mai.)
8. *S. graminis*: epiphylla sublinearis maculaeformis nitente-nigra, ostioliis latentibus. *Pers. mycol. t. 1. f. 1. 2.* (in foliis exsiccatis graminum majorum, praesertim *Arundinis Phragmitis.* Jun. Jul.)
9. *S. salicina*: subcomposita erumpens ovalis rugulosa atra, sphaerulis connatis. *Tode fung. t. 13. f. 107.* (in cortice *Salicum.* Jul. Aug.)
10. *S. pteridis*: [*Xyloma pteridis*] striata parallela nigra, sphaerulis minutissimis subprominulis. *Rebent. t. 1. f. 3.* (in foliis *Pteridis* adhuc virentibus. Aug. Sept.)



11. *S. trifolii*: atra parva, magnitudine varia, cespitulo inaequali ruguloso interne subpulverulento. (in foliis adhuc viridibus Trifolii repentis et hybridi. Oct.)
12. *S. nebulosa*: grisea, sphaerulis minutissimis sparsis maculas nigrescente griseas interruptas inaequaliter lineatas efformantibus, ostioliis prominulis subacutis. (ad caules umbellatarum aliarumque herbarum majorum siccatas. Jul. Sept.)
13. *S. nivea*: [*Lichen rosaceus*] conica, disco farinaceo niveo, ostioliis prominulis papillatis. *Fl. dan.* t. 825. f. 1. (ad ramos exsiccatos Populi tremulae. Jul. Aug.)
14. *S. aucupariae*: [cespitosa] cespitosa nigra albido - pulverulenta, sphaerulis farctis elongato - subcylindricis *Tode fung.* II. t. 14. f. 113. (in ramis exsiccatis Sorbi aucupariae. Jul. Aug.)
15. *S. berberidis*: cespitosa nigra, sphaerulis globosis rimoso - rugosis farctis. (ad ramos Berberidis vulgaris. Jul. Oct.)
16. *S. Gnomon*: simplex epiphylla, sphaerulis ut plurimum collapsis ostioliisque clavatis glaberrimis. *Uster. Annal.* XI. t. 2. f. 6. (in foliis deciduis Coryli Avellanae, locis sylvaticis umbrosis. Mai.)
17. *S. solani*: tecta laevis, ostiolo erumpente filiformi. (sub epidermide tuberum biennium Solani tuberosi putrefactorum. Oct.)



18. *S. xylostei*: [*inquinans*] atro - inquinans, sphaerulis immersis, ostiolo demum perforato. (ad Lonicerae Xylostei languescentis ramos adhuc semivivos. Jul. Aug.)
  19. *S. tiliae*: sparsa tecta glabra subannulata, ampullaeformis aut circumscissa, orificio largo. (in ramis arefactis Tiliarum. Hyeme.)
  20. *S. Pulvis pyrius*: simplex congesta, sphaerulis ovatis subrotundis tuberculosi rugosis medio sulcatis. (ad truncos et ligna arida, pulveri pyrio disperso similis. Jul. Sept.)
56. STILBOSPORA. Sclerocarpus. Massa nigra erumpens, e sporulis constans.
1. *S. microsperma*: sporulis minutissimis subrotundis utrinque subacutis. (in cortice Betulae. Jul. Oct.)
57. HYSTERIUM. Sclerocarpus. Perithecium oblongum, rima longitudinali dehiscens.
1. *H. pulicare*: [*Lichen pulicaris*] gregarium oblongum aut ellipticum striatum. *Mich. nov. gen.* t. 50. f. 2. (ad corticem Ulmorum Quercuumque. Sept. Oct.)
  2. *H. quercinum*: [*nigrum*] erumpens flexuosum subventricosum molle nigrescente - cinereum. *Tode fung.* II. t. 8. f. 64. (ad ramulos juniores Quercuum. Jul. Sept.)
  3. *H. conigenum*: erumpens parvum subovatum rugosum. (in squamis strobilorum abietinorum exsiccatorum. Jul. Aug.)

58. *XYLOMA*. Sclerocarpus. Perithecium applanatum suborbiculare inaequale dehiscens, intus farctum.

1. *X. salicinum*: crassum tuberculosum, intus basi cartilagineum album. *Pers. meth.* t. 2. f. 4. (in foliis Salicis capreae. Jul. Aug.)
2. *X. acerinum*: [*Sphaeria maculaeformis*] maculaeforme tenue contiguum subrugosum. (in foliis Aceris platanoidis et campestريس. Aug. Sept.)
3. *X. populinum*: gregarium forma varium applanatum laeve opacum nigrum. (in foliis Populi tremulae. Mai. Jun.)

59. *NAEMASPORA*. Sclerocarpus. Gelatina fluxilis, sub lente amorpha, in cirrhos prorumpens.

1. *N. chrysosperma*: [*populina*] pustulata erumpens nigrescens, cirrhis copiosis tenuibus flavis. *Pers. mycol.* I. t. 5. f. 8. (in cortice Populi nigrae, Betulae albae, Alni glutinosae. Jul. Sept.)

60. *TUBERCULARIA*. Sclerocarpus. Perithecium hemisphaericum stipitiforme aut nullum. Latex subrotundus compactus persistens, humectatus subfluxilis.

1. *T. vulgaris*: [*Sphaeria miniata*] gregaria amoenè rubra sulcato-rugosa, receptaculo stipitiformi crasso pallido. *Bolt. fung.* t. 127. f. 1. (in ramis emortuis Ribis rubri et Tiliarum. Jul. Sept.)

61. *SPHAEROBOLUS*. Sarcocarpus. Receptaculum globosum radiatum fissum, vesiculam inclusam elastice protrudens.

1. *S. stellatus*: [*Lycoperdon Carpobolus*] capitulo glabro, ore acuminato dentato. *Fl. dan.* t. 395. (ad ramos putrescentes, in acervulis serraginis. Sept. Oct.)

62. PILOBOLUS. Sarcocarpus. Receptaculum stipitifforme hydrophorum, cui imposita vesicula nuda elastice desiliens.

1. *P. crystallinus*: [*Mucor urceolatus*] receptaculo obovato, vesicula hemisphaerica nigra. *Bull. champ.* t. 480. f. 1. (ad fimeta equina aut bubulina. Sept. Oct.)

63. SCLEROTIUM. Sarcocarpus. Corpus carnosum connexum, vesiculis farctum.

1. *S. complanatum*: complanatum erectum substipitatum pallidum. *Tode fung.* I. t. 5. f. 9. (in fimetis, culmis gramineis putrescentibus adhaerens. Mai)
2. *S. brassicae*: oblongum depressum nigrum, intus nigro-punctatum (intra folia putrescentia Brassicae oleraceae in cellis asservatae. Hyeme.)
3. *S. Semen*: [*Sphaeria brassicae*] gregarium sphaericum nigrescente-spadiceum, demum corrugatum. *Tode fung.* I. t. 4. f. 6. (ad stipites subputrescentes Solani tuberosi in agris acervatos. Vere et autumnno.)
4. *S. Erysiphe*: [*Dematium Erysiphe*] epiphyllum, granulis aggregatis fusco-nigris, tomento albo insidentibus. (in foliis variarum plantarum v. c. Heraclei Sphondylii, Coryli Avellanae, etc. Sept.)

5. *S. populneum*: epiphyllum congestum subimmersum incarnato-rufum, demum nigrescens, formis varium subrotundum aut angulato-confluens. (in foliis Populi tremulae. Mai.)
64. TUBER. Sarcocarpus. Subrotundum carnosum. Substantia venis seminiferis variegata.
1. *T. cibarium*: [*Lycoperdon Tuber*] subterraneum, verrucis exasperatum nigrescens. *Bull. champ.* t. 356. (sub terra, ubi a canibus eo fine eruditis effoditur, in vicinitate quercuum annosarum. Jun. Sept.)

## G A S T E R O M Y C I.

65. GEASTRUM. Dermatocarpus, trichospermus. Volva tenuis, evanescens. Peridium radiatim fissum demum reflexum, ore piloso.
1. *G. hygrometricum*: [*Lycoperdon stellatum*] radio multifido inflectente badio, peridio reticulato sessili subconcolore. *Bull. champ.* t. 238. (in pinetis sabulosis. Vere et autumno.)
66. BOVISTA. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium laeve sessile, cortice exteriori demum evanescente, apice irregulariter hiscente.
1. *B. plumbea*: [*Lycoperdon ardesiaceum*] minor subglobosa plumbeo-caesia. *Bull. champ.* t. 192. (in pratis, locis graminosis, montosis, umbrosis. Aug. Sept.)
67. LYCOPERDON. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium verrucis obsitum caulescens, apice demum ruptum.

1. *L. giganteum*: [*maximum*] subacaule globosum maximum ex albido pallescens, squamulis sparsis subobsoletis. *Bull. champ.* t. 447. (in graminosis, arvisque. Sept.)
2. *L. Bovista*: [*gemmatum*] magnum obconicum molle pallescente-albidum, subtus plicatum, squamis latiusculis. *Fl. dan.* t. 1139. (in collibus herbidis. Sept. Oct.)
3. *L. pratense*: [*papillatum*] candidum molle, peridio hemisphaerico laeviusculo, verrucis parcis, caule brevissimo. *Bull. champ.* t. 435. f. 2. (in pratis collibusque graminosis, post pluvias. Aug. Sept.)
4. *L. pyriforme*: [*ovoideum*] cespitosum pyriforme umbonatum fuligineo-pallidum: squamulis tenuissimis, radiculis fibrosis longis. *Bull. champ.* t. 435. f. 3. (ad truncos putridos, in quercetis. Sept. Oct.)

68. **SCLERODERMA**. *Dermatocarpus*, *trichospermus*. Peridium cortice suberoso duriusculo subteselato, indeterminatim demum rupto.

1. *S. cervinum*: [*Lycoperdon cervinum*] subterraneum rotundum oblongum durum granulatum. *Mich. gen.* t. 99. f. 4. (in pinetis subterraneum. Jun. Sept.)

69. **LYCOGALA**. *Dermatocarpus*, *trichospermus*. Peridium subrotundum membranaceum laeve, intus primo massa pulposa liquescente, dein pulvere filis raris intertexto farctum.

1. *L. miniata*: [*Lycoperdon Epidendrum*] gregaria globosa, primo miniata, demum fuscescens,

pulvere roseo. *Fl. dan.* t. 760. in truncis putrescentibus vetustis, post pluvias. Aug. Sept.)  
70. **FULIGO.** *Dermatocarpus*, *trichospermus*.  
*Peridium* effusum, primo pulposum, dein fibroso cellulosum pilosum, demum in pulverem fatiscens.

1. *F. rufa*: [*Mucor septicus*] pulvinata rufa, cortice subrugoso fragili subcompacto. *Fl. dan.* t. 778. (in truncis et lignis putrescentibus. Aug. Sept.)

2. *F. flava*: [*Reticularia lutea*] effusa subrotunda flava, cortice celluloso-fibroso. *Bolt. fung.* t. 134. (super truncos, muscos, foliaque decidua, vitelli ovi ad instar effusa. Sept. Oct.)

3. *F. vaporaria*: primo oblecta venosa repens, matura late cespitosa crassa celluloso-fibrosa flavo-cinnamomea. (in vaporariis intra pulverem coriarium. Hyeme.)

71. **SPUMARIA.** *Dermatocarpus*, *trichospermus*.  
*Peridium* duplex effusum: exterius furfuraceum deciduum, interius persistens ramoso-cornutum.

1. *S. Mucilago*: [*Reticularia alba*] magna, alba, peridiis interne ramoso-cornutis. *Bull. champ.* t. 126. (super folia et muscos effusa, caulesque plantarum seu ramulos deciduos ambiens. Sept. Oct.)

72. **DIDERMA.** *Dermatocarpus*, *trichospermus*.  
*Peridium* duplex: exterius fragile, interius pellucidum. Fila parca latentia columnulae ovali adnata.

1. *D. vernicosum*: [*Lycoperdon fragile*] stipitatum congestum rufescens ovatum nitidum, stipite brevi laxo albido. *Dicks. brit.* l. t. 3. f. 5.



(in sylvis, muscos, ramulos, foliaque praesertim incolens. Frequenter in Calluna et Myrtillo. Sept. Oct.)

73. TRICHIA. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium glabrum inaequaliter ruptum. Capillitium compactum elastice expansum.

1. *T. rubiformis*: [*Lycoperdon vesparium*] stipitata fasciculata chalybea nitida, stipitibus conatis subpedatis brevioribus. *Batsch. fung. I. t. 30. f. 172.* (in sylvaticis ad truncos subputrescentes, nec non in sepibus vetustis. Sept. Oct.)

2. *T. ovata*: [*Clathrus turbinatus*] congesta sessilis obovata opaca ex ochraceo-alutacea. *Bolt. fung. t. 48. f. 7.* (in sylvis. Sept. Oct.)

74. ARCYRIA. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium circumscissum. Capillitium ovatum receptaculo calyculato impositum.

1. *A. punicea*: [*Stemonitis crocata*] congesta croceo-punicea, capillitio subcinereo. *Bull. champ. t. 502. f. 1. b. c.* (in sylvis ad truncos putrescentes. Aug. Sept.)

75. STEMONITIS. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium tenuissimum evanescens. Capillitium reticulatum, subcompactum, columnulae adnatum.

1. *S. typhina*: [*Embolus pertusus*] sparsa minor, capillitio cylindrico obtuso subincurvo. *Bull. champ. t. 477. f. 2.* (ad truncos vetustos, praesertim salicinos. Aug.)

76. CRIBRARIA. Dermatocarpus, trichospermus. Peridium tenuissimum, aut totum aut ad dimidium

evanescens. Capillitium filis reticulatis cancellatum, pulverem congestum ambiens.

1. *C. vulgaris*: gregaria, peridio lutoso rotundo subcernuo, stipite longo purpurascente. *Schrad. t. 1. f. 5* (in sylvaticis ad truncos putridos et muscos. Jul. Oct.)

77. TUBULINA. Dermatocarpus, gymnospermus. Peridia tubuliformia in cespitulum connata, stromati membranaceo imposita.

1. *T. fragiformis*: [*Stemonitis ferruginea*] suborbicularis rubro-spadicea, tubulis incrassatis apice distinctis. *Fl. dan. t. 659 f. 2.* (post pluvias densas, ad truncos. Jul. Aug.)

78. MUCOR. Dermatocarpus, gymnospermus. Peridium membranaceum subglobosum stipitatum: primo subaquosum pellucidum, dein opacum. Sporulae nudae, subcohaerentes.

1. *M. Mucedo*: [*Mucedo grisea*] stipite simplici, peridio inflato nigrescente griseo, ore rotundo circa stipitem dehiscente. *Fl. dan. t. 461. f. 4.* (in fructibus putridis. Autumno et hieme.)

2. *M. caninus*: [*Hydrophora stercorea*] congestus byssoideus albus, peridiis minutis lutescentibus. *Pers. mycol. I. t. 6. f. 3. 4.* (in muscerda canina, tempestate pluviosa. Oct. Nov.)

3. *M. herbariorum*: [*Stemonitis sulphurea*] acaulis flavescens persistens, peridiis globosis tomento insidentibus. (in plantis haud bene exsiccatis, vel locis humidis depositis.)

79. ONYGENA. Dermatocarpus, gymnospermus. Peridium stipitatum, subrotundum, siccum, per-

sistens. Pulvis compactus, cohaerens, filis nullis intertextus.

1. *O. equina*: [*Lycoperdon equinum*] gregaria albedo-pallescentia, peridio orbiculari glabro rugoso subfurfuraceo. *Pers. mycol.* II. t. 6. f. 3. a. b. c. (in unguibus vetustis equorum, cornubusque bovinis, locis sylvaticis umbrosis dejectis. Aestate.)

80. AECIDIUM. Dermatocarpus, gymnospermus. Peridia cylindracea membranacea, ore plerumque dentato dehiscentia. Pulvis farinaceus.

1. *A. cornutum*: [*Lycoperdon corniferum*] flavescens, peridiis longissimis curvatis olivaceo-griseis. *Pers. mycol.* II. t. 4. f. 2. 3 (in foliis Sorbi aucupariae. Aug. Sept.)
2. *A. cancellatum*: [*Lycoperdon cancellatum*] tuberculatum spadiceum, peridiis in lacinias apice cohaerentes demum fissis. *Fl. dan.* t. 704. (in foliis adhuc viridibus Betulae et Pyri languiscentis. Aug. Sept.)
3. *A. rhamni*: cespitosum roseum, peridiis elongatis subdivergentibus demum expallidis. *Pers. mycol.* I. t. 2. f. 4. (in foliis Rhamni cathartici et Frangulae. Aestate.)
4. *A. rubellum*: [*rumicis*] confertum subconfluens cespitosum orbiculare rubrum. peridiis pulvereque albidis. *Hoffm. germ.* II. t. 2. f. 2. (in foliis Rumicis aquatici et obtusifolii, nec non Rhei undulati et Fragariae vescae. Jul. Aug.)
5. *A. grossulariae*: solitarium cespitosum, macula subinaequali rubra margine peridiisque

pallidis. (in foliis et petiolis, aut in ipsis baccis Grossulariae. Jun. Aug.)

6. *A. confertum*: [*ficariae*] subeffusum crassum flavum: forma varia inaequali, peridiis subdistantibus. (in *Ficariae vernae* et *Violae adoratæ* petiolis et nervis foliorum. Mai.)
7. *A. crassum*: subeffusum crassum flavo-aurantium. *Pers. ic. et descr.* II. t. 3. f. 1. 2. (in foliis *Rhamnorum*, *Ranunculorum*, *Calthae* et *Aquilegiae*, nervos praecipue obducens. Mai.)
8. *A. asperifolii*: cespitosum orbiculare subtus excavatum crassiusculum aurantium, peridiis sparsis. (in plantis variis asperifoliis, e. g. in *Cynoglosso*, *Picride*, *Symphyto*, *Urtica urente*, etc. Jul. Aug.)
9. *A. tussilaginis*: [*Lycoperdon epiphyllum*] macula purpurascente-flava, peridiis immersis, cespitulo plano. (in foliis *Tussilaginum*. Jul. Aug.)
10. *A. berberidis*: [*Lycoperdon poculiforme*] cespitosum orbiculare parvum convexum, peridiis subelongatis flavis. *Jacqu. coll.* I. t. 4. f. 1. in foliis *Berberidis*. Jun. Aug.)
11. *A. geranii*: macula nulla, cespitulo forma vario, peridiis subelongatis pulvereque brunneo. (in foliis *Geranii sylvatici* et *pratensis*. Aug. Sept.)
12. *A. bifrons*: [*ranunculi*] macula nulla, cespitulo forma vario, peridiis confertis tenuibus flavescentibus. (ad nervos foliorum *Ranunculi acris* et *Aconiti Lycoctoni*. Jul. Aug.)

13. *A. tragopogi*: [*cichoriarum*] sparsum, peridiis subellipticis albis, margine inaequali lacero, pulvere flavo. (in caule foliisque *Tragopogi pratensis*. Jul. Aug.)
  14. *A. leucospermum*: [*anemones*] simplex sparsum, peridiis cylindricis prominulis pallidis ut plurimum dentatis, pulvere albo ex toto repletis. (in foliis junioribus *Anemones nemorosae*. Mai.)
  15. *A. punctatum*: simplex sparsum, peridiis subimmersis, ore subconnivente, pulvere compacto fuscescente. *Hoffm germ.* II. t. 2. f. 1. (in foliis *Anemones ranunculoidis*. Mai.)
81. PUCCINIA. *Dermatocarpus*, gymnospermus. *Peridia turbinata septulis interstincta.*
1. *P. anemones*: [*Aecidium fuscum*] sparsa subparallela spadicea inquinans, sporulis uno septulo medio constrictis, utrinque rotundatis. *Pers. mycol.* II. t. 6. f. 5. (in foliis *Anemones nemorosae* et *ranunculoidis*. Mai.)
  2. *P. betonicae*: confluens spadicea inquinans; capsulis variis, ut plurimum oblongo-ovatis mucronatis. (in foliis *Betonicae officinalis*. Mai.)
  3. *P. aethusae*: [*nitida*] sparsa pustulata ferruginea dein fusco spadicea; capsulis obovatis nitidis, cauda brevi curva instructis (in foliis et caulibus *Aethusae Cynapii*. Jul. Aug.)
  4. *P. menthae*: sparsa punctiformis obscure spadicea, sporulis subquadrangularibus: cauda brevissima. (in foliis *Menthae aquaticae* et *austriacae*. Aug. Sept.)

5. *P. aegopodii*: [bullata] glomerulis minutis fuscis circinatim aggregatis; capsulis subovatis, mucrone curvo. (in foliis Aegopodii Podagrariae Jun. Jul.)
6. *P. gentianae*: [pneumonanthes] erumpens varia umbrina; capsulis oblongis, cauda brevi curva. (sub epidermide foliorum adhuc viridum Gentianae cruciatae et Pneumonanthes. Sept. Oct.)
7. *P. pimpinellae*: sparsa subrotunda cinnamomea, capsulis difformibus ovatis obovatisque, cauda brevi curvula. (in foliis Pimpinellae Saxifragae. Aug. Sept.)
8. *P. hieracii*: [flosculorum] sparsa subrotunda cinnamomea; capsulis subovatis. (in foliis Hieracii murorum, sylvatici et sabaudi. Aug. Sept.)
  - b. *Puccinia apargiae*: [prenanthidis] subconferta irregularis, capsulis subovatis (in foliis Apargiae autumnalis et Prenanthidis muralis. Sept. Oct.)
9. *P. cnici*: sparsa rotunda cinnamomea; capsulis subellipticis. (in foliis Cnici lanceolati. Aug. Sept.)
10. *P. centaureae*: conferta fusco-cinnamomea; capsulis ovatis. (in foliorum inferiore pagina Centaurea phrygiae. Sept.)
11. *P. polygoni*: spadicea depressa, sporulis caudatis oblongo-ovatis.
  - a. *Puccinia bistortae*: glomerulis subrotundis minutis aurantiis, capsulis ovatis orbatis.



que. (in foliis Polygoni amphibii et Bistortae. Aug. Sept.)

b. *Puccinia persicariae*: glomerulis depressis fuscescentibus, variae formae et magnitudinis. (in foliis Polygoni Persicariae. Sept.)

12. *P. cerealis*: [graminis] conferta linearis nigrescens, sporulis subturbinatis medio constrictis (in culmis foliisque graminum variorum, praecipue Secalis et Tritici. Sept.)

13. *P. junci*: [scirpi] subrotunda linearis nigra; capsulis fusiformibus supra medium constrictis, in caudam desinentibus. (in foliis et culmis scirporum juncorumque. Sept. Oct.)

14. *P. tanacetii*: [caudata] sparsa rotunda fusca; capsulis oblongis medio coarctatis, cauda longissima rectiuscula. (in foliis Tanacetii vulgaris Sept. Oct.)

15. *P. balsamitae*: sparsa conferta subrotunda fusca; capsulis ovatis constrictis, cauda capsulae longitudine. (in foliis Balsamitae suaveolentis Sept. Oct.)

16. *P. potentillae*: [obtusa] subrotunda sessilis, primum aurantiaca demum nigra, sporulis cylindricis obtusis. (in foliis Potentillae argenteae et Tormentillae erectae. Sept. Oct.)

17. *P. rubi*: [mucronata] conferta nigra villosa, sporulis subattenuatis. (in foliis Rubi corylifolii et fruticosi. Sept. Oct.)

18. *P. bulbosa*: capsulis cylindricis obtusiusculis septulis quatuor, cauda crassa bulbosa. (in foliis Rubi fruticosi. Sept. Oct.)

19. *P. ficariae*: e badio nigrescens, subbullata; cespitulis majusculis solitariis parcis subrotundis, sporulis rotundo-ovatis subcaudatis (in *Ficaria verna*. Mai.)

20. *P. pruni*: [*acaciae*] sparsa minuta punctiformis, sporulis globosis geminis, cauda brevissima. (in foliis *Pruni insiticiae* et *spinosae*. Sept. Oct.)

21. *P. circaeae*: [*chrysosplenii*] sparsa verrucaeformis badia, sporulis ovato-acutis. (in foliis *Circaeae alpinae*. Sept. et in *Chrysosplenio alternifolio*. Mai.)

82. UREDO. *Dermatocarpus*, *gymnospermus*. Peridium effusum ab epidermide formatum, pulvere uniformi globuloso prorumpente.

\* *Pulvere albo* [*ALBUGO*]

1. *U. candida*: [*Aecidium candidum*] prominens candida; capsulis siccitate contractis, ovatis.

a. *Uredo thlaspeos*: subeffusa. (in foliis *Thlaspeos Bursae pastoris*. Jul. Aug.)

b. *Uredo cheiranthi*: [*erysimi*] sparsa subglobosa tumida. (in foliis *Cheiranthi incani* et *Erysimi cheiranthoidis*. Aug.)

c. *Uredo alyssi*: sparsa subrotunda latens. (in foliis *Alyssi calycini* et *incani*. Jul. Aug.)

2. *U. cubica*: [*tragopogi*] globosa clausa albida; capsulis siccitate in formam cubicam contractis. (in foliis *Tragopogi majoris* et *pratensis*. Aug. Sept.)

\*\* *Pulvere flavescente*. [*RUBIGO*]

3. *U. alchemillae*: flava conferta, lineasque subparallelas erumpens. (in foliis Alchemillae utriusque. Jun. Jul.)
4. *U. frumenti*: [*linearis*] flava linearis longissima inquinans, demum colore obscuriore. (in culmis foliisque frumentorum. Jul. Aug.)
5. *U. polypodii*: [*athyrii*] flava linearis longissima tenera. (in stipitibus foliisque Athyrii fragilis et Aspidii spinulosi. Aug. Sept.)
6. *U. euphorbiae*: [*helioscopiae*] flava subglobosa sparsa prominens. (in foliis Euphorbiae helioscopiae et Pepli. Jul. Aug.)
7. *U. pyrolae*: flava conferta applanata oblonga. (in foliis Pyrolae rotundifoliae et umbellatae. Jul. Aug.)
8. *U. lini*: aurantiaco - rubra conferta, cespitulis pulvinatis magnitudine variis. (in foliis Lini usitatissimi et cathartici. Jul. Aug.)
9. *U. potentillae*: parca laxa rufo-inquinans. (in villo foliorum Potentillae argenteae et in ruthe-nica. Sept. Oct.)
10. *U. rubi*: aurea minuta pulverulenta subglobosa. (in foliis Rubi caesii, corylifolii et fruticosi. Jun. Jul.)
11. *U. orchidis*: [*circinalis*] aggregata vivide aurea elliptice etaequaliter circinata. (in foliis Orchidis conopseae et maculatae. Mai. Jun.)
12. *U. mercurialis*: [*confluens*] saturate ochracea applanata circinatim confluens. (in foliis Mercurialis perennis. Mai. Jun.)

13. *U. evonymi*: [*ribis*] minor colore dilutiore,  
(in foliis *Evonymi verrucosi* et in *Ribesio alpino*.  
Mai, Jun.)
14. *U. senecionis*: [*farinosa*] ochracea irregulari-  
ter confluens farinosa. (in foliis *Senecionis syl-*  
*vatici* et vulgaris. Aug. Sept.)
15. *U. tussilaginis*: [*farfarae*] miniato-rubra,  
punctis subconcentricis. (in foliis *Tussilaginis*  
*Farfarae* et *Petasitidis*. Aug. Sept.)
16. *U. pulsatillae*: [*tremellosa*] crocea clausa pu-  
stulaeformis subtremellosa. (in foliis *Pulsatillae*  
vulgaris. Jul. Aug.)
17. *U. campanulae*: flavo-rubra rotunda subde-  
pressa, magnitudine varia. (in foliis *Campanu-*  
*lae patulae*, *rapunculoidis*, *rotundifoliae* et  
*Trachelii*. Jun. Jul.)
18. *U. sonchi*: fulva subconfluens conferta, ce-  
spitulis planiusculis irregularibus. (in foliis *Son-*  
*chi arvensis* et *oleracei*. Aug. Sept.)
19. *U. ringentium*: aurantia inaequalis subsparsa.  
a. *Uredo rhinanthi*: subsparsa. (in foliis  
*Rhinanthi majoris* et *minoris*. Jun. Jul.)  
b. *Uredo melampyri*: flavo-rubens effusa,  
(in foliis *Melampyri arvensis* et *nemorosi*. Jul.)  
c. *Uredo euphrasiae*: miniato-aurantia. (in  
foliis *Euphrasiae officinalis* et *nemorosae*. Jul.)  
d. *Uredo odontitidis*: aurantia inaequalis.  
(in foliis *Odontitidis rubrae*. Aug. Sept.)
20. *U. eglanteriae*: [*miniata*] miniato-aurantia  
effusa subrotunda, cespitulis oblongis subro-  
tundisque. (in foliis, petiolis, pedunculis, ca-

lycibusque Rosae caninae, centifoliae et Eglan-  
teria. Jun.)

21. *U. ulmariae*: [*spiraeae*] miniato - aurantia  
elongata bullatim prorumbens. (in foliis Spiraeae  
Ulmariae. Mai. Jun.)

22. *U. rosae*: [*centifoliae*] flavo - rubens conferta,  
basi plana effusa, cespitulis orbicularibus. (in  
foliis Rosae centifoliae. Jul. Aug.)

23. *U. idaei*: [*gyrosa*] flava subconica sparsa,  
disco foliorum gyrose rupta. (in foliis Rubi  
Idaei. Mai. Jun.)

24. *U. populi*: [*ovata*] fulva minuta globulosa  
aperta. (in foliis Populi nigrae et tremulae.  
Sept. Oct.)

25. *U. betulae*: [*betulina*] lutescens conferta in-  
aequalis bullata minuta rotunda clausa. (in fo-  
liis Betulae albae. Jul. Aug.)

26. *U. epilobii*: [*pustulata*] flavescens subrotun-  
da minuta prominula clausa, in glomerulos  
collecta. (in foliis Epilobii montani et tetragoni.  
Jul. Aug.)

27. *U. cerastii*: flava conferta minuta subrotunda  
prominula clausa, in glomerulos collecta. (in  
foliis Cerastii vulgati. Jul. Aug.)

28. *U. vaccinii*: [*myrtilli*] ochrea conferta mi-  
nuta in glomerulos collecta subrotunda clausa,  
demum aperta. (in foliis Vaccinii uliginosi et  
Myrtilli. Aug.)

29. *U. ledi*: sparsa aggregata miniato - aurantia  
subcylindrica, pulvere laxo. (in foliis adhuc  
virentibus Ledi palustris. Mai. Jun.)

\*\*\* *Pulvere obscuro* [NIGREDO]

30. *U. fabae*: [*viciae*] fusco-spadicea conferta orbicularis subeffusa depressa. (in foliis cauleque Viciae Fabae et sativae. Aug. Sept.)
  31. *U. betae*: [*cincta*] sparsa orbicularis, pulvere cinnamomeo epidermide alba cincto. (in foliis Betae vulgaris. Sept. Oct.)
  32. *U. menthae*: pallide fuscescens sparsa orbicularis planiuscula. (in foliis Menthae arvensis, austriacae et sylvestris. Sept. Oct.)
  33. *U. convolvuli*: [*polygoni*] dilute cinnamomea sparsa orbicularis convexa (in foliis Convolvuli arvensis et Polygoni Convolvuli. Sept. Oct.)
  34. *U. conii*: [*nitida*] conferta irregularis ferrugineo - spadicea, capsulis oblongis. (in foliis petiolisque Conii maculati. Aug. Sept.)
  35. *U. oreoselini*: [*bullata*] bullatim prorumpens spadicea, capsulis ovato-oblongis caudatis. (in foliis Athamantae Oreoselini. Jul. Aug.)
  36. *U. suaveolens*: [*serratulae*] dilute fusco-purpurea confluens inaequalis odorata. (in foliis Serratulae et Cnici arvensis. Mai. Jun.)
  37. *U. trifolii*: [*apiculata*] sparsa punctiformis cinnamomea; capsulis globosis mucronatulis. in foliis exsiccatis Trifolii arvensis, hybridi et montani. Jul. Aug.)
- b. Uredo arctii*: [*bardanae*] acervulis crebrioribus, modo minoribus modo majoribus. (in foliis Arctii Lappae et Bardanae. Aug. Sept.)



- c. Uredo violae*: colore laetiore in flavum vergente. (in foliis Violae caninae et palustris. Jul. Aug.)
38. *U. phaseoli*: [appendiculata] badia subconfluens conferta pulvinata inquinans. (in foliis Phaseoli vulgaris. Aug. Sept.)
39. *U. pisi*: sparsa inaequalis dilute fusco-purpurea planiuscula. (in foliis stipulisque Pisi sativi. Jul. Aug.)
40. *U. genistae*: sparsa subrotunda clausa dilute badia; capsulis globosis, cauda incurvata. (in foliis Genistae tinctoriae. Sept. Oct.)
41. *U. segetum*: [*Lycoperdon tritici*] pulvere copioso fusco-nigro inquinante. Jun. Jul.)
- a. Uredo hordei*: subclausa. (in Hordeo disticho et vulgari.)
- b. Uredo tritici*: effusa. (in Tritico aestivo et hyberno)
- c. Uredo avenae*: in glumis latens. (in Avena sativa.)
- d. Uredo panici*: effusa magna. (in Panico miliaceo. Jun. Jul.)
42. *U. decipiens*: pulvere compacto nigro.
- a. Uredo graminum*: (in Agrostide vulgari et Panico glauco. Mai. Jun.)
- b. Uredo caricis*: in Carice brizoide, pilulifera, praecoci, stellulata, aliisque. Mai.)
43. *U. violacea*: [*saponariae*] pulvere purpureo-violaceo (in antheris florum Saponariae officinalis. Aug.)

83. TRICHODERMA. Dermatocarpus, gymnospermus. Pulvis copiosus, farinaceus, tegmine tomentoso seu villosio cinctus.

1. *T. viride*: [*Sphaeria olivacea*] subrotundum effusum, pulvere viridi, villo albido fugaci. *Tode fung.* I. t. 3. f. 29. (ad ramulos deciduos, aut in caulibus herbarum majorum, post pluvias. Oct.)
2. *T. tuberculatum*: candidum suborbiculare, primo tomentosum, demum tuberculosum, pulvere cinereo. *Pers. mycol.* I. t. 2. f. 8. (in sylvis umbrosis, post crebras pluvias, ad terram nudam. Aestate.)

84. CYATHUS. Dermatocarpus, sarcospermus. Peridium infundibuliforme aut cupulare coriaceum, drimo epiphragmate clausum, vesiculis lentiformibus repletum.

1. *C. striatus* [*Nidularia hirsuta*] hirsutus spadicus interne striatus. *Bolton.* t. 102. f. 2. (in locis sylvaticis humidis, ad ramulos dejectos, radices emortuas, et inter folia putrescentia. Sept. Oct.)
2. *C. lentiferus*: [*Nidularia vernicosa*] externe cinereus aut fuscescens subtomentosus, interne laevis plumbeo - lividus. *Bull. champ.* t. 488. f. 1. (ad asseres, inter ligna putrida. Mai. Sept.)

## F U N G I.

85. PHALLUS. Lytothecius. Volvatus. Pileus oratus stipitatus, hymenio reticulato liquescente.

1. *P. impudicus*: volvatus stipitatus, pileo celluloso. *Fl. dan.* t. 175. (in sylvarum frondosarum umbra. Jun. Sept.)

86. AMANITA. Hymenothecia. Volvata. Hymenium lamellosum.

1. *A. livida*: [*Agaricus plumbeus*] pileo planiusculo umbonato striato plumbeo-livido, lamellis stipiteque longo candidis. *Fl. dan.* t. 1014. (ad margines sylvarum frondosarum, aut in pinetis, post diurnas pluvias. Jun. Aug.)

2. *A. virgata*: [*Agaricus volvaceus*] cespitosa, pileo campanulato conico piloso cinereo nigroque virgato, lamellis pulverulentis rubro-cinnamomeis. *Bull. herb.* t. 261. (in vaporariis, inter pulverem coriarium. Jul. Aug.)

3. *A. muscaria*: [*Agaricus imperialis*] pileo aurantiaco - rubro nitido planiusculo, verrucis lamellis stipiteque candidis. *Fl. dan.* t. 1129. (in sylvis et pinetis. Jul. Oct.)

87. AGARICUS. Hymenothecius. Evolvatus. Hymenium lamellosum.

A. LEPIOTA: lamellis arescentibus, stipite annulato.

1. *A. squarrosus*: [*floccosus*] cespitosus, pileo carnoso stipiteque squarroso-squamoso ochraceis, lamellis olivaceo-pallidis confertis. *Fl. dan.* t. 491. (ad caudices quercinas. Sept. Oct.)

2. *A. caudicinus*: [*mutabilis*] cespitosus, pileo subcarnoso umbonato glabro cinnamomeo, lamellis subdecurrentibus pallide ferrugineis,

stipite squamoso subtenui cylindrico *Fl. dan.* t. 1008. (ad truncos putrescentes. Sept. Oct.)

B. *CORTINARIA*: *lamellis demum cinnamomeis, stipite cortinato s. velo in fila araneosa soluto.*

3. *A. violaceus*: stipitatus, pileo rimoso: margine violaceo tomentoso, stipite caerulescente: lana ferruginea. *Mich. gen.* t. 74. f. 1. (ad margines sylvarum. Sept. Oct.)

4. *A. vaccinus*: [*rufus*] gregarius, pileo carnosio hemisphaerico umbonato piloso-squamoso rufo, lamellis albis pallescentibus, stipite cavo longo subfibrilloso. *Pers. ic. et descr.* t. 2. f. 1. 2. 3. 4. (in pinetis. Aug. Sept.)

5. *A. croceus*: [*cinnamomeus*] gregarius minor, pileo subcarnoso umbonato subtomentoso fulvo-cinnamomeo opaco, lamellis flavo-croceis, stipite subtenui fibrilloso lutescente: cortina fugaci. *Batsch.* t. 23. f. 117. (in pinetis. Sept.)

C. *GYMNORUS*: *lamellis unicoloribus arescentibus, stipite nudo.*

6. *A. pratensis*: [*miniatus*] fulvo-rubescens subdurus, pileo campanulato seu obtuse umbonato glabro, lamellis crassis distantibus decurrentibus, stipite brevi subtenui deorsum attenuato. *Fl. dan.* t. 715. (in pratis, pascuis, collibusque herbidis. Sept. Oct.)

7. *A. fastibilis*: [*lateritius*] cespitosus, pileo carnosio lateritio-rufi aut pallido opaco flexuoso, lamellis aquose cinnamomeis, stipite

crasso fibrilloso albido. *Batsch.* t. 33. f. 195.  
(in sylvis et pinetis. Sept. Oct.)

8. *A. coccineus*: gregarius, totus coccineus, pileo submembranaceo convexo subviscoso, lamellis distantibus dentatim connexis, stipite cavo subcompresso. *Bull. herb.* t. 570. f. 2. (in pratis et pascuis colliculosis. Sept. Oct.)

9. *A. hortensis*: cespitosus elasticus, pileo subhemisphaerico planiusculo obsolete umbonato fuligineo subnigrescente, lamellis subdecurrentibus subcontortis albidis, stipite subundulato deorsum incrassato. (in hortis et sylvis. Aug. Sept.)

D. MYCENA: *tenelli* pileo striato subpellucido, lamellis unicoloribus, stipite elongato fistuloso.

10. *A. hypnorum*: tenerrimus parvus totus ochraceo-ferrugineus, pileo campanulato sulcato, lamellis distantibus latiusculis, stipite mediocri. *Batsch.* t. 19. f. 96. (inter muscos, praesertim hypna, post largas pluvias. Sept. Oct.)

11. *A. vulgaris*: gregarius confertus parvus, pileo papillato demum subumbilicato subviscoso-cinereo, lamellis albidis uncinatis, stipite viscoso crassiusculo. *Fl. dan.* t. 830. f. 2? (in pinetis post pluvias largas. Sept. Oct.)

E. COPRINUS: pileo membranaceo fugaci, lamellis nigrescenti-liquescens, stipite subalbido.

12. *A. fimetarius*: [comatus] gregarius, pileo conico squamoso albido: squamis flavescentibus,

lamellis congestis primo albido-purpurascentibus, stipite longissimo: annulo mobili. *Fl. dan.* t. 834. (in locis graminosis, ad sepes, in hortis. Sept.)

13. *A. plicatus*: cespitosus, pileo campanulato plicato fuscescente-cinereo, apice squamuloso, margine demum revoluta, lamellis confertis latis primo purpurascente-fuscis pruinatis *Sowerb.* t. 188. (in pagis, ad sepes, in pratis. Sept.)

14. *A. ferrugineus*: [*lignorum*] cespitosus, pileo campanulato sulcato ferrugineo, lamellis nitentibus primo roseis, dein cinereis, tandem nigrescentibus. *Fl. dan.* t. 1070. (in hortis et sylvis, ad truncos. Sept. Oct.)

15. *A. vitellinus*: fragilis, pileo viscido dilute vitellino, lamellis distinctis argillaceis, stipite fistuloso farinaceo pulverulento nudo. (in fimento equino gregarie. Mai)

16. *A. disseminatus*: congestus parvus fugax, pileo semiovali striato-plicato, primum subochraceo, dein griseo: lamellis distinctis semiadnexis albido-fuscescentibus, stipite ut plurimum incurvo. *Schäff. fung.* t. 308. (in salicum truncis cavis. Jul. Sept)

17. *A. domesticus*: pileo campanulato obtuso undulato sulcato fuligineo: squamulis furfuraceis, lamellis confertis linearibus, primo caesio-rubris, dein brunneis nigricantibus. (in domiciliis ad muros humidos. Aug. Sept.)



18. *A. ephemerus*: gregarius minor, pileo campanulato demum partito striato glabro subcinereo: disco rufescente, stipite longo! glabro. *Bull. herb.* t. 542. f. 1. d. (in stercoreariis. Sept. Oct.)

F. PRATELLA: pileo persistente, lamellis nebulosis aquosis, pulvere seminali demum obscurioribus.

19. *A. campestris*: pileo carnosoplaniusculo rufo squamoso, lamellis rubescente-fuscis, stipite brevi: annulo incompleto. *Fl. dan.* t. 714. (in pratis et pascuis colliculosis, cultis stercoreatis, fimetisque. Sept. Oct.)

20. *A. gracilis*: [*cuspidatus*] pileo membranaceo campanulato acuto mollissimo incarnato ochraceo, lamellis nigrescenti-cinereis, stipite longissimo glabro. *Bolton.* t. 66. (in sylvaticis, inter folia. Sept. Oct.)

G. LACTIFLUUS: pileo subdepresso, lamellis lactescentibus.

21. *A. piperatus*: pileo infundibuliformi, margine expanso glabro albido, lamellis congestis furcatis candidis pallescentibus. *Fl. dan.* t. 1132. (in sylvis umbrosis. Sept. Oct.)

22. *A. deliciosus*: [*Lactarius lateritius*] pileo umbilicato subaurantio: exsiccato sordide pallido, lamellis succoque aurantio-lateritiis. *Fl. dan.* t. 1131. (in pinetis arenosis. Sept. Oct.)

23. *A. ruber*: [*lactifluus*] gregarius majusculus, pileo depresso ochraceo-rubro, lamellis flavescentibus, stipite crassiusculo, pileo conco-

lore. Schöff. fung. t. 5. (in pinetis. Sept. Oct.)

H. RUSSULA: pileo carnosio subdepresso, lamellis arescentibus, stipite nudo subalbido.

24. *A. rosaceus*: pileo convexo-plano sublaevi roseo seu diluto rubro, lamellis stipiteque albis. *Fl. dan.* t. 1009. (in sylvis frondosis acerosis. Sept. Oct.)

25. *A. ochroleucus*: pileo flavescente planiusculo, margine laevi, lamellis stipiteque albis. *Fl. dan.* t. 830. f. 1. (in sylvis abietinis. Sept. Oct.)

I. OMPHALIA: pileo umbilicato infundibuliformi, lamellis exsuccis subdecurrentibus, stipite nudo.

26. *A. gilvus*: [infundibuliformis] gregarius submagnus flavo-ferrugineus nitidus, pileo infundibuliformi rigido margine reflexo, stipite crasso subtuberoso. *Fl. dan.* t. 1011. (in sylvis abietinis gregarie. Sept.)

27. *A. androsaceus*: [perforans] gregarius persistens, pileo planiusculo subplicato albido obsolete umbonato, lamellis simplicibus totis annexis, stipite nigrescente-badio. *Fl. dan.* t. 1134. (in pinetis supra folia abietina. Mai. Sept.)

K. PLEUROPUS: pileo dimidiato, stipite nudo laterali aut nullo.

28. *A. mollis*: gregarius mollis, pileo glabro gibboso pallido, lamellis aquose cinnamomeis.

*Schäff. fung. t. 213.* (ad truncos cariosos. Sept. Oct.)

29. *A. sepiarius*: [*hirsutus*] coriaceus durus utrinque planus, pileo strigoso-tomentoso spadiceo, laminis confertis ramosis lutescentibus *Schäff. fung. t. 76.* (ad truncos et in sepibus pineis. Aug. Sept.)

88. *MERULIUS*. *Hymenothecius*. Hymenium venosum, venis superficialibus tumidulis.

1. *M. Cantharellus*: [*Agaricus Cantharellus*] gregarius, totus vitellinus, pileo carnoso glabro depresso. *Fl. dan. t. 264.* (in nemoribus et sylvis. Sept. Oct.)

2. *M. cornucopodioides*: [*Peziza cornucopodioides*] cespitosus nigrescens, pileo membranaceo squamuloso: venis obsolete. *Fl. dan. t. 384.* (in sylvaticis. Sept. Oct.)

3. *M. Vastator*: orbicularis adultus aureus, venis crispis centrum versus in plicas abeuntibus: tuberculis intus albis ut plurimum aggregatis caulescentibus intermediis. *Tode in Abhandl. d. Hall. nat. Ges. I. t. 2. f. 1. 2. 3. 4.* (in aedificiis, locis suffocatis aut humentibus, in ligno humido, alburno. Mai. Sept.)

89. *DAEDALEA*. *Hymenothecia*. Hymenium sinibus poriformibus reticulatum.

1. *D. quercina*: [*Agaricus quercinus*] coriacea ligneo-pallens, pileo ruguloso glabro, laminis ramoso-sinuatis: sinulis magnis. *Sowerb. fung. t. 181.* (ad Quercuum truncos. Sept.)

2. *D. suaveolens*: [*Boletus suaveolens*] coriaceo-suberosa sessilis glabra ex niveo subfulva, carne stramineo-fuliginea: tubis longissimis subrufidis. *Bull. champ.* t. 310. (super *Salicum annosarum* truncos. Mai. Jun.)

90. *BOLETUS*. *Hymenothecius*. *Hymenium* tubulis porosum.

1. *B. subtomentosus*: [*communis*] pileo convexiusculo pulvinato subtomentoso sordide ferrugineo, poris ingentibus. *Bolt. fung.* t. 87. (in nemorosis. Sept. Oct.)

2. *B. piperatus*: [*gregarius*] pileo flexuoso cinnamomeo, poris majusculis convexis rufo-ferrugineis, stipite basi intusque flavo. *Fl. dan.* t. 1018. (in pinetis. Sept. Oct.)

3. *B. edulis*: [*bulbosus*] pileo pulvinato latissimo fuscescente-vaccino; carne immutabili; poris primo farctis albidis, dein dilute flavis, stipite tuberoso subventricosus reticulato rufescentecinereo. *Bull. herb.* t. 494. (in sylvis, pinetis et ericetis. Sept. Oct.)

4. *B. perennis*: [*fimbriatus*] coriaceus tenax cinnamomeus, pileo tenui zonato velutino. *Fl. dan.* t. 1075. (in sylvis arenosis ad truncos. Sept. Oct.)

5. *B. badius*: [*durus*] subcespitosus, pileo glabro tenace castaneo, margine pallidiore, poris minutis pallidis, stipite laterali crasso fusco. *Fl. dan.* t. 1075. f. 1. (in sylvaticis, ad *Salices* cavas. Sept. Oct.)

6. *B. suberosus*: [*salicinus*] odoratus crassus suberosus supra tomentosus albus, poris majusculis pallidis. *Bolt. fung. t.* 162. (ad *Salices annosas*. Oct. Nov.)
7. *B. igniarius*: dilatatus laevis, epidermide rugulosa, supra castaneo - aurantiacus, subtus ochroleucus. *Fl. dan. t.* 953. (ad *Abietum truncos caesos*. Sept. Oct.)
8. *B. betulinus*: substipitatus majusculus, pileo carnosus - suberoso reniformi fuligineo - rufescente, subtus albido. *Bull. champ. t.* 312. (ad caudices *Betulae albae*. Aug. Sept.)
9. *B. Medulla panis*: candidus limitatus crustaceus effusus, poris minutis brevibus. *Bolt. fung. t.* 166. f. a. (ad ligna fabrefacta, e. g. januas vetustas hortorum; tunc in sylvis ad truncos aridos. Sept.)
10. *B. versicolor*: caespitosus acaulis coriaceus, pileo tenui zonato multicolore caeruleo tomentoso - sericeo, poris albis. *Bolt fung. t.* 81. (ad truncos aridos Sept. Nov.)

91. SISTOTREMA. Hymenothecium. Hymenium primum gyroso-porosum, dein dentibus difformibus lacerum.

1. *S. cinereum*: [*Boletus unicolor*] imbricatum suberosum, pileo dimidiato hirsuto subtus cinereo. *Bull. champ. t.* 501. f. 3, (ad truncos. Sept. Oct.)
2. *S. quercinum*: [*Hydnum candidum*] resupinatum glabrum pallidum subrufescens, dentibus crassis difformibus incisiss subadpressis. *Willd.*

in bot. Mag. I. 4. t. 7. (in ramis exsiccatis Quercorum, Pinuumque. Sept. Oct.)

92. HYDNUM. Hymenothecium. Hymenium echinatum seu in dentes subuliformes integros prominens.

1. *H. imbricatum*: pileo carnoso umbilicato umbrino squamoso, squamis erectiusculis crassis obscurioribus. *Fl. dan.* t. 176. (in pinetis et sylvaticis montosis. Sept. Oct.)
2. *H. repandum*: pileo rugoso flexuoso sublobato glabro pallide incarnato seu flavido, stipite tuberoso subexcentrico. *Fl. dan.* t. 310. (in sylvaticis. Sept. Oct.)
3. *H. auriscalpium*: stipitatum spadiceum, pileo dimidiato coriaceo. *Fl. dan.* t. 1020. (ad terram in strobilis Pini sylvestris. Mai. Oct.)
4. *H. ferrugineum*: [tomentosum] effusum tomentosum ferrugineum. *Schrad. nov. gen. pl.* t. 4. f. 3. (intra corticem et lignum, vel ad latera ramorum aridorum. Sept. Oct.)

93. THELEPHORA. Hymenothecia. Hymenium dilatatum uniforme subpapillosum.

1. *T. terrestris*: [mesenteriformis] subimbricata obscura fusca, pileo dimidiato applanato fibroso-strigoso. *Willd. flor. berol.* t. 7. f. 15. (in pinetis sabulosis. Sept.)
2. *T. ferruginea*: [*Auricularia tabacina*] effuso-reflexa fusco-ferruginea, pileo tenui subtomentoso laeviusculo subtus piloso. *Fl. dan.* t. 1198. (ad ramos dejectos, colore pulveris tabacini. Sept.)



3. *T. hirsuta*: [*Auricularia reflexa*] cespitosa coriacea lutescens strigoso-hirsuta subtus glabra. *Fl. dan.* t. 950. (ad truncos et palos. Sept. Oct.)
  4. *T. purpurea*: [*mesenterica*] imbricata subtre-mellosa zonata tomentosa albida, subtus purpurea. *Mich. gen.* t. 66. f. 4. (ad truncos, praesertim Populi tremulae, putrescentes. Sept.)
  5. *T. quercina*: [*carnea*] resupinata effusa coriacea rugulosa rimulosa carnea, margine subinvoluta subtusque umbrino. *Bull. champ.* t. 436. f. 1. (in ramis quercinis aridis. Sept.)
  6. *T. papyracea*: [*laevis*] resupinata albido-carnea, late effusa laevisissima, margine byssino. (ad ramos aridos varios, praesertim populneos. Sept.)
  7. *T. incrustans*: terrestris resupinata subcarnosa rugoso-tuberculata pallida, subtus ferruginea tomentosa. (in locis sylvaticis! supra terram, folia et ramos effusa, post pluvias. Aug. Sept.)
94. CLAVARIA. Dermatothecia. Clavula simplex seu ramosa, cum stipite brevi cauleve crassiusculo confluens.
1. *C. corniculata*: [*furcata*] subramosa flava, caule gracili elongato furcatim subdiviso, ramulis acutis. *Fl. dan.* t. 775. f. 3. et t. 836. f. 2. (in sylvis ad terram. Jul. Sept.)
  2. *C. viscosa*: [*flammea*] subramosa vitellina viscosa tenax, ramis ramulisque furcatis, caule tenui radicato. *Schäff. fung.* t. 174. (in pinetis ad truncos. Jul. Oct.)

3. *C. pistillaris*: simplex solitaria magna clavata aurantiaca vel cinnamomea apice rotundo. *Fl. dan.* t. 1255. (in sylvaticis. Sept. Oct.)

95. GEOGLOSSUM. Dermatothecium. Clavula carnosae compressae, margine prominente stipiti contigua.

1. *G. hirsutum*: [*Clavaria ophioglossoides*] subfasciculatum hirsutum nigrum. *Schmid. icon.* t. 25. f. 1. — 19. (in sylvis et pratis gregarie. Sept. Oct.)

96. HELVELLA. Dermatothecia. Pileus membranaceus inflatus difformis utrinque deflexus.

1. *H. Mitra*: [*sulcata*] pileo inflato lobato, demum sublibero livido-nigrescente, stipite sulcato-lacunoso albicante. *Fl. dan.* t. 116. (in pinetis, ad terram. Sept. Oct.)

2. *H. brunnea*: [*insula*] pileo inflato laevi brunneo, stipite subtomentoso laevi. *Schäff. fung.* t. 159. (in sylvaticis montosis, ad truncos abietinos. Sept.)

97. MORCHELLA. Dermatothecia. Pileus elongatus teres, areolis lacunosus.

1. *M. esculenta*: [*Phallus esculentus*] pileo basi contracto brunneo-fuligineo, stipite fistuloso albo-pulverulento. *Fl. dan.* t. 53. (in sylvis montosis. Mai. Jun.)

98. TREMELLA. Dermatothecia. Effusa, gelatinosa, hyalina, plicato-gyrosa. Pileus plerumque distinctus nullus.

1. *T. mesenterica*: subcompacta plicato-undulata aurantiaca. *Jacqu. austr. I. t. 13.* (ad ramos dejectos. Mai.)
  2. *T. spiculosa*: [arborea] applanata effusa crassiuscula nigra, papillis conicis aspera. *Fl. dan. t. 884.* (ad truncos. Sept. Oct.)
  3. *T. Auricula*: [*Peziza Auricula*] cespitosa tenuis flexuosa concava nigrescens, subtus plicata cinerea tomentosa. *Bolt. fung. t. 107.* (ad truncos Sambuci nigrae. Jul. Aug.)
  4. *T. caraganae*: minor tenerior subcarnosa carneo-rufa. *Bull. herb. t. 427. f. 11?* (ad caudices Robiniae Caraganae. Jul. Aug.)
  5. *T. juniperina*: sessilis magna membranacea subgelatinosa auriformis fulva. *Vill. dauph. III. t. 56.* (ad ramos juniperinos. Mai. Jun.)
  6. *T. ustulata*: exigua vesiculosa gelatinoso-carnosa fusco-nigricans, superficie flexuoso-sulcata. *Bull. champ. t. 420. f. 2.* (in fructibus carnosus putrescentibus. Aug. Oct.)
  7. *T. abietina*: [miliaria] gregaria subrotunda aurantiaca subplicata. (ad ligna dejecta abietina. Jul. Sept.)
  8. *T. urticae*: [sepincola] gregaria minuta subrotunda oblonga laevis flavo-rubra. (ad caules aridos Urticae dioicae. Mai.)
99. PEZIZA. Dermatothecia. Receptaculum hemisphaericum,  $\frac{1}{2}$  concavum. Hymenium thecis spermatophoris farctum.
1. *P. inquinans*: [*Octospora elastica*] gregaria magna atro-inquinans, demum conevxa, ob-

- conica, extus rugosa sumbumbrina. *Fl. dan.* t. 464. (ad caudices caesos, praesertim quercin-  
nos. Sept. Nov.)
2. *P. sarcoides*: [*Octospora carnea*] cespitosa sub-  
carnosa firmula carneo-rubra, externe subve-  
nosa. *Fl. dan.* t. 1017. (ad ramos aridos subpu-  
tridos. Sept. Oct.)
3. *P. aurea*: congesta minuta subsessilis pla-  
niuscula fulva nitida. (ad arborum truncos in  
sylvis. Sept. Oct.)
4. *P. stercorea*: [*Octospora scutellata*] gregaria  
sessilis concava tota fulva setosa, setis badiis  
suberectis. *Bolt. fung.* t. 108. (in fimo equino.  
Jul. Aug.)
5. *P. papillata*: minutissima rubescens, disco  
papillata, margine ciliata. (in fimo vaccino.  
Sept. Oct.)
6. *P. rosae*: [*Myrothecium hispidum*] sparsa ses-  
silis, cupulis concavis siccis spadiceis subto-  
mentosus, tomento concolore insidentibus. *To-  
de fung.* I. t. 5. f. 41. (in ramis aridis Rosae ca-  
ninae. Mai.)
7. *P. cyathoidea*: [*Octospora albidula*] gregaria  
parva albida, cupula cyathiformi nuda tenui,  
stipite subfiliformi. *Batsch. fung.* t. 27. f. 151.  
(in caulibus exsiccatis herbarum majorum. Aug.  
Sept.)
8. *P. citrina*: conferta tota citrina, stipite crasso  
brevis obconico. *Hedwig.* t. 8. f. B. (in sylvis,  
ad truncos et ramos exsiccatos. Sept. Oct.)

9. *P. lenticularis*: [flava] convexa adpressa subconnexa laete flava, stipite vix ullo papillaeformi nigrescente. *Bull. champ.* t. 300. f. a. b. c. (ad ramos dejectos Ulmorum. Oct.)

10. *P. granulosa*: [scabra] exigua gregaria aurantio-rubra planiuscula, subtus granuloso-rugosa. *Bull. champ.* t. 438. f. 3. (super ster-  
cus vaccinum. Sept. Oct.)

11. *P. Patellaria*: [*Lichen atratus*] gregaria nigra applanata subcoriacea distincte marginata. *Hedwig.* t. 21. f. A. in ramis aridis Tiliarum. Sept.)

12. *P. radiata*: [*Sphaerobolus rosaceus*] immersa parva stipitata exalbida, margine setaceo-radiata. *Fl. dan.* t. 1016. (ad ligna, ramos, caulesque herbarum aridas. Sept.)

100. ASCOBOLUS. Dermatothecius. Receptaculum subcupulaeforme, hemisphaericum, carnosum. Thecae manifestae, prominentes, humore sporulisque [octonis plerumque] refertae.

1. *A. furfuraceus*: [*Peziza stercorearia*] gregarius subconcavus fuscus aut virescens, externe furfuraceus. *Bull. champ.* t. 376. (in pratis, super ster-  
cus vaccinum. Oct.)

101. HELOTIUM. Dermatothecium. Receptaculum capituliforme, convexo-hemisphaericum utrinque laeve.

1. *H. galeatum*: [*Acrospermum galeatum*] gregarium subtremellosum carneo-fuliginenum fuscum: capitulo subalbicante. *Fl. dan.* t. 1100. f. 3. (in uliginosis ad ramulos dejectos. Oct.)

102. *STILBUM*. Dermatothecium. Capitulum stipitatum, subrotundum, subaquosum, dein compactum.

1. *S. rigidum*: gregarium, stipite rigido persistente nigro crassiusculo, capitulo subrotundo primum aquoso lacteo, demum griseo compacto deciduo. *Pers. in Uster. Annal.* II. t. 2. f. 2. (in truncis putrescentibus. Mai.)
2. *S. vulgare*: capitulo sphaerico, stipite cylindrico crassiusculo. *Tode fung.* I. t. 2. f. 16. (ad caudices semiputridas. Sept. Oct.)

## B Y S S I.

103. *ISARIA*. Subbyssoides, simplex, ramosa, molliuscula, alba, pulvere farinaceo oblecta.

1. *I. truncata*: [*Ramaria farinosa*] ramosissima, ramis truncatis crenulatis. (inter folia decidua, super larvas insectorum, nec non ad truncos caesos et radices. Sept.)
2. *I. mucida*: [*Byssus fruticulosa*] cespitosa effusa, ramulis subdepressis furcatis pruinatis molli-  
bus. *Fl. dan.* t. 718. f. 2. (ad ligna putrescentia. Jul. Oct.)

104. *BOTRYTIS*. Erecta, fruticulosa, dichotoma. Sporulae in racemum conglomeratae.

1. *B. cinerea*: congesta late effusa ramosa cinerea. *Disp. fung.* t. 3. f. 9. (in *Curcubitis* putrescentibus et ad caules *Brassicae oleraceae*. Aug. Sept.)



105. **MONILIA.** Fila moniliformia seu articulata, stipitata vel effusa.

1. *M. glauca*: [*Mucor glaucus*] cespitosa cinereo-glauca. *Fl. dan.* t. 777. f. 2. et t. 480. f. 3. (in fructibus putrescentibus. Omni tempore.)
2. *M. digitata*: [*Mucor penicillatus*] glauca, stipite simplici digitato. *Bull. champ.* t. 504. f. 11. (in variis corporibus putrescentibus. Omni tempore.)
3. *M. fructigena*: cespitulo subrotundo cinereo-albido: filorum articulis ovatis. (in fructibus putridis, praesertim Pyri communis. Omni tempore.)

106. **DEMATIUM.** Fila brevia erecta aut depressa, cespitosa aut fasciculata.

1. *D. ciliare*: [*Hypoxylon ciliare*] subsparsum atrum, filis subbulbosis confertis simplicibus longis filiformibus. *Bull. champ.* t. 46. f. 1. (ad ramos exsiccatos. Aug. Sept.)
2. *D. epiphyllum*: erectum fasciculatum olivaceum demum pulveraceum filis intertextis. (in foliis deciduis aridis. Sept. Oct.)
3. *D. ollare*: effusum sericeo-fulvum 'mollissimum. *Mich. gen. pl.* t. 90. f. 4. (in ollis vaporariorum totam terrae superficiem incrustans. Aug. Sept.)
4. *D. violaceum*: [*Byssus phosphorea*] cespitosum violaceo-caesium phosphoreum. (ad ligna exsiccata putrescentia. Jul. Aug.)
5. *D. virescens*: cespitosum laxum subfarinaeum, primo virens, dein sordide olivaceum

opacum. (ad ligna et ramos exsiccatos, in umbris sylvaticis. Mai.)

6. *D. salicinum*: epiphyllum effusum rubiginosum tenue. (in foliis Salicis capreae. Jul. Aug.)

107. *ERINEUM*. Fila rigida, grumosa, in cepitulum foliis adpressum conglomerata.

1. *E. acerinum*: [*Mucor ferrugineus*] depressum latiusculum rufo-fuscum. *Bull. champ.* t. 514. f. 12. (ad folia Acerum dejecta. Sept.)

2. *E. betulinum*: depressum effusum, primo sulphureo-purpureum, dein rufo-fuscum. (ad folia Betulae albae. Sept. Oct.)

3. *E. tiliaceum*: gregarium pulvinatum albidopallidum. (in foliis Tiliarum. Aug. Sept.)

4. *E. populinum*: cupulare immersum subgrumosum spadiceum. (in foliis Populorum. Sept. Oct.)

5. *E. alneum*: pulvinatum grumosum fulvo-ferrugineum. (ad folia Alni glutinosae. Aug. Sept.)

108. *RACODIUM*. Filamenta densissime intertexta pannum referencia.

1. *R. rupestre*: [*Byssus antiquitatis*.] compactum nigrum erectiusculum subramosum. *Dillen. musc.* t. 1. f. 18. (in muris et saxis arenariis. Omni tempore.)

2. *R. cellare*: [*Byssus mollissima*] late expansum mollissimum nigrum simplex. *Mich. gen.* t. 39. f. 9 (in cellis vivariis, ad dolia. Omni tempore.)

109. HIMANTIA. Filamenta villosa ramoso-fibrosa.

1. *H. thermarum*: [*domestica*] maxima subviolaceo-fuscescens mollis, in membranam cohaerens. (in domibus ligneis uvidis, praesertim in balneis publicis nostris. Omni tempore.)
2. *H. candida*: [*Byssus candida*] tenera candida; apice subplumoso dilatato. *Dillen. musc. t. 1. f. 15.* (intra folia decidua putrescentia. Aug. Oct.)

110. RHIZOMORPHA. Filamenta ramosa repentia solida, medulla villosa farcta.

1. *R. subcorticalis*: [*Clavaria phosphorea*] compressa ramosa fusco-nigricans. *Fl. dan. t. 713.* (ad truncos exsiccatos inter corticem et lignum. Sept. Oct.)
  2. *R. setiformis*: [*Lichen setosus*] filamentis capillaribus atris subramosis. *Rebent. t. 3. f. 12.* (in foliis acerosi dejectis. Sept.)
-

# I N D E X.

## A.

Abies.	172	cichoriarum.	225
Absinthium.	144	confortum.	224
Acanthium	142	cornutum.	223
Acer	69	crassum.	224
campestre.	69	ficariae.	224
laciniatum.	69	fuscum.	225
platanoides.	69	geranii.	224
tataricum.	69	grossulariae.	223
Acetosa.	65	leucospermum.	225
Acetosella.	66. 81.	punctatum.	225
Achillea.	151	ranunculi.	224
Millefolium.	151	rhamni.	223
Ptarmica.	151	rubellum.	223
Aconitum.	95	rumicis.	223
Lycoctonum.	95	tragopogi.	225
septentrionale.	94	tussilaginis.	224
Acorus.	61	Aegopodium.	56
Calamus.	61	Podagraria.	56
Acrospermum galeatum,	249	Aethusa.	54
Actaea.	91	Cynapium.	54
spicata.	91	Agaricus.	235
Acynos.	105	androsaceus.	240
vulgaris.	105	campestris.	239
Adoxa.	73	Cantharellus.	241
Moschatellina.	73	caudicinus.	235
Aecidium.		cinnamomeus.	236
anemones.	225	coccineus.	237
asperifolii.	224	comatus.	237
berberidis.	224	Coprinus.	237
bifrons.	224	Cortinaria.	236
cancellatum.	223	croceus.	236
candidum.	228	cuspidatus.	239

deliciosus.	239	Russula.	240
disseminatus.	238	sepiarius.	241
domesticus.	238	squarrosus.	235
ephemerus.	239	vaccinus.	236
fastibilis.	236	violaceus.	236
ferrugineus.	238	vitellinus.	238
fimeticus.	237	volvaceus.	235
floccosus.	235	vulgaris.	237
gilvus.	240	Agrimonia.	85
gracilis.	239	Eupatoria.	85
Gymnopus.	239	Agrostemma.	81
hirsutus.	241	alba.	81
hortensis.	237	Githago.	81
hypnorum.	237	Agrostis.	14
imperialis.	235	alba.	15
infundibuliformis.	240	arundinacea.	24
lactifluus.	259	canina.	15
lateritius.	256	compressa.	15
Lepiota.	235	gigantea.	15
lignorum.	258	hispida.	15
miniatus.	236	Spica venti.	14
mollis.	240	tenella.	14
mutabilis.	235	vulgaris.	14
Mycena.	237	Aira.	15
ochroleucus.	240	aquatica.	16
Omphalia.	240	caespitosa.	15
perforans.	240	canescens.	16
piperatus.	259	cristata.	15
Pleuropus.	240	flexuosa.	15
plicatus.	258	præcox.	16
plumbeus.	235	Ajuga.	99
Pratella.	239	alba.	99
pratensis.	236	carnea.	99
quercinus.	241	genevensis.	99
rosaceus.	240	lanata.	99
ruber.	239	pyramidalis.	99
rufus.	236	reptans.	99

<i>Alchemilla.</i>	31	<i>Blitum.</i>	169
<i>hybrida.</i>	31	<i>Amarella.</i>	49
<i>pubescens.</i>	31	<i>Anagallis.</i>	5
<i>vulgaris.</i>	31	<i>Andrameda.</i>	74
<i>Alectorolophus.</i>	106	<i>-calyculata.</i>	75
<i>Algae.</i>	203	<i>polifolia.</i>	74
<i>Alisma.</i>	66	<i>Androsace.</i>	35
<i>angustifolium.</i>	67	<i>septentrionalis.</i>	35
<i>lanceolatum.</i>	67	<i>Anemone.</i>	95
<i>Plantago.</i>	66	<i>nemorosa.</i>	95
<i>Alliaria.</i>	116	<i>Pulsatilla.</i>	94
<i>Allium.</i>	59	<i>ranunculoides.</i>	95
<i>carinatum.</i>	59	<i>sylvestris.</i>	95
<i>oleraceum.</i>	59	<i>violacea.</i>	95
<i>rotundum.</i>	59	<i>Anethum.</i>	55
<i>Schoenoprasum.</i>	60	<i>graveolens.</i>	55
<i>vineale.</i>	49	<i>Angelica.</i>	55
<i>Alnus.</i>	168	<i>Archangelica.</i>	55
<i>glutinosa.</i>	168	<i>sylvestris.</i>	55
<i>Aloides.</i>	178	<i>Anserina.</i>	89
<i>Alopecurus.</i>	13	<i>cana.</i>	89
<i>agrestis.</i>	13	<i>sericea.</i>	89
<i>bulbosus.</i>	14	<i>Anthemis.</i>	150
<i>geniculatus.</i>	13	<i>arvensis.</i>	150
<i>myosuroides.</i>	13	<i>Cotula.</i>	150
<i>pratensis.</i>	15	<i>tinctoria.</i>	151
<i>Alsine.</i>	57	<i>Anthoxanthum.</i>	8
<i>media.</i>	57	<i>odoratum.</i>	8
<i>Alyssum.</i>	113	<i>Anthriscus.</i>	50
<i>calycinum.</i>	113	<i>Anthyllis.</i>	123
<i>incanum.</i>	113	<i>Vulneraria.</i>	125
<i>sativum.</i>	113	<i>Antirrhinum Linaria.</i>	109
<i>Amanita.</i>	235	<i>minus.</i>	109
<i>livida.</i>	235	<i>Peloria.</i>	109
<i>muscaria.</i>	235	<i>Apargia.</i>	135
<i>virgata.</i>	235	<i>autumnalis.</i>	136
<i>Amaranthus.</i>	169	<i>hirta.</i>	136



<i>hispida.</i>	136	<i>Asarum.</i>	83
<i>incana.</i>	135	<i>europaeum.</i>	85
<i>Aparine,</i>	27. 29	<i>Ascobolus.</i>	249
<i>Apium.</i>	56	<i>furfuraceus.</i>	249
<i>dulce.</i>	56	<i>Asparagus.</i>	61
<i>graveolens.</i>	56	<i>officinalis.</i>	61
<i>Aquilegia.</i>	94	<i>Asperugo.</i>	35
<i>vulgaris.</i>	94	<i>procumbens.</i>	35
<i>Arabis.</i>	116	<i>Asperula.</i>	27
<i>italiana.</i>	116	<i>Aparine.</i>	1 27
<i>Arbutus.</i>	75	<i>odorata.</i>	27
<i>Uva ursi.</i>	75	<i>Aspidium.</i>	184
<i>Archangelica.</i>	53	<i>aculeatum.</i>	185
<i>Arctium.</i>	139	<i>cristatum.</i>	185
<i>Bardana.</i>	140	<i>Filix mas.</i>	185
<i>Lappa.</i>	139	<i>Oreopteris.</i>	184
<i>majus.</i>	139	<i>spinulosum.</i>	185
<i>minus.</i>	139	<i>Asplenium.</i>	186
<i>Arcyria.</i>	221	<i>Ruta muraria.</i>	186
<i>punicea.</i>	221	<i>Astragalus.</i>	128
<i>Arenaria.</i>	79	<i>glycyphyllos.</i>	128
<i>campestris.</i>	80	<i>Athamanta.</i>	51
<i>rubra,</i>	80	<i>Libanotis.</i>	51
<i>serpyllifolia.</i>	79	<i>Oreoselinum.</i>	52
<i>trinervia</i>	79	<i>sibirica.</i>	52
<i>urbana.</i>	80	<i>Athyrium.</i>	185
<i>Aristolochia.</i>	158	<i>Filix femina.</i>	185
<i>Clematitis.</i>	158	<i>fragile.</i>	185
<i>Artemisia.</i>	144	<i>molle.</i>	186
<i>Absinthium.</i>	144	<i>Atriplex.</i>	46
<i>campestris.</i>	144	<i>hastata.</i>	46
<i>rubra.</i>	145	<i>hortensis.</i>	46
<i>vulgaris.</i>	144	<i>patula.</i>	46
<i>Arundo.</i>	23	<i>Auricula.</i>	247
<i>Epigejos.</i>	23	<i>Auricularia reflexa.</i>	245
<i>Phragmites.</i>	23	<i>tabacina.</i>	244
<i>sylvatica.</i>	24	<i>Avellana.</i>	172

Avena.	23	radiata.	143
elatior.	17	tripartita.	143
fatua.	23	Bistorta.	71
pratensis.	23	Bistortae.	71
sativa.	23	Blitum.	4. 169
strigosa.	23	virgatum.	4
		Boletus.	242
		badius.	242
		betulinus.	243
		bulbosus.	242
		communis.	242
		durus.	242
		edulis.	242
		fimbriatus.	242
		gregarius.	242
		igniarius.	243
		Medulla panis.	243
		perennis.	242
		piperatus.	242
		salicinus.	243
		suaveolens.	242
		suberosus.	243
		subtomentosus.	242
		unicolor.	243
		versicolor.	243
		Bonus Henricus.	47
		Borago.	34
		alba.	34
		officinalis.	34
		Botrychium.	183
		Lunaria.	183
		rufaceum.	183
		Botrytis.	250
		cinerea.	250
		Bovista.	218. 219
		plumbea.	218
		Brassica.	117
B.			
Barbarea.	116		
Barbula.	192		
muralis.	192		
ruralis.	192		
subulata.	192		
unguiculata.	192		
Bardana.	140		
Bartramia.	194		
fontana.	194		
pomiformis.	194		
Beccabunga.	5		
Beckmannia.	14		
cruciaeformis.	14		
Behen.	77		
Berberis.	63		
asperma.	64		
vulgaris.	64		
Betonica.	103		
alba.	103		
officinalis.	103		
Betula.	171		
alba.	171		
Alnus.	168		
nana.	171		
pendula.	171		
Bidens.	143		
cernua.	143		
minima.	143		
pumila.	143		

campestris.	117	unguiculatum.	192
Napus.	117	Bunias.	111
Rapa.	117	orientalis.	111
Briza.	20	Bupthalmum salicinum.	148
media.	20		
Bromus.	21	Bursa pastoris.	112
arvensis.	22	Butomus.	73
giganteus.	22	umbellatus.	74
inermis.	22	Buxbaumia.	200
mollis.	22	aphylla.	200
multiflorus.	21	Byssi.	250
secalinus.	21	Byssus antiquitatis.	252
sterilis.	22	candelaris.	209
strigosus.	22	candida.	253
tectorum.	22	fruticulosa.	250
Bryum.	195	mollissima.	252
annotinum.	195	phosphorea.	251
apocarpum.	189	velutina.	204
argenteum.	195		
caespititium.	195	C.	
canescens.	190	Calamus.	61
capillare.	195	Calicium.	206
cuspidatum.	196	claviculare.	206
Dicksonii.	189	salicinum.	206
exstinctorium.	188	Calla.	67
fastigiatum.	190	palustris.	67
glaucum.	190	Callitriche.	3
heteromallum.	190	autumnalis.	3
lanceolatum.	189	cespitosa.	3
ligulatum.	196	intermedia.	3
purpureum.	190	minima.	3
roseum.	196	verna.	3
rurale.	192	Calluna.	70
scoparium.	190	hirsuta.	70
striatum.	192	vulgaris.	70
truncatum.	187	Caltha.	98
undulatum.	191	palustris.	98

Calyptratae.	187	nutans.	140
Campanula.	38	oleraceus.	142
bononiensis.	39	palustris.	141
Cervicaria.	40	serratuloides.	142
diffusa.	40	Carex.	160
glomerata.	39	acuta.	167
hirsuta.	40	ampullacea.	167
latifolia.	39	androgyna.	166
patula.	38	arenaria.	161
persicifolia.	39	bifurca.	167
rapunculoides.	39	brizoides.	162
Rapunculus.	39	caespitosa.	166
retundifolia.	38	canescens.	162
salviaefolia.	40	Chordorhiza.	161
tenuifolia.	38	ciliata.	164
Trachelium.	39	collina.	164
urticaefolia.	39	digitata.	164
Cannabis.	176	dioica.	161
sativa.	176	disticha.	161
Cantharellus.	241	Drymeja.	165
Caragana.	127	echinata.	163
Cardamine.	114	elegans.	166
amara.	115	elongata.	163
hirsuta.	114	ericetorum.	164
impatiens.	114	filiformis.	166
parviflora.	114	flava.	164
pratensis.	114	gracilis.	167
sylvatica.	114	hirta.	168
Cardiaca.	103	inflata.	167
Carduus.	140	intermedia.	161
acanthoides.	140	Lachenalii.	162
crispus.	140	leporina.	162
eriphorus.	141	limosa.	166
helenioides.	142	Linnaei.	161
heterophyllus.	141	montana.	164
lanceolatus.	141	multiformis.	163
marianus.	141	muricata.	162

nigra.	167	Centaureum.	42
ovalis.	162	Centunculus.	30
pallescens.	166	minimus.	30
paludosa.	167	Ceranium caespitosum.	204
panicea.	165	Cerastium.	82
paniculata.	163	aquaticum.	82
pilosa.	165	arvense.	182
pilulifera.	164	semidecandrum.	82
praecox.	162	vulgatum.	82
Pseudo - Cyperus.	165	Ceratophyllum.	169
pulicaris.	161	demersum.	170
remota.	163	Cerefolium.	54
rufa.	167	Cervicaria.	40
Schreberi.	162	Cetraria.	212
stellulata.	163	juniperina.	212
sylvatica.	165	Chaerophyllum.	54
uliginosa.	10	aromaticum.	55
vesicaria.	167	bulbosum.	54
vulpina.	162	sativum.	54
Carlina.	142	sylvestre.	54
vulgaris.	143	temulum.	54
Carota.	50	Chamaedrys.	6
Carpobolus.	217	Chamomilla.	150
Carum.	55	Chara.	158
Carvi.	55	gelatinosa.	204
Carvi.	55	vulgaris.	159
Carvifolia.	51	Chelidonium.	91
Castalia speciosa.	92	lanceolatum.	91
Cataria.	99	majus.	91
suaveolens.	99	quercifolium.	91
Caucalis.	50	Chenopodium.	47
Anthriscus.	50	album.	47
Centaurea.	152	Bonus Henricus.	47
Cyanus.	152	glaucum.	48
Jacea.	152	hybridum.	48
paniculata.	152	murale.	47
phrygia.	152	olidum.	48
Scabiosa.	152	polyspermum.	48

rubrum.	47	corniculata.	245
urbicum.	47	digitata.	212
viride.	47	flammea,	245
Vulvaria.	48	furcata.	245
Chironia.	42	Hypoxylon.	212
Centaurium.	42	militaris.	212
Cherdorhiza.	61	ophioglossoides.	246
Chrysanthemum,	149	phosphorea.	253
corymbosum.	149	pistillaris.	246
inodorum.	150	viscosa.	245
Leucanthemum.	149	Clematitis.	153
montanum	149	Clamadium.	193
sylvestre.	149	dendroides.	193
Chrysosplenium.	76	Clinopodium.	104
alternifolium.	76	variegatum.	104
Cicer.	127	vulgare.	104
Lens.	127	Cnicus.	141
macrospermum.	127	eriphorus.	141
Cichorium.	139	helenioides.	142
Intybus.	139	heterophyllus.	141
sativum.	139	lanceolatus.	141
variegatum.	139	oleraceus.	142
Cicuta.	53	palustris.	141
virosa.	53	serratuloides.	142
Circaea.	4	Comarum.	91
alpina.	4	palustre.	91
luteriana.	4	Conserva.	203
pubescens.	4	amphibia.	203
Cladonia.	207	aristata.	204
coccifera.	207	fluviatilis.	204
coccinea.	207	fentinalis.	203
gracilis.	207	furcata.	204
paschalis.	207	gelatinosa.	204
rangiferina.	208	glomerata.	204
uncialis.	207	muralis.	203
Clathrus turbinatus.	221	reticulata.	204
Clavaria.	245	vaginata.	203



velutina.	204	Crepis.	138
Conimu.	50	biennis.	138
maculatum.	50	sibirica.	137
Consolida.	93	tectorum.	138
Convallaria.	61	Cribraria.	221
bifolia.	30	vulgaris.	222
majalis.	61	Crista castrensis.	199
multiflora.	61	Crista galli.	106
Polygonatum.	61	Crus galli.	12
Convolvulus.	37. 73	Cucubalus.	77
arvensis.	37	bacciferus.	78
carneus.	37	Behen.	77
sepium.	37	pallidus.	78
Conyza.	146	tataricus.	78
squarrosa.	146	vicosus.	78
Coprinus.	237	Cuscuta.	31
Corallorhiza.	157	europaea.	31
Coreopsis Bidens.	143	vulgaris.	31
Coriandrum.	54	Cyanus.	152
sativum.	54	Cyathus.	231
Cornicularia.	208	lentiferus.	231
islandica.	208	striatus.	231
spadicea.	208	Cymbidium.	157
tenuis.	208	Corallorhiza.	157
Coronilla.	127	Cynapium.	54
varia.	127	Cynoglossum.	33
Cortinaria.	236	officinale.	33
Corydalis.	122	Cynosurus.	20
alba.	122	cristatus.	20
bulbosa.	122	Cypripedium.	158
Halleri.	122	guttatum.	158
Corylus.	172	Cytisus.	127
Avellana.	172	supinus.	127
maxima.	172		
Cotula.	150	D.	
Cracca.	125	Dactylis.	20
Crataegus Oxyacantha.	86	glomerata.	20
		Daedalea.	241

quercina.	241	intermedia.	111
suaveolens.	242	muralis.	111
Daphne.	70	nemoralis.	112
Mezereum.	70	verna.	111
Datura.	41	Dracocephalum.	105
Stramonium.	41	hyssopifolium.	105
Daucus.	50	nutans.	105
Carota.	50	Ruyschiana.	105
sativus.	50	thymiflorum.	105
Delphinium.	93	Drosera.	58
Consolida.	93	longifolia.	58
olatum.	93	rotundifolia.	58
Dematium.	251	Drymeja.	165
ciliare.	251	Dryopteris.	184
epiphyllum.	251	Dulcamara.	42
Erysiphe.	217		
ollare.	251	E,	
salicinum.	252	Ebulus.	57
violaceum.	251	Echium.	35
virescens.	251	vulgare.	35
Dianthus.	77	Elymus.	24
arenarius.	77	caninus.	24
collinus.	77	Embolus pertusus.	221
deltoides.	77	Encalypta.	188
reptans.	77	vulgaris.	188
ruthenus.	77	Epidendron.	219
Dicksonii bryum.	189	Epigejos.	23
Dicranum.	190	Epilobium.	68
fastigiatum.	190	angustifolium.	68
glaucum.	190	grandiflorum.	68
heteromallum.	190	hirsutum.	68
pulvinatum.	190	montanum.	68
purpureum.	190	palustre.	69
scoparium.	190	parviflorum.	68
Diderma.	220	pubescens.	68
vernicosum.	220	roseum.	68
Draba.	111	spicatum.	68

tetragonum.	68	tetraspermum.	126
<b>Epipactis.</b>	156	<b>Eryngium.</b>	49
cordata.	157	campestre.	49
grandiflora.	556	planum.	50
latifolia.	156	<b>Erysimum.</b>	116
<b>Nidus avis.</b>	157	Alliaria.	116
ovata.	157	Barbarea.	116
<b>palustris.</b>	156	cheiranthoides.	116
rubra.	156	officinale.	116
<b>Equisetum.</b>	181	<b>Erysiphe.</b>	217
arvense.	181	<b>Esula.</b>	84
capillare.	181	<b>Eupatoria.</b>	85
fluviatile.	181	<b>Eupatorium.</b>	143
hyemale.	182	cannabinum.	143
limosum.	181	<b>Euphorbia.</b>	83
palustre.	182	Esula.	84
sylvaticum.	181	helioscopia.	84
<b>Erica vulgaris.</b>	70	latifolia.	84
<b>Erigeron.</b>	146	palustris.	84
aere.	146	Peplus.	83
canadense.	146	<b>Euphrasia.</b>	107
<b>Erineum.</b>	252	gigantea.	108
acerinum.	252	nemorosa.	107
alneum.	252	Odontites.	108
betulinum.	252	officinalis.	107
populinum.	252	sylvestris.	107
tiliaceum.	252	<b>Evonymus.</b>	43
<b>Eriophorum.</b>	11	europaeus.	43
angustifolium.	11	verrucosus.	43
latifolium.	11	vulgaris.	43
polystachion.	11		
vaginatum.	11		
<b>Erodium.</b>	118		
cicutarium.	118	<b>F.</b>	
<b>Ervum.</b>	126	<b>Fagopyrum.</b>	72
hirsutum.	126	Farfara.	146
<b>Lens.</b>	127	<b>Festuca.</b>	20
		decumbens.	21
		duriuscula.	20

elator.	21	vaporaria.	229
fluitans.	18	Fumaria.	122
ovina.	20	bulbosa.	122
pratensis.	21	officinalis.	122
rubra.	21	Funaria.	200
Ficaria.	96	hygrometrica.	201
verna.	96	Fungi.	234
Filago.	153	G.	
arvensis.	153	Galeobdolon.	102
Filices.	184	luteum.	102
Filipendula.	86	Galeopsis.	101
Filix femina.	185	angustifolia.	102
Filix mas.	185	cannabina.	102
Fissidens.	189	Galeobdolon.	102
bryoides.	189	Ladanum-	102
osmundioides.	189	latifolia.	102
pulvinatus.	190	Tetralit.	102
taxifolius.	189	versicolor.	102
Flammula.	96	Galium.	27
Flos cuculi.	81	Aparine.	29
Fontinalis.	200	asperum.	29
antipyretica.	200	boreale.	29
Fragaria.	88	glaucum.	28
alba.	88	hyssopifolium.	27
collina.	88	luteum.	28
elator.	88	Mollugo.	28
semperflorens.	88	montanum.	28
sylvestris.	88	palustre.	27
vesca.	88	pubescens.	28
Frangula.	43	rubrioides.	27
Fraxinus.	175	scabrum.	29
excelsior.	176	sylvaticum.	28
pendula.	176	trifidum.	28
simplicifolia.	176	uliginosum.	28
Fuligo.	220	verum.	28
flava.	220	Gasteromyci.	218
rufa.	220	Geastrum.	218

hygrometricum	218	rectum.	145
Genista.	123	sylvaticum.	145
tincoria.	123	uliginosum.	145
Gentiana.	49	Gnomon.	214
Amarella.	49	Gonopterides.	181
campestris.	49	Gratiola.	7
Centaureum.	42	officinalis.	7
cruciata.	49	Grimmia.	189
Pneumonanthe.	49	apocarpa.	189
Geoglossum.	246	crispa.	189
hirsutum.	246	Grossularia.	43
Geranium.	119	Gymnopus.	236
cicutarium.	118	Gymnostomum.	187
molle.	120	ovatum.	188
palustre.	119	truncatum.	187
pratense.	119	Gypsophila.	76
pusillum.	120	muralis.	76
robertianum.	120	H.	
rotundifolium.	120	Halleri corydalis.	122
sanguineum.	119	Hedypnois autumnalis.	136
sibiricum.	119	Helenium.	148
sylvaticum.	119	Helianthus.	151
Geum.	90	tuberosus.	151
intermedium.	90	Helix.	174
rivale.	91	Helotium.	249
urbanum.	90	galeatum.	249
Githago.	81	Helvella.	246
Gladiolus.	9	brunnea.	246
communis.	9	infula.	246
Glechoma.	100	Mitra.	246
grandiflora.	101	sulcata.	246
hederacea.	101	Helxine.	72
Gnaphalium.	145	Hepaticae.	201
arvense.	153	Heracleum.	52
dioicum.	145	angustifolium.	52
femineum.	145	flavescens.	52
masculum.	145	longifolium.	52
nudum.	146	Panaces.	52

<i>sibiricum.</i>	52	<i>Humulus.</i>	177
<i>Sphondylium.</i>	52	<i>Lupulus.</i>	177
<i>Herniaria.</i>	46	<i>Hydnum.</i>	244
<i>glabra.</i>	46	<i>auriscalpum.</i>	444
<i>Hieracium.</i>	136	<i>candidum.</i>	243
<i>cymosum.</i>	137	<i>ferrugineum.</i>	244
<i>dubium.</i>	137	<i>imbricatum.</i>	244
<i>incanum.</i>	135	<i>repandum.</i>	244
<i>lineare.</i>	138	<i>tomentosum.</i>	244
<i>murorum.</i>	137	<i>Hydrocharis.</i>	178
<i>nemorosum.</i>	137	<i>Morsus ranae.</i>	178
<i>paludosum.</i>	137	<i>Hydrolapathum.</i>	64
<i>Pilosella.</i>	136	<i>Hydrophora stercorea.</i>	222
<i>praemorsum.</i>	137	<i>Hydropiper.</i>	71
<i>sabaudum.</i>	138	<i>Hyoscyamus.</i>	41
<i>sibiricum.</i>	137	<i>niger.</i>	41
<i>sylvaticum.</i>	137	<i>Hypericum.</i>	132
<i>umbellatum.</i>	138	<i>dubium.</i>	132
<i>Himantia.</i>	253	<i>hirsutum.</i>	133
<i>candida.</i>	253	<i>montanum.</i>	133
<i>domestica.</i>	253	<i>perforatum.</i>	133
<i>thermarum.</i>	255	<i>quadrangulare.</i>	132
<i>Hippuris.</i>	3	<i>Hypnum.</i>	197
<i>minor.</i>	3	<i>abietinum.</i>	197
<i>vulgaris.</i>	3	<i>commutatum.</i>	199
<i>Holcus.</i>	17	<i>complanatum.</i>	194
<i>avenaceus.</i>	17	<i>compressum.</i>	199
<i>mollis.</i>	17	<i>crispum.</i>	193
<i>odoratus.</i>	17	<i>Crista castrensis.</i>	199
<i>Holostea.</i>	79	<i>cupressiforme.</i>	200
<i>Homalophyllae.</i>	203	<i>cuspidatum.</i>	199
<i>Hordeum.</i>	24	<i>delicatulum.</i>	197
<i>hexastichon.</i>	25	<i>dendroides.</i>	193
<i>murinum.</i>	25	<i>denticulatum.</i>	198
<i>vulgare.</i>	25	<i>elegans.</i>	198
<i>Hottonia.</i>	36	<i>extenuatum.</i>	200
<i>palustris.</i>	36	<i>molluscum.</i>	199



myosuroides.	197	albus.	87
parietinum.	199	Impatiens.	45
plumosum.	198	Noli tangere.	45
praelongum.	197	Imperatoria.	55
proliferum.	197	sylvestris.	55
purum.	198	Intybus.	139
rutabulum.	198	Inula,	148
Schreberi,	199	dysenterica.	148
sericeum.	194	Helenium.	148
serpens.	197	hirta.	148
splendens.	199	salicina.	148
squarrosus.	199	Iris.	9
taxifolium.	189	paludosa.	9
trichomanoides.	194	pratensis.	9
triquetrum.	198	Pseudacorus.	9
velutinum.	198	sibirica.	9
viticulosus.	193	Isaria.	250
Hypochaeris.	138	mucida.	250
hirsuta.	139	truncata.	250
maculata.	139	Juncus.	61
Hypopithys.	74	acutiflorus.	62
Hypoxylon.	212	adscendens.	62
ciliare,	251	bufonius.	63
operculatum,	213	bulbosus.	63
Hysterium.	215	campestris.	63
conigenum.	215	conglomeratus.	62
nigrum,	215	effusus.	62
pulicare.	215	filiformis.	62
quercinum.	215	obtusiflorus.	62
I.		pilosus.	63
Jacea.	152	squarrosus.	62
Jacobaea.	147	sylvaticus.	62
Jasione.	38	Jungermannia.	201
montana.	38	asplenioides.	201
Iberis,	113	bicuspidata.	201
nudicaulis.	113	bidentata.	201
Idaeus.	87	ciliaris.	201

<i>complanata.</i>	202	<i>palustris.</i>	125
<i>dilatata.</i>	202	<i>pratensis.</i>	142
<i>epiphylla.</i>	202	<i>sylvestris.</i>	124
<i>pinguis.</i>	202	<i>tuberosus.</i>	124
<i>platyphylla.</i>	202	<i>Lavatera.</i>	121
<i>pusilla.</i>	201	<i>thuringiaca.</i>	121
<i>reticulosa.</i>	201	<i>vulgaris.</i>	121
<i>Juniperus.</i>	178	<i>Lecidea.</i>	206
<i>communis.</i>	178	<i>aurantiaca.</i>	206
		<i>geographica.</i>	206
		<i>lapicida.</i>	206
K.		<i>Ledum.</i>	74
<i>Koelreutera hygrometrica.</i>	201	<i>palustre.</i>	74
		<i>Leersia.</i>	188
L.		<i>cirrhat.</i>	188
<i>Lachenalii carex.</i>	162	<i>lanceolata.</i>	189
<i>Lactarius lateritius.</i>	239	<i>Lemna.</i>	159
<i>Lactifluus.</i>	239	<i>gibba.</i>	159
<i>Lactuca.</i>	134	<i>minor.</i>	159
<i>sanguinea.</i>	135	<i>polyrhiza.</i>	159
<i>Scariola.</i>	135	<i>trisulca.</i>	159
<i>Ladanium.</i>	102	<i>Lens.</i>	127
<i>Lagopoda.</i>	129	<i>Leontodon.</i>	135
<i>Lamium.</i>	101	<i>hispidum.</i>	136
<i>album.</i>	101	<i>laciniatum.</i>	135
<i>amplexicaule.</i>	101	<i>Taraxacum.</i>	135
<i>carneum.</i>	101	<i>Leonurus.</i>	103
<i>maculatum.</i>	101	<i>Cardiaca.</i>	103
<i>purpureum.</i>	101	<i>Lepidium.</i>	112
<i>Lappa.</i>	139	<i>ruderales.</i>	112
<i>Lappula.</i>	33	<i>sativum.</i>	112
<i>Lapsana.</i>	139	<i>Lepiota.</i>	235
<i>communis.</i>	139	<i>Leskea.</i>	194
<i>Lathraea.</i>	110	<i>complanata.</i>	194
<i>Squamaria.</i>	110	<i>sericea.</i>	194
<i>Lathyrus.</i>	124	<i>trichomanoides.</i>	194
<i>latifolius.</i>	124	<i>vivipara.</i>	197

<b>Leucanthemum.</b>	149	<b>pulmonarius.</b>	210
<b>Levisticum.</b>	53	<b>pulverulentus.</b>	206
<b>Libanotis.</b>	51	<b>pyxidatus.</b>	207
<b>Lichen aphthosus.</b>	212	<b>rangiferinus.</b>	208
<b>atratus.</b>	249	<b>rosaceus.</b>	214
<b>aurantiacus.</b>	206	<b>salicinus.</b>	206
<b>candelaris.</b>	209	<b>saxatilis.</b>	209
<b>caninus.</b>	211	<b>scriptus.</b>	206
<b>caperatus.</b>	210	<b>setosus.</b>	253
<b>centrifugus.</b>	209	<b>spadiceus.</b>	208
<b>ciliaris.</b>	211	<b>stellaris.</b>	209
<b>clavicularis.</b>	206	<b>tenellus.</b>	210
<b>cocciferus.</b>	207	<b>uncialis.</b>	208
<b>coccineus.</b>	207	<b>vulgatus.</b>	207
<b>oorniculatus.</b>	211	<b>Ligusticum.</b>	53
<b>farinaceus.</b>	211	<b>Levisticum.</b>	53
<b>floridus.</b>	208	<b>Limosella.</b>	110
<b>fraxineus.</b>	211	<b>aquatica.</b>	110
<b>furfuraceus.</b>	211	<b>diandra.</b>	110
<b>geographicus.</b>	206	<b>silesiaca.</b>	110
<b>gracilis.</b>	207	<b>tenuifolia.</b>	110
<b>hirtus.</b>	208	<b>Linaria.</b>	109
<b>hispidus.</b>	210	<b>minor.</b>	109
<b>islandicus.</b>	208	<b>vulgaris.</b>	109
<b>jubatus.</b>	211	<b>Lingua.</b>	96
<b>juniperinus.</b>	212	<b>Linkia.</b>	205
<b>lapidus.</b>	206	<b>Nostoc.</b>	205
<b>murorum.</b>	209	<b>Linnaea.</b>	109
<b>niger.</b>	210	<b>borealis.</b>	110
<b>nitidus.</b>	207	<b>Linnaei carex.</b>	161
<b>olivaceus.</b>	210	<b>Linum.</b>	58
<b>parietinus.</b>	210	<b>catharticum.</b>	53
<b>paschalis.</b>	207	<b>flavum.</b>	58
<b>pertusus.</b>	206	<b>monopetalum.</b>	58
<b>physodes.</b>	210	<b>usitatissimum.</b>	58
<b>prunastri.</b>	211	<b>Lithospermum.</b>	33
<b>pulicaris.</b>	215	<b>arvense.</b>	33

Lobelii melica.	16	corniferum.	223
Loeselii sisymbrium.	116	Epidendron.	219
Lolium.	24	epiphyllum.	224
latum.	24	equinum.	223
perenne.	24	fragile.	220
temulentum.	24	gemmaum.	219
Lonicera.	40	giganteum.	219
tatarica.	40	maximum.	219
Xylosteum.	40	ovoideum.	219
Lotoidea.	129	papillatum.	219
Lotus.	131	poculiforme.	224
corniculatus.	131	pratense.	219
sylvaticus.	131	pyriforme.	219
uliginosus.	131	stellatum.	218
Lunaria.	114. 183	tritici.	233
rediviva.	114	Tuber.	218
Lupulina.	130	vesparium.	221
Lupulus.	177	Lycopodium.	182
Luzula.	63	annotinum.	182
campestris.	63	clavatum.	182
pilosa.	63	complanatum.	182
vernalis.	63	Selago.	183
Lychnis.	81	Lycopsis.	35
dioica.	81	arvensis.	35
Flos cuculi.	81	Lycopus.	7
pratensis.	81	europaeus.	7
sylvestris.	81	vulgaris.	7
Viscaria.	81	Lysimachia.	37
Lycocotonum.	93	Nummularia.	37
Lycogala.	219	thyrsiflora.	37
miniata.	219	vulgaris.	37
Lycoperdon.	218	Lythrum.	83
ardesiaceum.	218	quadrifolium.	83
Bovista.	219	Salicaria.	83
cancellatum.	223		
Carpobolus.	217		
cervinum.	219		
		M.	
		Majanthemum.	30

bifolium.	30	aquatica.	100
Malaxis.	157	arvensis.	100
bifolia.	157	austriaca.	100
monophylla.	157	sylvestris.	100
Malva.	120	viridis.	100
crispa.	121	Menvanthes.	36
mauritiana.	121	trifoliata.	36
pusilla.	121	Mercurialis.	177
retundifolia.	121	perennis.	177
sylvestris.	121	Merialus.	241
Marchantia.	202	Cantharellus.	241
polymorpha.	202	cornucopodioides.	241
Matricaria.	150	Vastator.	241
Chamomilla.	150	Mespilus.	86
Parthenium.	149	monogyna.	86
suaveolens.	150	Oxyacantha.	86
Medicago.	132	Mezereum.	70
falcata.	132	Milium.	14
lupulina.	132	effusum.	14
Medulla panis.	243	Millefolium.	151
Melampyrum.	106	purpureum.	151
arvense.	107	Mitra.	246
cristatum.	107	Mnium.	195
nemorosum.	107	argenteum.	195
pratense.	107	caespiticiu.	195
sylvaticum.	107	capillare.	195
Melica.	16	cirrhatum.	188
caerulea.	16	cuspidatum.	196
Lobelia.	16	fontanum.	194
nutans.	16	hornum.	196
uniflora.	16	palustre.	196
Melilothus.	128	pellucidum.	188
alba.	128	punctatum.	196
caerulea.	128	pyriforme.	200
lutea.	128	roseum.	196
officinalis.	128	serpyllifolium.	196
vulgaris.	128	undulatum.	196
Mentha.	100	Mollugo.	28





O.		Morio.	
Octospora albidula.	248	Oreopteris.	184
carnea.	248	Oreoselinum.	52
elastica.	247	Origanum.	104
scutellata.	248	album.	104
Odontites.	108	humile.	104
rubra.	108	vulgare.	104
Oenothera.	67	Ornithogalum.	60
biennis.	67	luteum.	60
Omphalia.	240	minimum.	60
Onopordon.	142	pratense.	60
Acanthium.	142	spathaceum.	60
Onygena.	222	sylvaticum.	60
equina.	225	umbellatum.	60
Opegrapha.	205	villosum.	60
pulverulenta.	206	Orobanche.	110
scripta.	206	caryophyllacea.	110
vulgata.	205	Orobis.	124
Ophrys Corallorhiza.	157	tuberosus.	124
cordata.	157	vernus.	124
monophylla.	157	Orthotrichum.	192
Monorchis.	156	anomalum.	193
Nidus avis.	157	striatum.	192
ovata.	157	Oscillatoria parietina.	203
spiralis.	155	Osmunda.	183
Opulus.	56	Lunaria.	183
Orchis.	153	regalis.	183
alba.	155	Struthiopteris.	186
angustifolia.	154	Oxalis.	80
bifolia.	153	Acetosella.	81
conopsea.	155	purpurascens.	81
coriophora.	153	Oxyacantha.	86
cucullata.	153	Oxycoccus.	69
latifolia.	154	Oxycoccus.	69
maculata.	155	palustris.	69
mascula.	154		
militaris.	154		
		P.	
		Padus.	85

Panaces.	52	stellaris.	209
Panicum.	11	tenella.	210
aristatum.	12	Parnassia.	57
Crus galli.	12	palustris.	57
flavescens.	12	Parthenium.	149
glaucum.	12	Pastinaca.	55
miliaceum.	12	pratensis.	55
muticum.	12	sativa.	55
viride.	12	Patellaria.	249
Papaver.	92	Pedicularis.	108
plenum.	92	comosa.	108
Rhoeas.	92	palustris.	108
somniferum.	92	Sceptrum.	108
Parietaria.	30	Peloria.	109
officinalis.	30	Peltigera.	211
Paris.	73	aphthosa.	212
pentaphylla.	73	canina.	211
quadrifolia.	73	Peplis.	64
quinquefolia.	73	Portula.	64
Parmelia.	209	Peplus.	83
candelaris.	209	Persicaria.	72
caperata.	210	Persicariae.	71
centrifuga.	209	Petasites.	147
ciliaris.	211	Peucedanum.	52
farinacea.	211	Silaus.	52
fraxinea.	211	Peziza.	247
furfuracea.	211	aurea.	248
jubata.	211	Auricula.	247
murorum.	209	citrina.	248
nigra.	210	cornucopodioides.	241
olivacea.	210	cyathoides.	248
parietina.	210	flava.	249
physodes.	210	granulosa.	249
prunastri.	211	inquinans.	247
pulmonaria.	210	lenticularis.	249
pulverulenta.	209	papillata.	248
saxatilis.	209	Patellaria.	249

radiata.	249	Saxifraga.	56
rosae.	243	Pinus.	172
sarcoides.	248	Abies.	172
scabra.	249	sylvestris.	172
stercoraria.	249	Plantago.	29, 66
stercorea.	248	altissima.	29
Phalaris.	12	lanceolata.	29
arundinacea.	15	major.	29
canariensis.	12	media.	29
erucaeformis.	14	sylvatica.	29
picta.	13	Platisma caperatum.	210
Phallus.	254	ciliare.	211
esculentus.	246	farinaceum.	211
impudicus.	235	fraxineum.	211
Phascum.	187	furfuraceum.	211
cuspidatum.	187	olivaceum.	210
muticum.	187	parietinum.	210
subulatum.	187	Pleuropus.	240
Phegopteris.	184	Pneumonanthe.	49
Phellandrium.	53	Poa.	17
aquaticum.	53	angustifolia.	18
Philonotis.	97	annua.	19
Phleum.	13	aquatica.	17
bulbosum.	13	bulbosa.	18
nodosum.	13	compressa.	19
pratense.	13	distans.	19
Phlomis.	104	fluitans.	18
tuberosa.	104	nemoralis.	19
Phragmites.	23	palustris.	19
Physcia physodes.	210	pratensis.	18
Picris.	156	retroflexa.	19
hieracioides.	156	strigosa.	18
Pilobolus.	217	sudetica.	18
crystallinus.	217	trivialis.	18
Pilosella.	136	Podagraria.	56
Pimpinella.	55	Polemonium.	37
nigra.	56	album.	58

caeruleum.	38	vulgare.	184
<i>Pollichia amplexicaulis.</i>	101	<i>Polytrichum.</i>	191
<i>Polygala.</i>	122	aloides.	191
alba.	123	commune.	191
amara.	123	juniperifolium.	191
carnea.	123	juniperinum.	191
elongata.	123	nanum.	191
vulgaris.	123	piliferum.	191
<i>Polygona.</i>	72	undulatum.	191
<i>Polygonatum.</i>	61	yuccaefolium.	191
<i>Polygonum.</i>	71	<i>Populus.</i>	177
amphibium.	71	nigra.	177
aquaticum.	71	tremula.	177
aviculare.	72	<i>Portula.</i>	64
<i>Bistorta.</i>	71	<i>Potamogeton.</i>	31
<i>Convolvulus.</i>	73	crispum.	32
<i>dumetorum.</i>	73	gramineum.	32
<i>erectum.</i>	72	lucens.	31
<i>Egopyrum.</i>	72	natans.	31
<i>Hydropiper.</i>	71	perfoliatum.	31
incanum.	72	pusillum.	52
intermedium.	71	<i>Potentilla.</i>	89
lapathifolium.	72	Anserina.	89
minus.	71	argentea.	89
<i>Persicaria.</i>	72	cana.	89
terrestre.	71	intermedia.	89
<i>Polypodium.</i>	184	norvegica.	90
aculeatum.	185	obscura.	89
cristatum.	185	reptans.	90
<i>Dryopteris.</i>	184	ruthenica.	90
<i>Filix femina.</i>	185	salisburgensis.	89
<i>Filix mas.</i>	185	sericea.	89
fragile.	186	supina.	89
molle.	186	verna.	89
<i>Oryopteris.</i>	184	<i>Poterium.</i>	170
<i>Phegopteris.</i>	184	Sanguisorba.	170
spinulosum.	185	<i>Pottia cavifolia.</i>	188

<i>Pratella.</i>	239	<i>circaeae.</i>	228
<i>Prenanthes.</i>	135	<i>cnici.</i>	226
<i>muralis.</i>	135	<i>ficariae.</i>	228
<i>Primula.</i>	36	<i>flosculorum.</i>	226
<i>elatior.</i>	36	<i>gentianae.</i>	225
<i>officinalis.</i>	36	<i>graminis.</i>	227
<i>rubra.</i>	36	<i>hieracii.</i>	226
<i>veris.</i>	36	<i>junci.</i>	227
<i>Prunella.</i>	106	<i>menthae.</i>	225
<i>alba.</i>	106	<i>mucronata.</i>	227
<i>grandiflora.</i>	106	<i>nitida.</i>	225
<i>vulgaris.</i>	106	<i>obtusa.</i>	227
<i>Prunus.</i>	85	<i>persicariae.</i>	227
<i>insiticia.</i>	85	<i>pimpinellae.</i>	226
<i>Padus.</i>	85	<i>pneumonanthes.</i>	226
<i>spinosa.</i>	85	<i>polygoni.</i>	226
<i>Pseud - Acorus.</i>	9	<i>potentillae.</i>	227
<i>Pseudo - Cyperus.</i>	165	<i>prenanthidis.</i>	226
<i>Psora saxicola.</i>	209	<i>pruni.</i>	228
<i>Ptarmica.</i>	151	<i>rubi.</i>	227
<i>Pteris.</i>	186	<i>scirpi.</i>	227
<i>aquilina.</i>	186	<i>tanacetii.</i>	227
<i>Puccinia.</i>	225	<i>Pulmonaria.</i>	34
<i>acaciae.</i>	228	<i>angustifolia.</i>	34
<i>aegopodii.</i>	226	<i>maculata.</i>	34
<i>aethusae.</i>	225	<i>officinalis.</i>	31
<i>anemones.</i>	225	<i>reticulata.</i>	210
<i>apargiae.</i>	226	<i>Pulsatilla.</i>	91
<i>balsamitae.</i>	227	<i>pratensis.</i>	91
<i>betonicae.</i>	225	<i>vulgaris.</i>	94
<i>bistortae.</i>	226	<i>Pulvis pyrius.</i>	215
<i>bulbosa.</i>	227	<i>Pyrethrum.</i>	149
<i>bullata.</i>	226	<i>corymbosum.</i>	149
<i>caudata.</i>	227	<i>inodorum.</i>	150
<i>centaureae.</i>	226	<i>Parthenium.</i>	149
<i>cerealis.</i>	227	<i>Pyrola.</i>	75
<i>chrysosplenii.</i>	228	<i>minor.</i>	75

rotundifolia.	75	Rapa.	117
secunda.	75	Raphanistrum.	118
umbellata.	75	Raphanus.	118
uniflora.	75	niger.	118
virens.	75	Radicula.	118
		Raphanistrum.	118
		sativus.	118
Q.		Rapunculus.	39
Quercus.	171	Reticularia alba.	220
pedunculata.	171	lutea.	220
Robur.	171	Rhamnus.	42
		catharticus.	42
R.		Frangula.	42
Racodium.	252	Rhinanthus.	106
cellare.	252	Alectorolophus.	106
rupestre.	252	Crista galli.	106
Radicula.	118	major.	106
Ramaria farinosa.	250	minor.	106
Ranunculus.	96	villosus.	106
aconitifolius.	97	Rhizomorpha.	253
acris.	97	setiformis.	253
aquatilis.	98	subcorticalis.	253
arvensis.	98	Rhoeas.	92
auricomus.	96	Rhynchospora.	9
bulbosus.	97	alba.	9
campestris.	97	Ribes.	43
cassubicus.	96	Grossularia.	43
Ficaria.	96	nigrum.	43
Flammula.	96	rubrum.	43
fluvialis.	98	Uva crispa.	44
hirsutus.	97	Riccia.	203
hortensis.	97	fluitans.	203
lanuginosus.	97	glauca.	203
Lingua.	96	Rivularia.	203
Philonotis.	97	dura.	203
polyanthemus.	98	endiviaefolia.	203
repens.	97	Robinia.	127
sceleratus.	96		



Caragana.	127	Salicaria.	83
Robur.	171	Salix.	172
Rosa.	87	acuminata.	175
canina.	87	alba.	175
cinnamomea.	87	amygdalina.	173
majalis.	87	angustifolia.	174
Rosmarinus sylvestris.	74	aurita.	174
Rubigo.	228	caprea.	175
Rubus.	87	decipiens.	174
albus.	87	fragilis.	174
caesius.	87	Helix.	174
corylifolius.	87	hermaphroditica.	173
fruticosus.	88	incubacea.	174
Idaeus.	87	monandra.	174
saxatilis.	88	myrsinites.	174
Rumex.	64	pentandra.	173
Acetosa.	65	rosmarinifolia.	174
Acetosella.	66	triandra.	173
acutus.	65	viminalis.	175
aquaticus.	65	vitellina.	173
bucephalophorus.	65	Salvia.	8
conglomeratus.	64	glutinosa.	8
crispus.	64	pratensis.	8
Hydrolapathum.	64	rubra.	8
maritimus.	65	Sambucus.	57
multifidus.	66	Ebulus.	57
Nemolapathum.	64	laciniata.	57
obtusifolius.	65	nigra.	57
Russula.	240	Sanguisorba.	50. 170
Ruta muraria.	186	officinalis.	30
Ruyschiana.	105	Sanicula.	50
S.		europaea.	50
Sagina.	32	Saponaria.	76
procumbens.	32	hortensis.	77
Sagittaria.	170	officinalis.	76
natans.	170	Satyrrium.	155
sagittifolia.	170	Monorchis.	156

<i>repens.</i>	155	<i>Semen.</i>	217
<i>viride.</i>	155	<i>Scrophularia.</i>	109
<i>Saxifraga.</i>	56	<i>aquatica.</i>	109
<i>Scabiosa.</i>	26. 152	<i>nodosa.</i>	109
<i>arvensis.</i>	26	<i>Scutellaria.</i>	105
<i>columbaria.</i>	26	<i>galericulata.</i>	105
<i>ochroleuca.</i>	26	<i>Scutellatae.</i>	205
<i>Succisa.</i>	26	<i>Secale.</i>	25
<i>sylvatica.</i>	26	<i>aestivum.</i>	25
<i>Scandix.</i>	54	<i>cereale.</i>	25
<i>Cerrefolium.</i>	54	<i>Sedum.</i>	80
<i>Scariola.</i>	135	<i>acre.</i>	80
<i>Sceptrum Carolinum.</i>	108	<i>purpureum.</i>	80
<i>Schismatopterides.</i>	183	<i>sexangulare.</i>	80
<i>Schoenoprasum.</i>	60	<i>Telephium.</i>	80
<i>Schoenus albus.</i>	9	<i>Selago.</i>	183
<i>Schieberi carex.</i>	162	<i>Selinum.</i>	51
<i>hypnum.</i>	199	<i>Carvifolia.</i>	51
<i>Scirpus.</i>	9	<i>carvifolium</i>	51
<i>acicularis.</i>	10	<i>palustre.</i>	51
<i>capitatus.</i>	10	<i>sylvaticum.</i>	51
<i>caricinus.</i>	10	<i>sylvestre.</i>	51
<i>lacustris.</i>	10	<i>Semen.</i>	217
<i>nanus.</i>	10	<i>Sempervivum.</i>	84
<i>ovatus.</i>	10	<i>globiferum.</i>	84
<i>palustris.</i>	10	<i>tectorum.</i>	84
<i>sylvaticus.</i>	10	<i>Senecio.</i>	147
<i>Scleranthus.</i>	76	<i>Jacobaea.</i>	147
<i>annuus.</i>	76	<i>paludosus.</i>	147
<i>perennis.</i>	76	<i>pumilus.</i>	147
<i>Scleroderma.</i>	219	<i>saracenicus.</i>	147
<i>cervinum.</i>	219	<i>sylvaticus.</i>	147
<i>Sclerotium.</i>	217	<i>vulgaris.</i>	147
<i>brassicae.</i>	217	<i>Serapias lancifolia.</i>	156
<i>complanatum.</i>	217	<i>latifolia.</i>	156
<i>Erysiphe.</i>	217	<i>longifolia.</i>	156
<i>populneum.</i>	218	<i>rubra.</i>	156

Serpyllum.	104	rigidus.	134
Serratula.	140	Sophia.	115
arvensis.	140	Sorbus.	85
setosa.	140	aucuparia.	86
tinctoria.	140	Sparganium.	160
Silaus.	52	ramosum.	160
Silene.	78	simplex.	160
baccifera.	78	Spergula.	82
noctiflora.	78	arvensis.	82
nutans.	78	nodosa.	83
Sinapis.	117	Sphaeria.	212
alba.	117	aucupariae.	214
arvensis.	117	berberidis.	214
nigra.	118	brassicae.	217
Sistotrema.	243	cespitosa.	214
cinereum.	243	densa.	213
quercinum.	243	fragiformis.	213
Sisymbrium.	115	fusca.	213
amphibium.	115	Gnomon.	214
Loeselii.	116	graminis.	213
Nasturtium.	115	Hypoxylon.	212
palustre.	115	inquinans.	215
Sophia.	115	maculaeformis.	216
sylvestre.	115	militaris.	212
Sium.	53	miniata.	216
latifolium.	53	nebulosa.	214
Solanum.	41	nitida.	257
Dulcamara.	42	nivea.	214
nigrum.	42	olivacea.	234
villosum.	42	polymorpha.	212
Solidago.	148	pteridis.	213
Virgaurea.	148	Pulvis pyrius.	215
Sonchus.	134	ribesia.	213
arvensis.	134	salicina.	213
asper.	134	solani.	214
oleraceus.	134	Stigma.	213
palustris.	134	tiliae.	215

trifolii.	214	palustris.	79
versipellis.	213	uliginosa.	79
xylostei.	215	Stemonitis.	221
Sphaerobolus.	216	crocata.	221
rosaceus.	249	ferruginea.	222
stellatus.	217	sulphurea.	222
Sphagnum.	187	typhina.	221
capillifolium.	187	Stereocaulon paschale.	207
cuspidatum.	187	Stigma.	213
latifolium.	187	Stilbospora.	215
palustre.	187	macrosperma.	215
Sphondylium.	52	Stilbum.	250
Spica venti.	14	rigidum.	250
Spiraea.	86	vulgare.	250
Filipendula.	86	Stramonium.	41
salicifolia.	86	Stratiotes.	178
Ulmaria.	86	Aloides.	178
Splachnum.	188	Struthiopteris.	186
ampullaceum.	188	germanica.	186
Spumaria.	220	Succisa.	26
Mucilago.	220	rosea.	26
Squamaria.	110	Symphytum.	34
centrifuga.	209	album.	34
juniperina.	212	officinale.	34
pulverulenta.	206	patens.	34
stellaris.	209	purpureum.	34
Stachyopterides.	182	Syringa.	4
Stachys.	103	alba.	4
annua.	103	rosea.	4
palustris.	103	vulgaris.	4
sylvatica.	103	T.	
Stellaria.	79	Tanacetum.	144
arvensis.	79	crispum.	144
glauca.	79	vulgare.	144
graminea.	79	Taraxacum.	135
Holostea.	79	Telephium.	80
nemorum.	79	Tetrahit.	102

Tetraphis.	188	Tormentilla.	90
pellucida.	188	erecta.	90
Tencrium.	6	officinalis.	90
Thalictrum.	95	Tortula muralis.	192
angustifolium.	95	subulata.	192
aquilegifolium.	95	Trachelium.	59
flavum.	95	Tragopogon.	133
minus.	95	majus.	134
Thapsus.	40	orientale.	134
Thelephora.	244	pratense.	133
carnea.	245	Trapa.	30
ferruginea.	244	natans.	31
hirsuta.	245	Tremelia.	246
incrustans.	245	abietina.	247
laevis.	245	arborea.	247
mesenterica.	245	Auricula.	247
mesenteriformis.	244	caraganae.	247
papyracea.	245	juniperina.	247
purpurea.	245	mesenterica.	247
quercina.	245	miliaria.	247
terrestris.	244	Nostoc.	205
Thlaspi.	112	sepincola.	247
arvense.	112	spiculosa.	247
Bursa pastoris.	112	urticae.	247
campestre.	112	ustulata.	247
simplicifolium.	113	Trentepohlia.	195
Thrincia.	136	erecta.	195
hirta.	136	Trichia.	221
Thymus.	104	ovata.	221
Acynos.	105	rubiformis.	221
Serpyllum.	104	Trichoderma.	234
Tilia.	92	tuberculatum.	234
grandifolia.	93	viride.	234
microphylla.	92	Trichodium.	15
parvifolia.	92	caninum.	15
platyphylla.	93	Trichostomum.	190
Tordylium Anthriscus.	50	canescens.	190

Trientalis.	67	Tubercularia.	216
europaea.	67	vulgaris.	216
Trifolium.	128	Tubulina.	222
agrarium.	131	fragiformis.	222
album.	128	Turritis.	116
alpestre.	130	glabra.	116
arvense.	130	hirsuta.	117
aureum.	131	Tussilago.	146
caeruleum.	128	Farfara.	146
campestre.	131	hybrida.	147
carneum.	130	Petasites.	147
filiforme.	131	Typha.	159
flexuosum.	129	angustifolia.	160
hybridum.	129	latifolia.	160
luteum.	128		
medium.	129	U.	
Melilotus.	128	Ulmata.	86
minus.	131	Ulmus.	48
montanum.	130	campestris.	48
officinale.	128	ciliata.	48
pentaphyllum.	129	effusa.	48
pratense.	129	Ulva.	204
procumbens.	131	intestinalis.	204
repens.	129	Uredo.	228
sativum.	129	alchemillae.	229
spadiceum.	130	alyssi.	228
vulgare.	128	apiculata.	232
Triglochin.	66	appendiculata.	233
palustre.	66	arctii.	232
Triticum.	25	athyræ.	229
aestivum.	25	avenae.	233
hybernum.	25	bardanae.	232
repens.	26	betæ.	232
Trollius.	98	betulae.	231
europaeus.	98	betulina.	231
Tuber.	218	bullata.	232
cibarium.	218	campanulae.	250



candida.	228	populi.	251
caricis.	233	potentillae.	229
centifoliae.	231	pulsatillae.	230
cerastii.	231	pustulata.	231
cheiranthi.	228	pyrolae.	229
cincta.	232	rhinanthi.	230
circinata.	229	ribis.	230
confluens.	229	ringentium.	230
conii.	232	rosae.	231
convolvuli.	232	rubi.	229
cubica.	228	saponariae.	233
decipiens.	233	segetum.	233
eglanteriae.	230	senecionis.	230
epilobii.	231	serratulae.	232
erysimi.	228	sonchi.	230
euphorbiae.	229	spiceae.	231
euphrasiae.	230	suaveolens.	232
evonymi.	230	thlaspeos.	228
fabae.	232	tragopogi.	228
farfarae.	230	tremellosa.	230
farinosa.	230	trifolii.	232
frumenti.	229	tritici.	233
genistae.	233	tussilaginis.	230
graminum.	233	ulmariae.	231
gyrosa.	231	vaccinii.	231
helioscopiae.	229	viciae.	232
hordii.	233	violacea.	233
idaei.	231	violae.	233
ledi.	231	Urtica.	168
linearis.	229	dioica.	168
lini.	229	urens.	168
melampyri.	230	Usnea.	208
menthae.	232	cranii.	209
mercurialis.	229	florida.	208
miniata.	230	hirta.	208
myrtilli.	231	jubata.	211
nitida.	232	Utricularia.	7
odontitidis.	230	minor.	7
orchidis.	229	vulgaris.	7
oreosclini.	232	Uva crispa.	44
ovata.	231	Uva ursi.	75
panici.	233		
phaseoli.	233	V.	
pisi.	233	Vaccinium.	70
polygoni.	232	Myrtillus.	70
polypodii.	229	Oxycocco.	69
		uliginosum.	70

<i>Vitis</i> <i>Idaea</i> .	70	<i>sepium</i> .	126
<i>Valeriana</i> .	8	<i>sylvatica</i> .	125
<i>officinalis</i> .	9	<i>tenuifolia</i> .	126
<i>Vastator</i> .	241	<i>Vinca</i> .	45
<i>Veratrum</i> .	66	<i>minor</i> .	46
<i>album</i> .	66	<i>Viola</i> .	44
<i>Verbascum</i> .	40	<i>alba</i> .	44
<i>nigrum</i> .	41	<i>arvensis</i> .	45
<i>phlomoïdes</i> .	41	<i>bicolor</i> .	45
<i>Thapsus</i> .	40	<i>canina</i> .	44
<i>Veronica</i> .	5	<i>hirta</i> .	44
<i>agrestis</i> .	6	<i>hortensis</i> .	45
<i>Anagallis</i>	5	<i>magna</i> .	44
<i>arvensis</i> .	6	<i>mirabilis</i> .	45
<i>austriaca</i> .	6	<i>montana</i> .	44
<i>Beccabunga</i> .	5	<i>odorata</i> .	44
<i>Chamaedrys</i> .	6	<i>palustris</i> .	44
<i>latifolia</i> .	6	<i>persicifolia</i> .	45
<i>longifolia</i> .	5	<i>tricolor</i> .	45
<i>maritima</i> .	5	<i>Virgaurea</i> .	148
<i>officinalis</i> .	5	<i>Viscaria</i> .	81
<i>parmularia</i> .	6	<i>Viscum</i> .	176
<i>rosea</i> .	5	<i>album</i> .	176
<i>scnellata</i> .	6	<i>Vitis</i> <i>Idaea</i> .	70
<i>serpyllifolia</i> .	5	<i>Vulneraria</i> .	123
<i>spicata</i> .	5	<i>Vulvaria</i> .	48
<i>Teucrium</i> .	6		W.
<i>triphyllus</i> .	7	<i>Webera</i> .	200
<i>verna</i> .	7	<i>pomiformis</i> .	194
<i>Verrucaria</i> .	207	<i>pyriformis</i> .	200
<i>aurantiaca</i> .	206	<i>Weissia</i> .	189
<i>geographica</i> .	206	<i>Dicksonii</i> .	189
<i>nitida</i> .	207	<i>viridula</i> .	189
<i>scripta</i> .	206		X.
<i>Viburnum</i> .	56	<i>Xanthium</i> .	169
<i>Opulus</i> .	56	<i>strumarium</i> .	169
<i>roseum</i> .	57	<i>Xyloma</i> .	216
<i>Vicia</i> .	125	<i>acerinum</i> .	216
<i>angustifolia</i> .	126	<i>populinum</i> .	216
<i>cassubica</i> .	125	<i>pteridis</i> .	213
<i>Cracca</i> .	125	<i>salicinum</i> .	216
<i>dumetorum</i> .	125	<i>Xylomici</i> .	212
<i>sativa</i> .	126	<i>Xylosteum</i> .	40





New York Botanical Garden Library

QK 321 .M35 1817

Martius, Heinrich v/Prodromus florae mos

gen



3 5185 00025 2864

